

סטרייק STRIKE

אבקה רטיבה

קוטל עשבים לקטילת עשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים במטעים וצדי דרכים ולמניעת הצצת עשבים חד-שנתיים באגוזי אדמה.

מכיל: Flumioxazin 50%.

סטרייק הינו קוטל עשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים, שבשילוב עם ראונדאפ משפר את קטילת העשבים קשי ההדברה ומתקבלת פעילות קטילה מהירה ויעילה. סטרייק נקלט במהירות ע"י העלווה הירוקה וגורם להחמה, נבילה והתייבשות מהירה של הצמח. ניתן להבחין בסימפטומים תוך 1 - 3 ימים לאחר הריסוס. מנגנון הפעולה של סטרייק הוא על ידי עיכוב האנזים פרוטופרינוגן אוקסידז (Protox=PPPO). סטרייק פועל בנוכחות אור וחמצן. לאחר הפעלתו, סטרייק מונע הצצת עשבים חד-שנתיים באגוזי אדמה כמפורט בטבלת השימוש.

הוראות השימוש במטעים

העשבים המודברים: השילוב של סטרייק וראונדאפ קוטל מגוון רחב מאוד של עשבים ח"ש ור"ש, גם מינים שאינם נקטלים ביעילות ע"י ראונדאפ לבד.

כדי לקבל הדברה מיטבית, רסס על צמחים ירוקים רעננים. בעשבים ר"ש המפותחים מאברי ריבוי תת קרקעיים, יש להמתין בטיפול עד שהצימוח יפרוץ מהם ולהימנע מעיבוד קרקע או כיסוח עלווה לפני הטיפול. לאחר ריסוס עשבים רב שנתיים המנע מעיבוד קרקע לפחות 7 ימים לאחר הריסוס. לקבלת הדברה יעילה של עשבים יש להימנע מהשקיה בהמטרה במשך יומיים לאחר הריסוס.

מנע הגעת תרסיס או רחף לעלווה ולפירות של גידולי תרבות, לגזעי עצים שטרם השתעמו ולכל צמחייה רצויה, מאחר שנזק חמור עלול להיגרם להם. למניעת רחף רסס רק בשעות ללא רוח. בריסוס בתערובת של סטרייק וראונדאפ, נהג לפי כל ההוראות ואמצעי הזהירות בתווית הראונדאפ. אין סכנה מפגיעת התרסיס בגזעי עצים מעוצים, המנע מכיסוי של תרסיס בענפים של עצי פרי וגפן.

ח"ש מודברים: דגניים ורחבי עלים שונים כולל חלמית, מעוג, נזמית, סרפד, מרקולית, סוככיים ומצליבים.
ר"ש מודברים: דגניים, גומא הפקעים, סולנום זיתני, אספרגוס החורש, חבלבל השדה, לוף, לופית חנק מחודד, ארויה משיינית וכותלית יהודה.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

ניתן להשתמש בסטרייק בשילוב עם ראונדאפ בגידולים הבאים:

הגידול	מועד הריסוס	העשבים המודברים	מינון סטרייק (גרם/ד' או %)	מינון ראונדאפ (סמ"ק/ד' או %)	נפח תריסוס (ל'/ד')
אבוקדו, הדרים, מנגו - מתום שנה לאחר הנטיעה	במשך כל השנה	חד שנתיים עד גובה 10 ס"מ	10 או 0.05%	150 או 0.5%	20-30
		חד שנתיים עד גובה 40 ס"מ רב שנתיים	10 או 0.05% 20 או 0.1%	200 - 300 או 1% 250 - 500 או 2%	
אגס, אנונה, אפרסמון, אפרסק, גויאבה, גפן, פקאן, קיווי, שזיף, תפוח - מתום שנה לאחר הנטיעה	במשך כל השנה	חד שנתיים עד גובה 40 ס"מ	10 או 0.05%	200 - 300 או 1%	20-50
		רב שנתיים	20 או 0.1%	300-600 או 2%	



מספר הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 96/הגה"צ/1349

• דרגת רעילות IV - מסוכן
• אריזות: 200 X 5 גרם שקיות מסיסות
• מיוצר ע"י Sumitomo Chemicals
• משווק ע"י אדמה אגן

סטרייק (המשך) STRIKE

שילובים במטעים וצדי דרכים: ניתן לשלב סטרייק עם ראונדאפ ועם מונעי הצצה כגון דיאורקס 80 ת.ה. בכל השילובים הנ"ל נהג לפי ההוראות ואמצעי הזהירות שמופיעים בתווית של כל תכשיר.

גידולי שדה

סטרייק מיושם באגוזי אדמה לאחר הזריעה ולפני הצצת הגידול והעשבים. לאחר הפעלה של לפחות 20 מ"מ גשם או המטרה, סטרייק ימנע את ההצצה של חבלבל, ירבוז לבן, כף אווז, לשישית הצבעים.

הגידול	מועד הריסוס	מינון סטרייק (גרם/ד')	נפח תרסיס (ל'/ד')
אגוזי אדמה בקרקות לס בלבד	מיד לאחר הזריעה ולפני ההצצה	15	20-30 (ראה סעיף הפעלה)



מספר הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 96/הגה"צ/1349

• מיוצר ע"י Sumitomo Chemicals
• משווק ע"י אדמה אגן

• דרגת רעילות IV - מסוכן
• אריזות: 200 X 5 גרם שקיות מסיסות