

טומהוק TOMAHAWK

תרכיז מתחלב

קוטל עשנים סיסטמי להדברת עשבים רחבי עלים בריסוס לאחר הצתם

מכיל: Fluroxypyr 200 g/L (as meptylheptyl ester 288 g/L)

מנגנון הפעולה של טומהוק דומה לקוטלי עשבים הורמונליים. הנזק לעשבים מתבטא בעוותים ובהתקפלויות של העלים והצימוח הצעיר. התכשיר נקלט בעלווה הירוקה וחודר גם למערכת השורשים. העשבים הרגישים הם מיני עשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים קשי הדברה כמפורט בטבלת הוראות השימוש.

הערות לטיפול: אין לזרוע או לשתול כל גידול לאחר ריסוס בטומהוק במשך 3 חודשים ממועד היישום. ניתן לרסס בטומהוק בכל שעות היום. מנע מגע התרסיס בעלוות עצי הפרי. הימנע מרחף התרסיס לגידולים שכנים העלולים להיפגע מפעילות החומה. החומר חוזר לעשב דרך העלווה הירוקה לכן רסס על צמחים רעננים. רצוי לרסס לאחר ההשקיה. **אין להשתמש בטומהוק בזמן ההשקיה או כאשר יש מים עומדים בשטח.** אין לרסס ברוח. אין לרסס טומהוק כאשר הגידולים או העשבים נמצאים בתנאי עקה (כגון יובש, שרב, עודפי מים, קרה, פגיעה מקוטלי עשבים וכו').

שילובים: ניתן לשלב טומהוק עם ראונדאפ/גליפוגן במועדי הטיפול המוזכרים בהוראות השימוש, כפוף לרישויים בגידולים הנ"ל. השילוב של טומהוק עם ראונדאפ משפר את הדברת גומא הפקעים (סעידה).

טבלת השימוש:

הגידול	העשבים המודברים	הריכוז (%) או המינון (סמ"ק/ד) (סמ"ק/ד)	נפח התרסיס (לי"ד)	הערות
מטעים - מהשנה השלישית לנטיעה: אגס, אפרסמון*, אפרסק, הדסים, זית, מנגו, משמש, פיג'ואה, פקאן, שזיף, תמר, תפוח, רימון, אנונה, שקדים	אבוטילון, דטורה, רגלת הגינה, ירוקת החמור ונבטים של רחבי עלים שונים.	0.25%	20-30	מנע רחף של התרסיס לעלוות העצים. בעצי מנגו צעירים באזור בקעת הירדן אין לרסס טומהוק בתקופת הליבלוב. ראה סעיף שילובים.
	ארכובית שבטבטית, חבלבל, חנק, יבוט, הגא, פטל, סולנום זיתני, אספרגוס, יהודי נודד.	0.5%		
חוחובה	0.25%			
תירס מחוק מזן ג'ובילי ותירס למספוא בשלב 4-6 עלים בלבד.	150-120 סמ"ק/דונם			
דשא דגני בתקופת החורף בלבד: בופלו, דורבן, זני זואיסייה, פספלו, קיקיוו	0.5%			
יבוט, סולנום זיתני, הגא	150-120 סמ"ק/ד	20-10	המינון לפי רמת השיבוש ושלב התפתחות. ראה סעיף שילובים.	
לאורך פסי רכב וצדי דרכים בינעירוניות, סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז, שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות	הגא, יבוט, סולנום זיתני, פטל, חבלבל, ארכובית שבטבטית, חנק, אספרגוס וחד-שנתיים רחבי עלים המוזכרים לעיל	250 סמ"ק/ד או 0.75% בכתמים	50-30	ראה סעיף שילובים.

*אין לרסס באפרסמון בזמן לבלוב וחנטה עד לאחר קטיף ובזמן הימצאות סורי שורש מבלבים.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1581/הגה"צ/2000
 • סיווג HRAC: O
 • דרגת רעילות IV-מסוכן
 • אריזות: 1, 5 ל'
 • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן