

קלאץ' CLUTCH

גרגרים רחפים

מכיל: Clothianidin 50%

כללי:

קוטל חרקים בעל מנגנון ניאוניקוטינואיד, מדביר מגוון רחב של מזיקים בירקות, גידולי שדה, מטעים, פרס, כרם ופרחים. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע.

הערות לטיפול:

מנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים. כדי למנוע התפתחות תנגודת לתכשיר יש לטפל חליפות בתכשיר זה ובתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. אין לרסס בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה, שרב וכאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע, מנזק מקוטלי עשבים ועוד. התכשיר רעיל לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים. יש להכניס כוורות של דבורים רק לאחר שבועיים מיום הטיפול.

| הגידול | המזיק | המינון או הריכוז | נפח הריסוס (ל'/ד') | אופן היישום | ימי המתנה לפני קטיף |
|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| אפרסק, נקטרינה, משמש* | קפנודיס (טיפול בבוגרים) | 50 גרם/ד' | 100 | ריסוס | 30 |
| תפוח, אגס* | עש תפוח | 0.05% | מעל 100 | | 30 |
| גפן | ציקדה ירוקה | | | | 30 |
| גפן | קימחית הגפן | | | | 30 |

| הגידול | המזיק | המינון (גרם/דונם או %) | נפח הריסוס (ל'/ד') | אופן היישום | ימי המתנה לפני קטיף |
|------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| גפן | קימחית הגפן | 1 גרם/גפן | - | הגמעה לבית השורשים באמצע מנת ההשקיה. | 3 |
| אגס* | פסילת האגס | 100-50 גרם/ד' | 100 ליטר/דונם | ריסוס | 30 |
| | | 0.1%-0.05% | מעל 100 ליטר/דונם | | |
| אגס | פסילת האגס | 2 גרם/עץ | | יישום יעשה במשבת הגמעה משקית, במהלך ההשקיה ובחציה השני. יש להקפיד על מרווח השקיה של לא פחות מיום לפני היישום ואחריו על מנת להבטיח את קליטת התכשיר בצמח בעילות | 7 |
| גזר | ציקדה ירוקה | 50 גרם/ד' | 10-40 | ריסוס | 14 |
| שקד* | צרעת השקד** | 0.05% | ריסוס עם נפח גבוה, 150-200 ליטר/ד'. | עדיף לרסס עם מפוח. | 15 |
| אגוזי אדמה | מלדרה מטרידה | 50 גרם/ד' | 50 | ריסוס כל 20 יום משלב של צימוח צעיר | 45 |
| פיטוספורום | כנימה קמחית ארוכות זנב | 0.05%-0.1%*** | 50-100 | ריסוס עם נפח גבוה (עד גירה) | - |

*שים לב,

הריסוס עם התכשיר עלול לפגוע באוכלוסיות של אויבים טבעיים במטע ולהגביר נוכחות של אקריות. ** מועד הריסוס ייקבע ע"י הערכת גיחות של בוגרים מפירות נגועים. *** בהתאם לעוצמת הנגיעות. **שילובים:** אין לשלב עם חומרים כל עוד אין מידע אחר.



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4049/צ/2011/הגה"צ
 • סיווג IRAC: A4
 • אריזות: 0.5 ק"ג, 2 ק"ג
 • דרגת רעילות IV - מסוכן
 • מיוצר ע"י Sumitomo Chemicals
 • משווק ע"י אדמה אגן