

הגידול	הפגע	המינון / הריכוז	נפח תרסיס ("ל"/ד')	ימי המתנה לפני קטיף	הערות
אפרסק, נקטרינה	קמחון האפרסק	0.03%	50-120	14	יישום בודד בריסוס ללא שילובים
משמש	קמחון המשמש	0.03%	50-120	14	יישום בודד בריסוס ללא שילובים
גפן	קימחון הגפן	0.03%	80-140	7	2 יישומים בריסוס במרווח 7 ימים לפחות
מנגו	קימחון המנגו	0.03%	60-150	ללא ימי המתנה	2 יישומים בריסוס בזמן הפריחה בלבד במרווח 12 ימים לפחות ללא שילובים
תפוח	גרב התפוח/קמחון התפוח	0.03%	100-200	14	2 יישומים בריסוס במרווח 7 ימים לפחות ללא שילובים
גזר	קימחון, חלפת	0.03%	25-40	7	2 יישומים בריסוס במרווח 7 ימים לפחות ללא שילובים
מלפפון	קימחון הדלועיים	30 סמ"ק/ד' 0.03%	40-85 מעל 85	3	2 יישומים בריסוס במרווח 8 ימים לפחות ללא שילובים

**מניעת עמידות:** למניעת עמידות הפטרייה לתכשיר, יש לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה. אין לרסס ברצף שני ריסוסים עוקבים עם תכשיר המבוסס על אותו מנגנון הדברה.

# SERCADIS סרקדיס

**קוטל מחלות תרכיז רחף**  
קוטל מחלות חדש מקבוצת ה- carboxamides ושייך למנגנון הפעולה SDHI. החומר הפעיל פוגע במטבוליזם של הפטרייה, עוצר את התפתחות המחלה וגם מונע הדבקות חדשות. לתכשיר פעילות טרנסלמינרית בעלה עם זרם המים. התכשיר עמיד לגשם להשגת טיפול מניעתי לאורך זמן.

מכיל: fluxapyroxad 300 g/L

## הוראות השימוש בהדרים

רסס ריסוסי מניעה או עם תחילת נגיעות לפי פירוט הגידולים והמחלות הבאים.