



GLOBUS

ลักษณะ ของเหลวละลายน้ำ

สารสำคัญ: กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 200 g/L, SL

Globus เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลายชนิดสัมผัส สำหรับกำจัดวัชพืชใบกว้างปีเดียวและวัชพืชใบกว้างข้ามปีในไม้ผลและ พืชมันฝรั่งเพื่อให้ใบแห้งก่อนเก็บเกี่ยว
กลุ่มสารออกฤทธิ์ (HRAC Code) H



เลขทะเบียนของ the Plant Protection and
Inspection Services : 4451/PP/2018

ผลิตโดย Lier ประเทศจีน

จัดจำหน่ายโดย Adama Agan, Ashdod

Batch Number อยู่บนบรรจุภัณฑ์

ห้ามใช้ในบ้านเรือน ใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้น!

หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ควบคุมพิษ: 04-7771900

ประเภทวัตถุอันตราย: วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 -

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายเลข UN - ไม่ได้จัดประเภท
ขนาดบรรจุ: 5 ลิตร



คำเตือน:

เป็นอันตรายหากกลืนกินหรือสูดดมเข้าไป ระวังเคืองต่อดวงตา ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอันตรายต่อผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องหรือการสัมผัสสารที่มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัย:

หลีกเลี่ยงการกลืนหรือสูดดมหรือการสัมผัสถูกดวงตาหรือผิวหนังโดยตรง ขณะผสมผลิตภัณฑ์และฉีดพ่นให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม (สวมชุดป้องกันสารเคมี, หน้ากาก (EN-140) พร้อมตัวกรอง (EN-14387) ประเภท ABEK2-P3, ถุงมือ (EN-374/3), อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (EN-166), หมวกคลุมผมและรองเท้า เมื่อต้องปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามรับประทาน ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์นี้ ชำระล้างส่วนต่างๆ ของร่างกายที่สัมผัสถูกสารด้วยสบู่และน้ำ

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

หลีกเลี่ยงไม่ให้ละอองของสารปนเปื้อนไปยังบ่อปลาหรือแหล่งน้ำ ไม่เป็นพิษต่อผึ้ง

คำแนะนำการใช้ทั่วไป

การควบคุมวัชพืชข้ามปีควรพ่นก่อนวัชพืชออกดอกหรือระหว่างออกดอก สำหรับวัชพืชปีเดียวควรพ่นหลังวัชพืชงอกแล้ว สามารถกำจัดวัชพืชได้ภายใน 7-10 วันหลังพ่นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและขนาดของวัชพืช การกำจัดวัชพืชทำได้ดีเมื่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น ห้ามฉีดพ่นในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 10°C ประสิทธิภาพการกำจัดวัชพืชจะลดลงหากมีฝนตกภายใน 6 ชั่วโมง หรือมีการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ภายใน 48 ชั่วโมง ไม่ควรฉีดพ่นในสภาพลมแรงหรือลมร้อน ละอองสารสามารถสร้างความเสียหายให้กับพืชข้างเคียงโดยเฉพาะไม้ผล หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นพืชใบหรือลำต้นหรือส่วนที่เป็นสีเขียว



สำหรับฉีดพ่นใบมันฝรั่งให้แห้ง – ห้ามฉีดพ่นจนเปียก ห้ามพ่นในแปลงผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง

สำหรับการใช้ในไม้ผล - ฉีดพ่นกำจัดวัชพืชระหว่างเตรียมแปลงก่อนปลูก 3 วัน

วัชพืชที่กำจัดได้ - *Emex spinosa*, *Polygonum equistiforme*, *Aegilops* spp., *Medicago* spp., *Bromus* spp., *Silybum marianum*, *Cyperus rotundus*, *Geranium* spp., *Sorghum halepense*, *Alhagi graecorum*, *Setaria verticillata*, *Convolvulus arvensis*, *Euphorbia geniculata*, *Euphorbia prostrata*, *Desmostachya bipinnata*, *Malva* spp (partial control only), *Phalaris brachystachys*, *Phalaris paradoxa*, *Lactuca serriola*, *Sinapis arvensis*, *Diplotaxis erucoides*, *Prosopis farcta*, *Cynodon dactylon*, *Amaranthus* spp., *Amaranthus retroflexus*, *Amaranthus palmeri*, *Amaranthus blitoides*, *Ecballium elaterium*, *Stellaria media*, *Chenopodium murale*,

Sonchus oleraceus, *Cruciferae*, *Lamium amplexicaule*, *Beta vulgaris*, volunteer watermelons, *Senecio vulgaris*, *Solanum elaeagnifolium*, *Solanum nigrum*, *Heliotropium* spp, *Paspalum paspaloides*, *Tribulus terrestris*, *Carthamus* spp, *Conyza canadensis*, *Ricinus communis*, *Portulaca oleracea*, *Hordeum leporinum*, *Avena sterilis*, *Helminthotheca echinoides*

อุปกรณ์และการตรวจเทียบ

ใช้เครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชให้เหมาะสมและมีเครื่องกวาดสารละลายตลอดเวลา ใช้กรองความละเอียดขนาด 50 เมช ตรวจสอบหัวฉีดก่อนใช้งาน ใช้หัวฉีดและแรงดันในการฉีดพ่นที่เหมาะสม

การผสมสาร -

เติมน้ำลงในถังครึ่งหนึ่ง เปิดเครื่องกวาด และค่อยๆ เติมผลิตภัณฑ์ Globus ลงในถังและเติมน้ำตามปริมาณที่ต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจเครื่องกวาดทำงานตลอดการฉีดพ่น



ตารางการใช้งาน:

พืชปลูก	วัชพืชที่สามารถกำจัดได้	ปริมาณน้ำ (ลิตร/1,000 ตารางเมตร)	อัตราการใช้(มิลลิลิตร /1,000 ตารางเมตร)	% in spot applications
อาโวคาโด ลูกพลับ องุ่น ส้ม ลูกท้อ	วัชพืชปีเดียว (ใบแคบและใบกว้าง)ขนาด เล็กไม่เกิน 10 เซนติเมตร	20-30	0.25	1%
	วัชพืชปีเดียว (ใบแคบและใบกว้าง)ขนาด เล็กเกิน 10 เซนติเมตร		0.5	2%
	แห้วหมู ขนาดไม่เกิน 20 เซนติเมตร		0.3	1%
พ่นกำจัดใบมันฝรั่ง		20-30	300	

- ห้ามพ่นแปลงผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง

การทำความสะอาดอุปกรณ์
เมื่อเสร็จสิ้นการฉีดพ่นทำความสะอาดตามคำแนะนำถัดไปล้างเครื่องพ่นและชิ้นส่วนทั้งหมดด้วย
น้ำเปล่าและผงซักฟอก



การล้างอุปกรณ์

ห้ามเทสารที่เหลือจากถังพ่นลงดิน บ่อปลาหรือแหล่งน้ำสาธารณะ กำจัดสารที่เหลือตามคำแนะนำของกระทรวงรักษาสีสิ่งแวดล้อม เช่น การพ่นนอกแปลงปลูก การนำกลับมาใช้ใหม่หรือการนำไปให้หน่วยงานที่รับกำจัดสารกำจัดศัตรูพืช เช่น Ramat Hovav.

การจัดเก็บสารเคมี

ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในภาชนะที่มิดชิด ในที่ร่มและแห้ง และควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ห่างไกลจากมีมเด็กและบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เก็บให้ห่างจากอาหาร อาหารสัตว์ ปุ๋ย และเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในภาชนะบรรจุเดิมอย่างมิดชิด

การป้องกัน

เมื่อร่างกายสัมผัสกับวัตถุอันตรายให้ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่และน้ำเปล่า หลังจากฉีดพ่นให้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้า ควรซักเสื้อผ้าแยกจากชุดปกติ ควรเข้าไปในแปลงหลังจากฉีดพ่นสารไปแล้ว 12 ชั่วโมง

หากเกิดการรั่วไหล

ใช้ทรายกลบเพื่อดูดซับสาร ตักใส่ภาชนะปิดมิดชิดแล้วส่งหน่วยงานที่รับกำจัดสารกำจัดศัตรูพืช

การกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

ล้างบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วให้อย่างน้อย 3 ครั้งด้วยน้ำหรืออุปกรณ์ล้างที่มีแรงดันสูง เทน้ำล้างลงในถังพ่นเจาะและบิบทำลายบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วและกำจัดภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วพร้อมกับขยะตามบ้านเรือนทั่วไป

การปฐมพยาบาล



ในกรณีที่สัมผัสถูกดวงตา ล้างด้วยน้ำปริมาณมากโดยให้น้ำไหลผ่านดวงตาเป็นเวลา 15 นาทีและไปพบแพทย์

ล้างออกด้วยสบู่และน้ำหากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสถูกผลิตภัณฑ์และล้างด้วยน้ำปริมาณมากโดยให้น้ำไหลผ่าน

ในกรณีที่กลืนกินเข้าไปโดยบังเอิญ รีบไปพบแพทย์ พร้อมกับแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ให้แพทย์

ข้อมูลสำหรับแพทย์

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับศูนย์ข้อมูลด้านพิษวิทยาแห่งชาติ The National Center for Information on Poisoning at Rambam Hospital: 04-7771900: 04-7771900

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถควบคุมดูแลการใช้งานและสภาพต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้งานได้ ดังนั้นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตามวิธีการใช้ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ก็ตาม