



Koala SC

สารป้องกันกำจัดเชื้อราสูตรครีม ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคราแป้ง และเชื้อรา Oidiopsis ในพืชผลหลายชนิดและใช้ป้องกันกำจัดโรสนิม ส้มในพืชตระกูลส้ม

สารสำคัญ: กำมะถัน 800 g/L, SC

ทะเบียนวัตถุทางการเกษตร: 4301/PP/2015

หมายเลข UN. ไม่ระบุประเภท การจำแนกประเภทความเป็นพิษ IV —
อันตราย

ห้ามใช้ในบ้านเรือน ใช้สำหรับการเกษตรเท่านั้น!

รหัส FRAC: M 2/1

เขย่าให้ดีก่อนใช้งาน

ผลิตโดย Sulfur Mills, อินเดีย

จัดจำหน่ายโดย Adama Agan, Ashdod



ADAMA
Agan

ปริมาตรสุทธิ: 5 ลิตร

ADAMA
Agan



Kodla เป็นเป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อราประเภทสัมผัสซึ่งช่วยยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคราแป้งและเชื้อรา Oidiopsis ในพืชผลหลายชนิดเพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพ ควรพ่นป้องกันหรือพ่นเมื่อเริ่มพบอาการของโรค หรืออาจพ่น Kodla หลังจากเกิดโรคแล้ว ฉีดพ่นตามคำแนะนำและตารางการฉีดพ่น

คำเตือน:

อันตรายหากกลืนกิน ระคายเคืองต่อดวงตา ผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย:

เมื่อต้องใช้ผลิตภัณฑ์และระหว่างพ่นสาร ควรสวมถุงมือป้องกันสารเคมี (EN3/374-) อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (EN166-) และหน้ากากป้องกันใบหน้า (EN140-) พร้อมด้วยตัวกรอง (EN14387-) ประเภท ABEK-P3 เมื่อต้องปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์นี้ สวมใส่เสื้อผ้าชุดทำงานที่ปิดมิดชิด หมวกที่ปกคลุมเส้นผม และรองเท้าปฏิบัติงาน ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์นี้ หลีกเลี่ยงการกลืนกินหรือสูดดมสารนี้เข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกดวงตาหรือผิวหนังโดยตรง

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นหรือการปนเปื้อนลงในน้ำ ไม่เป็นพิษต่อผึ้ง

อุปกรณ์และการตรวจเทียบ:

ใช้เครื่องพ่นที่เหมาะสมกับการใช้ป้องกันกำจัดเชื้อรารวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานตลอดช่วงเวลาที่พ่นสาร

ใช้กรองขนาดความละเอียด 50 เมช ปรับอัตราการไหลของหัวฉีดก่อนใช้งาน ปรับหัวฉีดและแรงดันให้เหมาะสม

การผสมสาร:

เขย่าขวดก่อนใช้เติมน้ำลงในถังพ่นครึ่งหนึ่ง คนและเติมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการในขณะที่คน เติมน้ำให้ได้ตามอัตราและคนต่อเนื่องจนกว่าจะพ่นเสร็จ



คำแนะนำการใช้ทั่วไป

ควรพ่นป้องกันก่อนการเกิดโรค ฉีดพ่นทุก 14-7 วัน และพ่นให้ทั่วทั้งต้น ห้ามพ่นในสภาพอากาศไม่เหมาะสม (หนาวเย็น เป็นน้ำแข็ง คลื่นความร้อน) หรือเมื่อพืชอยู่ในภาวะเครียดจากความหนาวเย็นเป็นน้ำแข็ง ดินที่มีน้ำขัง หรือได้รับผลกระทบจากสารกำจัดวัชพืช หรืออื่นๆ ห้ามพ่นในสภาพที่อุณหภูมิเกิน 30 องศา ห้ามพ่นในขณะที่มีลมแรง และหลีกเลี่ยง ไม่ให้ละอองปลิวไปยังพืชข้างเคียง

ตารางการใช้งาน

เพื่อให้แน่ใจว่าพ่นสารละลายให้ทั่วทั้งต้น

พืชผล	โรค	อัตราการใช้	ปริมาณน้ำ (ลิตร/ดุนัม)	PHI (วัน)	คำแนะนำ
พริกไทย มะเขือม่วง	Oidiopsis taurica (เชื้อราสาเหตุของโรคราแป้ง)	0.75 %	100-50	3	
แครอท	Erysiphe heraclei DC., Fl. & Crypt. (โรคราแป้ง)	175-120 มล./ดุนัม	40-15	3	อัตราการใช้ ขึ้นอยู่กับการระบาด
องุ่น	Erysiphe necator (โรคราแป้ง)	0.5 %	150-100	3	ปริมาณน้ำที่ใช้ขึ้นอยู่กับการพ่น ห้ามฉีดพ่นในระยะดอก
พืชตระกูลส้ม	Phyllocoptruta oleivora (ไรสนิมส้ม)	0.57 %	500-300	3	เพื่อให้แน่ใจว่าพ่นสารละลายให้ทั่วทั้งต้น หากมีการใช้สารประเภทน้ำมันต้องเว้นระยะการพ่นมากกว่า 1 เดือน หากพ่นสารไปแล้ว ต้องเว้นระยะมากกว่า 1 เดือนจึงจะพ่นสารประเภทน้ำมันได้

การผสมกับสารอื่น: ไม่แนะนำให้ผสมกับสารอื่น



หลังการใช้งาน:

การทำความสะอาดอุปกรณ์:

เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ล้างอุปกรณ์ทั้งหมดให้สะอาดด้วยน้ำ หลังจากล้างถังฟ้นแล้ว ล้างปั๊ม ท่อ และหัวฉีดด้วยน้ำผสมผงซักฟอกโดยการเปิดปั๊มและฉีดฟ้นผ่านหัวฉีด ล้างถังอีกสองรอบ ระวังอย่าให้น้ำล้างไหลเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกชลประทานหรือน้ำดื่ม อ่างเก็บน้ำ และบ่อปลา

ผู้ใช้งานหลังฟ้น: อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้ามซักเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานร่วมกับเสื้อผ้าอื่นๆ ทิ้งไป ให้ซักเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกต่างหาก

การเข้าแปลงอีกครั้ง: หลังจากน้ำยาแห้งแล้ว 24 ชั่วโมง สำหรับเรือนกระจกและอุโมงค์ทางเดินปล่อยให้แห้ง 12 ชั่วโมงก่อนเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง

วิธีเก็บรักษา: ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในภาชนะที่มิดชิด ในที่ร่มและแห้ง และควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ห่างไกลจากมือเด็ก และบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เก็บให้ห่างจากอาหาร อาหารสัตว์ ปุ๋ย และเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในภาชนะบรรจุเดิมอย่างมิดชิด

การหกหล่น: ชับน้ำยาที่หกด้วยทราย และเก็บรวบรวมโดยใช้ที่โกยผงและไม้กวาดใส่ลงในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดและนำไปทิ้งในสถานที่กำจัดยาฆ่าแมลงที่ขึ้นทะเบียนไว้

การกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว:

ล้างบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วให้ได้อย่างน้อย 3 ครั้งด้วยน้ำหรืออุปกรณ์ล้างที่มีแรงดันสูง เทน้ำล้างลงในถังฟ้น เจาะและบีบทำลายภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วและกำจัดภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วพร้อมกับขยะตามบ้านเรือนทั่วไป



การปฐมพยาบาล

ในกรณีที่สัมผัสถูกดวงตา ล้างด้วยน้ำปริมาณมากโดยให้น้ำไหลผ่านดวงตาเป็นเวลา 15 นาทีและไปพบแพทย์

ในกรณีที่กลืนกินเข้าไปโดยบังเอิญ รีบไปพบแพทย์ พร้อมกับแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ให้แพทย์

ล้างออกด้วยสบู่และน้ำหากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสถูกผลิตภัณฑ์ และล้างด้วยน้ำปริมาณมากโดยให้น้ำไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที

ข้อมูลสำหรับแพทย์:

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับศูนย์ข้อมูลด้านพิษวิทยาแห่งชาติ: 04-7771900

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถควบคุมดูแลการใช้งานและสภาพต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้งานได้ ดังนั้นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตามวิธีกำหนดยี่ห้อข้างต้นหรือไม่ก็ตาม