



# Nechushtan

สารป้องกันกำจัดเชื้อราสูตรครีม ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชต่างๆ ในพืชผลหลายชนิด  
ผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันการเกิดโรคเท่านั้น ไม่สามารถกำจัดโรคที่เกิดขึ้นแล้วได้

สารสำคัญ: สารประกอบทองแดง 190 g/L, SC (ไตรเบสิก ซัลเฟอร์ 340 g/L)

ทะเบียนวัตถุทางการเกษตร: 4134/PP/2013

ทะเบียนวัตถุเกษตรอินทรีย์: 7462/PP/2013

หมายเลข UN 3082

การจำแนกประเภทความเป็นพิษ IV — อันตราย รหัส FRAC: M


เขย่าให้ดีก่อนใช้งาน

ห้ามใช้ในบ้านเรือน ใช้สำหรับการเกษตรเท่านั้น

ผลิตโดย Nufarm, อิสราเอล

จัดจำหน่ายโดย Adama Agan, Ashdod

คำเตือน อันตรายหากกลืนกิน



FUNGICIDE

# ADAMA

## ปริมาตรสุทธิ: 5 ลิตร



### คำเตือน:

อันตรายหากกลืนกิน

### ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย:

เมื่อต้องใช้ผลิตภัณฑ์และระหว่างพ่นสาร ควรสวมถุงมือป้องกันสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ชุดทำงานที่ปิดมิดชิด และรองเท้าปฏิบัติงาน ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์นี้ หลีกเลี่ยงการกลืนกิน สูดดมสารนี้เข้าไป หรือสัมผัสถูกดวงตาหรือผิวหนังโดยตรง

### ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

เป็นพิษอย่างมากต่อปลาและสัตว์น้ำ อาจส่งผลกระทบร้ายแรงในระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมในน้ำได้ หลีกเลี่ยงละอองปลิวลงสู่แหล่งน้ำ เป็นพิษต่อผึ้งเล็กน้อย

### อุปกรณ์และการตรวจเทียบ:

ใช้เครื่องพ่นที่เหมาะสมกับการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานตลอดช่วงเวลาที่พ่นสาร ใช้กรองขนาดความละเอียด 50 เมช ปรับอัตราการไหลของหัวฉีดก่อนใช้งาน ปรับหัวฉีดและแรงดันให้เหมาะสม

### การผสมสาร:

เขย่าขวดก่อนใช้เติมน้ำลงในถังพ่นครึ่งหนึ่ง คนและเติมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการในขณะที่คน เติมน้ำให้ได้ตามอัตราและคนต่อเนื่องจนกว่าจะพ่นเสร็จ



คำแนะนำการใช้ทั่วไป

ควรพ่นก่อนพบโรค ทุก 14-7 วัน และพ่นให้ทั่วทั้งต้น ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณที่มีการฉีดพ่นจนกว่าจะครบ 3 สัปดาห์หลังการพ่น ห้ามพ่นในสภาพอากาศไม่เหมาะสม (คลื่นความร้อน หนาวเย็นเป็นน้ำแข็ง หรือเมื่อพืชอยู่ในภาวะที่เครียดจากความหนาวเย็นเป็นน้ำแข็ง ดินที่มีน้ำขัง หรือได้รับผลกระทบจากสารกำจัดวัชพืช หรืออื่นๆ ห้ามพ่นในขณะที่มีลมแรง และหลีกเลี่ยงไม่ให้ละอองปลิวไปยังพืชข้างเคียง

**"มันฝรั่ง"** ปริมาณการฉีดพ่นอัตราการพ่นต่ำสุดคือ 20 ลิตร/ดุน้ำ ห่างกันไม่เกิน 7 วัน ลดระยะห่างการพ่น หากมีฝนตก น้ำค้าง หรือมีความชื้นที่ส่งเสริมการระบาดของโรคให้เพิ่มขึ้น หรือสายพ่นลूमันฝรั่งอ่อนแอต่อโรคหรืออยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีโรค (แปลงข้างเคียงหรือแปลงที่เก็บเกี่ยวแล้ว)

ตารางการใช้งาน

| พืชปลูก            | โรค                                                        | อัตราการใช้   | PHI (วัน)                  | คำแนะนำ                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| มะกอก              | <i>Spilocaeaaleaginea</i> (โรคใบจุด)                       | %0.3          | 7                          | พ่นก่อนพบอาการของโรค        |
| ส้ม                | <i>Phytophthoracitrophthora</i> (เชื้อรา Citrus Brown Rot) | 0.3 %         | 7                          | พ่นซ้ำหากมีฝนตก 200-150 mm  |
| มันฝรั่ง มะเขือเทศ | <i>Phytophthorainfestans</i> (โรคใบไหม้)                   | 300 มล./ดุน้ำ | 7                          | ดูคำแนะนำการใช้ใน"มันฝรั่ง" |
| องุ่น              | <i>PlasmoparaViticola</i> (โรคราน้ำค้าง)                   | %0.3          | 7                          | ฉีดพ่นจนหมด                 |
| เนคทารีน ลูกพีช    | <i>Taphrinadeformans</i> (โรคใบหิก)                        | 0.3 %         | 7                          | ฉีดพ่นจนหมดพ่นก่อนพบอาการ   |
| ลูกแพร์            | <i>Erwiniaamylovora</i> (แบคทีเรีย Fire Blight)            | %0.1          | ฉีดพ่นในช่วงออกดอกเท่านั้น | ของโรค                      |
| มะม่วง             | <i>Pseudomonas syringae</i> (Bacterial Apical Necrosis)    | %0.25         | 7                          | ฉีดพ่นจนหมด                 |



## การผสมกับสารอื่น

ในการปลูกพืชทั่วไป: ลูกแพร์ สามารถผสม Starnet ได้ มันฝรั่ง สามารถผสม Nimguard ได้

ในการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ — มันฝรั่ง สามารถผสม Nimguard ได้

## หลังการใช้งาน:

### การทำความสะอาดอุปกรณ์:

เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ล้างอุปกรณ์ทั้งหมดให้สะอาดด้วยน้ำ หลังจากล้างถึงจุดฟุ้งแล้ว ล้างบีม ท่อ และหัวฉีดด้วยน้ำผสมผงซักฟอกโดยการเปิดบีมและพ่นผ่านหัวฉีด ล้างถึงอีกสองรอบ ระมัดระวังให้น้ำล้างไหลเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก ขลประทานหรือน้ำดื่ม อ่างเก็บน้ำ และบ่อปลา

**ผู้ใช้งานหลังพ่น:** อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้ามซักเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานร่วมกับเสื้อผ้าอื่นๆ ทั่วไป ให้ซักเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกต่างหาก

**การเข้าแปลงอีกครั้ง:** หลังจากที่น่ายาแห้งแล้ว

## วิธีเก็บรักษา:

ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในภาชนะที่มิดชิด ในที่ร่มและแห้ง และควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ห่างไกลจากมือเด็กและบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เก็บให้ห่างจากอาหาร อาหารสัตว์ ปุ๋ย และเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในภาชนะบรรจุเดิมอย่างมิดชิด

## การหกหล่น:

ข้อสารที่หกด้วยทราย และเก็บรวบรวมโดยใช้ที่โกยผงและไม้กวาดใส่ลงในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดและนำไปทิ้งในสถานที่กำจัดยาฆ่าแมลงที่ขึ้นทะเบียนไว้



การกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว:

ล้างบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วให้ได้อย่างน้อย 3 ครั้งด้วยน้ำหรืออุปกรณ์ล้างที่มีแรงดันสูง เทน้ำล้างลงในถังฟ้น เจาะและบีบทำลายบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วและกำจัดภาชนะบรรจุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วพร้อมกับขยะตามบ้านเรือนทั่วไป

### การปฐมพยาบาล

- ในกรณีที่สัมผัสถูกดวงตา ล้างด้วยน้ำปริมาณมากโดยให้น้ำไหลผ่านดวงตาเป็นเวลา 15 นาทีและไปพบแพทย์
- ในกรณีที่กลืนกินเข้าไปโดยบังเอิญ รีบไปพบแพทย์ พร้อมกับแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ให้แพทย์
- ล้างออกด้วยสบู่และน้ำหากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสถูกผลิตภัณฑ์ และล้างด้วยน้ำปริมาณมากโดยให้น้ำไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที

### ข้อมูลสำหรับแพทย์:

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับศูนย์ข้อมูลด้านพิษวิทยาแห่งชาติ: 04-7771900

### ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถควบคุมดูแลการใช้งานและสภาพต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้งานได้ ดังนั้นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตามวิธีการใช้ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ก็ตาม