



Tomahawk 20 EC

สารกำจัดวัชพืชประเภทดูดซึมใช้สำหรับควบคุมวัชพืช
ใบกว้างหลังวัชพืชงอก

ประกอบด้วย Fluroxypyr 200 กรัมต่อลิตร

(meptylheptyl ester 288 g/L) EC

ที่เหลือเป็นตัวทำละลายและสารเปียกใบ



Tomahawk ส่งผลต่อพืชที่มีความไวต่อผลิตภัณฑ์ในลักษณะการออกฤทธิ์เหมือน
ฮอร์โมนที่ทำให้ใบเกิดผิดรูปร่างและหยุดการเจริญเติบโตของยอดที่แตกขึ้นใหม่
Tomahawk แทรกซึมเข้าไปในพืชผ่านใบสีเขียว และสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทั่วทั้งต้น
Tomahawk สามารถควบคุมวัชพืชได้ดังนี้ วัชพืชปีเดียวและ วัชพืชข้ามปีที่ยากต่อการ
ควบคุมตามที่ระบุในตารางการใช้งาน

ทะเบียนวัตถุทางการเกษตร: 1581/PP/2000

ห้ามใช้ในบ้านเรือน ใช้สำหรับการเกษตรเท่านั้น!

การจำแนกประเภทความเป็นพิษ IV- อันตราย

หมายเลข UN — 1993 ติดไฟได้

กลุ่มสารกำจัดวัชพืช: 0

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย Adama Agan, Ashdod

ปริมาตรสุทธิ: 5 ลิตร

ADAMA
Agan



คำเตือน:

อาจจะคายเคืองต่อผิวหนังหรือดวงตา อาจเป็นอันตรายต่อปอดหากกลืนกิน ติดไฟได้ — เก็บให้ห่างจากประกายไฟและเปลวไฟ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย:

ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ได้แก่ เสื้อผ้าชุดทำงานที่มีความยาวและขูดหมี รองเท้าและหมวกปฏิบัติงาน ถุงมือป้องกันสารเคมี (EN3/374-) และอุปกรณ์ป้องกันดวงตา (EN136-) และอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจพร้อมตัวกรอง (EN14387-) ประเภท ABEK-2P3 เมื่อต้องปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามรับประทาน ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์นี้ หลีกเลี่ยงการกลืนกินหรือสูดดมสารนี้เข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวดวงตาหรือผิวหนังโดยตรง ขำระล้างส่วนต่างๆ ของร่างกายที่สัมผัสถูกสารด้วยสบู่และน้ำ
สวมใส่ถุงมือและหน้ากากป้องกันใบหน้าเมื่อผสมสาร
ป้องกันไม่ให้สารสัมผัสผิวดวงตา และเสื้อผ้า

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม:

เป็นพิษต่อปลาและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
แวดล้อมในน้ำได้หลีกเลี่ยงการฉีดยาที่ลอยไปสู่บ่อปลาและแหล่งน้ำ
ห้ามนำใบพืชที่พ่นด้วย Tomahawk ไปเลี้ยงสัตว์ เป็นเวลา 40 วันหลังจากที่ฉีดพ่นหรือนำลัดเลียง
เข้ามาในพื้นที่ที่พ่นด้วย Tomahawk ภายใน 7 วัน ไม่เป็นพิษต่อผึ้ง

คำแนะนำการใช้ทั่วไป

ห้ามปลูกพืชในพื้นที่ที่พ่น Tomahawk ภายใน 3 เดือนที่ต้องให้น้ำแบบสปริงเกอร์เป็นเวลาหนึ่งเดือน
ก่อนปลูกพืชใหม่อีกครั้ง

Tomahawk สามารถพ่นได้ตลอดเวลา ห้ามใช้ในไม้ผล

หลีกเลี่ยงการทำให้ละอองปลิวไปยังพืชผลที่เพาะเลี้ยงอยู่ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายจาก
ผลิตภัณฑ์



Tomahawk แทรกซึมเข้าไปในพืชผ่านใบสีเขียว ใช้ได้ดีกับวัชพืชชอบน้ำ

ห้ามฉีดพ่น Tomahawk ในระหว่างการให้น้ำ เหมาะต่อการฉีดพ่นหลังการให้น้ำมากกว่า.

ห้ามฉีดพ่นในสภาพที่มีลมแรง

ห้ามฉีดพ่นเมื่อพืชหรือวัชพืชอยู่ในภาวะเครียด (แห้งแล้ง ความร้อน ดินที่มีสภาพน้ำขัง ความหนาวเย็นเป็นน้ำแข็ง หรือความเสียหายจากสารกำจัดวัชพืชอื่น)

ตารางการใช้งาน:

ปริมาณน้ำที่ใช้ในไม้ผล ใจใจบา ข้าวโพด และสนามหญ้า - 30-20 ลิตร/ดุนัม

ปริมาณน้ำที่ใช้ในการเตรียมไร่ - 20- 10 ลิตร/ดุนัม

ปริมาณน้ำที่ใช้ในพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร - 50- 30 ลิตร/ดุนัม

พืชผล	วัชพืชที่ถูกควบคุม	อัตราการใช้ ของผลิตภัณฑ์ ที่กำหนด	คำแนะนำ
ไม้ผล* อายุ 3ปีขึ้นไป: ลูกแพร์ แอปเปิ้ล แอปริคอต พืชสกุลส้ม อินทผลัม Feijoa ลูก พลับ* มะกอก มะม่วง พีแคน ลูกพลัม ทับทิม น้อยหน่า	<i>Polygonum equistiforme</i> , <i>Convolvulus spp.</i> , <i>Cynanchum spp.</i> , <i>Prosopis farcta</i> , <i>Alhagi</i> <i>maurorum</i> , <i>Rubus spp.</i> , <i>Solanum elaeagnifolium</i> , <i>Asparagus spp.</i> , <i>Tradescantia spp.</i>	%0.5	หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นที่ใบของ ต้นไม้ ห้ามฉีดพ่นในสวน มะม่วงที่ยังไม่สุกใน ห้าม ใช้ในมะม่วงที่ยังเล็กอยู่ ในJordan Valley เมื่อยังโตไม่ เต็มที่ ดูย่อหน้าการผสมกับสารอื่น



พืชผล	วัชพืชที่ถูกระบุ	อัตราการใช้ ของผลิตภัณฑ์ ที่กำหนด	คำแนะนำ
	<i>Abutilon spp.</i> , <i>Datura spp.</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Ecbalium elaterium</i> และ วัชพืชใบกว้างที่กำลัง เติบโต	%0.25	
โจโจ้บา	<i>Convolvulus spp.</i> , <i>Prosopis farcta</i> , <i>Solanum elaeagnifolium</i> , <i>Polygonum equistiforme</i> , <i>Abutilon spp.</i> , <i>Datura spp.</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Ecbalium elaterium</i> และ วัชพืชใบกว้างที่กำลัง เติบโต	%0.25	Tomahawk เป็นสารชนิด ประเภทเลือกทำลายสำหรับ โจโจ้บา ใช้ในอัตรานี้จะไม่ ทำให้ใบของพืชปลูกเสียหาย



พืชผล	วัชพืชที่ถูกระบุ	อัตราการใช้ ของผลิตภัณฑ์ที่ กำหนด	ความคิดเห็น
Jubilee Sweet Corn และ ข้าวโพดอาหารสัตว์ ช่วงที่ มีใบ 6-4 ใบเท่านั้น	<i>Convolvulus spp.</i> , <i>Prosopis farcta</i> , <i>Solanum elaeagnifolium</i> , <i>Xanthium</i> <i>spp.</i> , <i>Abutilon spp.</i> , <i>Datura spp.</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Ecbalium</i> <i>elaterium</i> และวัชพืชใบกว้างที่กำลัง เติบโต	150-120 มล./ ดุน้ำ	ฉีดพ่นทันทีหลังจากให้น้ำ
สนามหญ้าในฤดูหนาว เท่านั้น: Buffalo, Durban, Zoysia, Paspalum, Kikuyu	<i>Oxalis spp.</i> , <i>Euphorbia spp.</i> , <i>Medicago spp.</i> <i>Polygonum spp.</i> และวัชพืชใบกว้างที่กำลังเติบโต	%0.5	การฉีดพ่นให้ลอยไปยังพืช ที่เพาะปลูกใกล้ทุ่งหญ้า อาจก่อให้เกิดความเสีย หายรุนแรง
การเตรียมไร่ก่อนหว่านข้าว สาลี. สูงสุดหนึ่งเดือนก่อน การหว่านข้าวสาลี ยกเว้น ในดินทรายเมื่อมีการฉีดพ่น Tomahawk นานถึง 3 เดือน ก่อนการหว่านข้าวสาลี	<i>Prosopis farcta</i> , <i>Alhagi maurorum</i> , <i>Solanum elaeagnifolium</i>	150-120 มล./ ดุน้ำ	อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับ ปริมาณวัชพืชและการ เติบโตของวัชพืช ดูย่อน้ำ การผสมกับสารอื่น
พื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร	<i>Polygonum equistiforme</i> , <i>Convolvulus spp.</i> , <i>Cynanchum</i> <i>spp.</i> , <i>Prosopis farcta</i> , <i>Alhagi</i> <i>maurorum</i> , <i>Rubus spp.</i> , <i>Solanum</i> <i>elaeagnifolium</i> , <i>Asparagus spp.</i>	205 มล./ดุน้ำ หรือ %0.75 ฟัน เป็นจุด	ดูย่อน้ำ การผสมกับสาร อื่น

* ห้ามฉีดพ่นลูกพลับในระหว่างการแตกตาหรือการติดผล จนกว่าจะเก็บผลผลิตเสร็จและในระยะแตก
ใบอ่อน



การผสมกับสารอื่น:

Tomahawk เข้ากันได้ดีกับ Roundup / Glyphogan ตามคำแนะนำข้างฉลากของทั้งสองผลิตภัณฑ์ การผสม Tomahawk + Roundup/Glyphogan จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการควบคุมหัวหญ้าCyperus rotunda อุปกรณ์และการตรวจเทียบ

Tomahawk สามารถใช้ร่วมกับเครื่องพ่นทั่วไป ซึ่งมีเครื่องผสมและแขนพ่นพร้อมด้วยหัวฉีดรูปพัด ใช้รองความละเอียดขนาด 50 เมช ตรวจสอบหัวฉีดก่อนใช้งานใช้หัวฉีดและแรงดันในการฉีดพ่นที่เหมาะสม ในขณะที่ฉีดพ่น หลีกเลี่ยงการพ่นซ้ำที่เดิม พ่นอยู่ที่ที่เป็นต้น ป้องกันการรั่วไหลและการหยด ของสาร

การผสมสาร:

เติมน้ำลงในถังพ่นครึ่งหนึ่ง เปิดเครื่องกวน และค่อยๆ เติมผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ต้องการและเติมน้ำตามเมื่อผสมกับ Roundup / Glyphogan ให้เติมลงไปเป็นลำดับท้ายสุด

หลังการใช้งาน

การทำความสะอาดอุปกรณ์:

เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ทำความสะอาดอุปกรณ์ตามคำแนะนำวิธีการใช้ในย่อหน้าถัดไป หลังจากนั้น ล้างหัวฉีดและชิ้นส่วนทั้งหมดด้วยน้ำและผงซักฟอก กำจัดน้ำล้างตามคำแนะนำ

การกำจัดน้ำล้าง:

ห้ามกำจัดน้ำล้างหรือส่วนที่เหลือของน้ำยาฉีดพ่นลงในดิน บ่อปลา หรือแหล่งน้ำ กำจัดน้ำล้างตามคำแนะนำของกระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น ฉีดพ่นให้หมดในแปลง นำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้บริสุทธิ์กำจัดทิ้งโดยการระเหย ณ สถานที่กำจัดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ Ramat Hovav

ผู้ใช้งานหลังพ่น: ก่อนรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่ ให้ล้างมือและส่วนต่างๆ ของร่างกายที่สัมผัสถูกสาร ชักเสื้อผ้าทำงานแยกต่างหาก

การเข้าแปลงอีกครั้ง: หลังจากสารแห้งแล้ว



วิธีเก็บรักษา: ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในภาชนะที่มิดชิด ในที่ร่มและแห้ง และควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ห่างไกลจากมือเด็ก และบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เก็บให้ห่างจากอาหาร อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์ และ ยาฆ่าแมลงอื่นๆ เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในภาชนะบรรจุเดิมอย่างมิดชิด

การทกล่อน: ปกปิดด้วยทรายและเก็บรวบรวมในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดและนำไปทิ้งในสถานที่กำจัดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ขึ้นทะเบียนไว้

การกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว:

ล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ด้วยน้ำเปล่า 3 ครั้งหรืออุปกรณ์ล้างที่มีแรงดันสูง และเติมน้ำล้างในถังฟ้น เจาะ บีบทำลาย และกำจัดภาชนะบรรจุเปล่าในขยะตามบ้านเรือนทั่วไป

การปฐมพยาบาล:

ล้างด้วยสบู่และน้ำเมื่อสัมผัสผิวหนัง

ในกรณีที่สัมผัสผิวหนังดวงตา ล้างด้วยน้ำปริมาณมากโดยให้น้ำไหลผ่านดวงตาเป็นเวลา 15 นาทีและไปพบแพทย์

ในกรณีที่กลืนกินเข้าไปโดยบังเอิญ รีบไปพบแพทย์ พร้อมกับแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ให้แพทย์

ข้อมูลสำหรับแพทย์: หมายเลขโทรศัพท์สำหรับศูนย์ข้อมูลด้านพิษวิทยาแห่งชาติที่โรงพยาบาล Rambam คือ 04-7771900

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถควบคุมดูแลการใช้งานและสภาพต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้งานได้ ดังนั้นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจึงไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตามวิธีการใช้ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ก็ตาม