

קצת עליינו, שוק מקומי אדמה אגן

הנבחרת שלנו מונה אנשי שדה, מנהלי שיווק ומכירות, מנהלי פיתוח ורישיון ועוסקת בפיתוח, אישור, רישום שיווק ומכירה של תכשירים להגנת הצומח, מווסטי צמיחה ותכשירים לריפוי מחלות חסור ומשתחים.

ההיסטוריה של חברותנו החלה בארכובה יזמים צעירים שתשוקתם לכימיה הביאה להשקחת חברת הממלאת תפקיד חיוני בעיצוב התעשיות הכימיות והחקלאיות החלוציות בישראל והפכה לכוכב בינלאומי הנודע בשם ADAMA. כיום, ADAMA חברת בקבוצת Syngenta, הציגנית הגדולה בעולם של ת使用权ות חקלאיות. חברת אדמה אגן פועלת לספק מענה לחיקלאי ישראל במגון האתגרים העומדים בפניהם בתחום הגנת הצומח.

מעבר לתכשירים אינטראקטיביים מבית אדמה – אגן מייצגת חברות בינלאומיות מובילות בתחום הגנת הצומח ומושבות מגוון תכשירים מותוצרת בינהן: NIPPON SODA (יפן), SHIN ETSU (יפן), OAT Agrio Co (יפן), BASF (גרמניה), SANKYO (יפן), ALZCHEM (גרמניה), Nouryon Functional Chemical (הולנד), NUFARM (צՐפת), MOMENTIVE (אורה"ב), TAMINCO (בלגיה) ו-GOWAN (אנגליה) ועוד, במטרה להגדיל את מגוון הפתרונות והפתרונות המותאמים לחקלאות ברחבי העולם העומדים בתकני איכות גלובליים.

מאז הקמתה ועד היום חברת אדמה אגן שמה לה למטרה לפתח תכשירים מתקדמים שיתאים לשיטת הדבירה המשולבת (IPM) בעלי רעלות נמוכה לבעל-דם חמ ולסבבה. במקביל החברה שוקצת על הרחבת סל המוצרים לחקלאות ארגנטינית והדבירה יורקה, תוך שמירה על איכות מתמדת, שירות אמין ומtan פתרונות מדוקים.

המדריכים האזרחיים ואנשי השדה של החברה החקלאית ישמשו להדריך כל חקלאי וכל מדובר בתחום התוכשייה החברה. קטלוג זה מכיל מידע שימושי על מרבית מוצרינו והוא מעודכן לשנת 2023-2022. לפני השימוש יש לקרוא את ההוראות המופיעות בתווית התכשירים.



חפשו אותנו בפייסבוק ואינסטגרם אדמה אגן-[Agan](#)  
www.adama.com/israel-agan/he 

שימוש נכון בחומרי הדבורה

הוראות כליליות ואמצעי בטיחות

הנוטה התרסיס: יש להזכיר את התכשיר לריסוס לפי הנקודות בתווית. באופן כללי, ממלאים את מכל המרסס חצי במים נקיים ומפעלים את המערבל. תכשייר תרכיז רחיף – מנערים היבט את המכל לפני הפתיחה. תרכיזים רחיפים וגרגירים רחיפים מושגים ישר למכל הריסוס. אבקזות רחיפות – מכינים רחיף עם מים בכלי קטן נפרד ומוסיפים למכל המרסס. למניעת קצף מוסיפים תכשירים מקציפיים כמו ראננדאפ/גליפיגן.

בסיסם העבודה יש לטפל בשאריות התרסיס כפי שכתוב בתווית. יש לשטוף את כל המערכת בהתאם להנקודות. יש להתרחץ במים ושוב, להחלף את גדי העבודה ולכבסו一同 בפרד מכביסה רגילה.

יש לטפל **באריזות ריקות** לפי הנקודות בתווית. חומר הדבורה הם פרי פיתוח כימי וחקלאי שאורך שערות שנים. לרוב, התכשירים החדשניים מצטיינים ביעילות גבוהה וברעילות נמוכה לאדם ולהחי. מצד שני, רוב החומרים החדשניים רגישים לתופעה של התפתחות עמידות של הפגע או העשב. ברגע שהפגע הסתגל גנטית לתכשיר, האחrown מביך את ייעולו לעולמים. לכן על משתמש לפועל כדי למנוע התפתחות עמידות לתכשירים על ידי החלפת מגנוני פעולה של תכשירים, "שם במנון הכלא" וישום בתקילת הנגיעה.

המשתמש בחומר הדבורה צריך לזכור אחירות על עבודתו ולא לגרום נזק לעצמו, לעובדים אחרים או לסביבה. לכן מושדי החקלאות, הביריאות והעבודה עורכים את התווית ש毛病עה על כל תכשיר. קרא בעין את תווית התכשיר לפני השימוש. השימוש בתכשיר מותר בגידולים, במינונים ובאופן היישום המופיעים בתווית בלבד. אין לחזור מהוראות השימוש בתווית.

עדשה ראשונה: בהתאם לתכשיר - מופיעה על גבי התווית.
באופן כללי - במקרה של זיהום העור – שטוף במים נקיים ושובן. במקרה של מגע בעיניים – שטוף בזרם חלש של מים במשך 15 דקות. במקרה של בליעה – אין לגרום להקאה. יש לפנות מיד לרופא ולהציג לפניו את התווית.

�示ר רופא: המרכז הארצי בהרעלות בבית חולים רמב"ם: 00900-777-04

בעת הריסוס יש למנוע רוחף לגידולים שכנים ולבתוי מגורים. אסור לזהם ביריקות דגים ומקורות מים. צריך לעבוד עם כלים מכילים ולמנוע נזילותות וחיפויות מיותרות. יש להקפיד על פרטיו היישום (רישוס בעבר, נפח תרסיס מיוחד, כל' יישום ספציאלי).

כפי שמצוין על גבי התווית.

מי המתנה לפני הקטיף: למניעת שרירות חומר הדבורה מעל המותה, יש להקפיד על ימי המתנה לאחר היישום האחרון של התכשיר ולפני הקטיף.

שילובים: השימוש עם תכשירים נוספים רשותם על התווית. לעיתים יש להתייחס להשיפה של יישום של תכשיר אחד על תכשיר אחר – אפילו כאשר יש הפרש של שבוע בין הריסוסים.



תכשירי אדמה אגן לפי גידול

תכשיר	פגע	גידול
גולובוס, גליגן, גליידר, גלייפוגן, דיורוקס, טרופיגן, לגטו, מגן, סטריקן, ראנדאפ, שרודול	קוטלי עשבים	אבקודו
ורטימק, חוטי עש התפוח המכומנה	קוטלי מדיקם	
אדיגן סופר, סוויז'	קוטלי מחלות	
כנייק, בוליילקס 77-7	אחרים	
גלייפוגן, חז סופר, טרבוטרקס, ליופרד, סטריקן, פוקוס אולטרא, ראנדאפ	קוטלי עשבים	אגודי אדמה
בז, דוריבו, ורטימק, קלאז'	קוטלי מדיקם	
אדיגן סופר, אטמי אקסטרה, בוסון, בראבו, קומודור	קוטלי מחלות	
בוליילקס, איירון	אחרים	
גליגן, חז סופר, לגטו, ליופרד, פוקוס אולטרא, פנדיגן	קוטלי עשבים	בצל
מוסטנג, פרוקלים, קלאז', קראקל	קוטלי מדיקם	
אדיגן סופר, אורבגו, אטמי אקסטרה, בראבו, סיגנום, פולירם, פוליו גולד, קומודור, רידומיל גולדMZ	קוטלי מחלות	

טבלת עזר להכנת התריסים ובריכוזים שונים

(נפח ליטר)	1 ליטר	5 ליטר	10 ליטר	25 ליטר	50 ליטר	100 ליטר	250 ליטר	500 ליטר	1000 ליטר	ריכוז
0.1	0.5	1	2	10	5	25	125	250	500	100
0.2	0.2	1	2	10	5	25	125	250	500	200
0.5	0.5	1	2.5	10	5	25	125	250	500	500
0.1%	1	5	10	50	250	100	500	1000	5000	10000
0.02%	2	10	20	100	500	200	1000	2000	5000	20000
0.05%	5	25	50	250	125	50	250	500	1000	5000
0.1%	10	50	100	500	250	100	500	1000	5000	20000
0.2%	20	100	200	1000	500	200	1000	2000	10000	50000
0.5%	50	250	500	2500	1250	500	2500	5000	10000	50000
1%	100	500	1000	5000	2500	1000	5000	10000	50000	200000

תכשיר	פצע	גידול
גולובוں, גליין, גליידר, גלייפוגן, דיורקס, דינגו, טומוהוק, טרופיגן, לגטו, ליופרד, סטריך, פוקוס אולטרא, ראנדאפ	קוטלי עשבים	גרעינים
אנדיבאג, אקטראה, דוריבו, דפנדה, רטימיק, חוטי בלבול לעש תפוח, חוטי בלבול לטע הנמר, טיגר, מוספל, מטראק, מלבונק, מצ', ספיידר, קראקל, תלתן	קוטלי מדיקים	
אטמי אקסטרה, בראבו, נחשותן, נא, סוויא סטרובי, סטרונר, סגנוןם, קומודור, שמיר ארמוברייך, ברויס, בוליילאך, דורמקס, ס. ס. ס., טרייטון 100-X, סלפי סטרים	קוטלי מחלות	
גליין, גלייפוגן, ליופרד, פוקוס אולטרא, ראנדאפ	אחרים	
אקטרה, דפנדה, רטימיק, טיגר, מוספל, מלבונק, מוסטנג, ספיידר, גסוס, צ'ס, קראקל	קוטלי עשבים	דלועים
אדיגן סופר, אורבגו, אמלנד אנרג', בראבו, רבו, רידומיל גולדZM פרולקטוס, קומודור, ראנדאפ	קוטלי מדיקים	
גולובוں, גליין, גליידר, גלייפוגן, דיורקס, חץ סופר, טומוהוק, טרופיגן, לגטו, ליופרד, מגל, סטריך, פוקוס אולטרא, קרובה, שרדו'	קוטלי מחלות	
אקטרה, דוריבו, רטימיק, חוטי בלבול לעש אשכול, חוטי אשכול פלאס, מוסטנג, מוספל, מטראק, קלאץ', קראקל, תלתן	קוטלי עשבים	
אורבגו, אמלנד אנרג', נחשותן, ניקו, נא, סוויא, סטרובי, סגנוןם, קואלה דורמקס, סייפון, בוליילאך, טרייטון 100-X, 77-L, סלפי סטרים	קוטלי מחלות	הדרים
אדיגן סופר, נחשותן, ניקו, סופר��וף, סגנוןם, פולירם, קואלה	אחרים	
בוליילאך, גפרת מגן, ס.ס.ס., פריגן אקסטרה, 77-L, סלפי סטרים	קוטלי מדיקים	
גליין, גליידר, גלייפוגן, דיורקס, דינגו, טומוהוק, טרופיגן, לגטו, שרדו'	קוטלי מחלות	
חוטים לבלבול סס הנמר, טיגר, מוספל, קראקל, תלתן	קוטלי מחלות	זיה
נחשותן, סופר��וף, קומודור	קוטלי מחלות	
מג'יק, טרייטון 100-X	אחרים	

תכשיר	פצע	גידול
לינורקס, חץ סופר, פוקוס אולטרא, פיטון, פנדיגן, פרומטרקס, ריסיר	קוטלי עשבים	גזר
אקטראה, בז, דוריבו, טרויגנו, מוסטנג, מצ', קלאץ', קראקל, תלתן	קוטלי מדיקים	
אמרלד אנרג', בראבו, סוויא, סטרובי, סיגנוןם, פולירם, קואלה, קומודור, רידומיל גולדZM	קוטלי מחלות	
טרבוטרקס, ליופרד, חץ סופר, פוקוס אולטרא, ריסיר	קוטלי עשבים	
בז, מוסטנג, קראקל	קוטלי מדיקים	גידולי שדה
בראבו, סיגנוןם, קומודור, רידומיל גולדZM	קוטלי מחלות	
גולובוں, גליין, גליידר, גלייפוגן, דיורקס, חץ סופר, לגטו, מגן, סטריך,	קוטלי עשבים	
פוקוס אולטרא, ראנדאפ	קוטלי מחלות	
אקטרה, דריבו, רטימיק, חוטי בלבול לעש אשכול, חוטי אשכול פלאס, מוסטנג, מוספל, מטראק, קלאץ', קראקל, תלתן	קוטלי מדיקים	גפן
אורבגו, אמלנד אנרג', נחשותן, ניקו, נא, סוויא, סטרובי, סגנוןם, קואלה	קוטלי מחלות	
דורמקס, סייפון, בוליילאך, טרייטון 100-X, 77-L, סלפי סטרים	אחרים	
גולובוں, גליין, גליידר, גלייפוגן, דיורקס, טומוהוק, טרופיגן, לגטו, מגן, פוקוס אולטרא, סטריך, ראנדאפ, שרדו'	קוטלי עשבים	
אקטרה, חוטי אנטסיה, דוריבו, רטימיק, טיגר, מוספל, מוסטנג, פרוקליים, קלאץ', קראקל, תלתן	קוטלי מדיקים	גלעינים
אטמי אקסטרה, אמלנד אנרג', נחשותן, סוויא, סטרובי, סיגנוןם, פולירם	קוטלי מחלות	
ארמוברייך, בוליילאך, דילווט, דורמקס, טרייטון 100-X, 77-L, מג'יק, סלפי סטרים	אחרים	

גידול	פצע	תכשיר
כותנה	קוטלי עשבים	גליגן, גלייפוגן, דיאורקס, חז סופר, כותוגן, פוקוס אולטרא, פנדיגן, ראנדראפ
	קוטלי מזיקים	דוריבו, רטימק, חוטי בלבול לצחל ורוד, טיגר, מוסטנג, מוספיין, מץ'
	קוטלי מחלות	פרוקלים
	אחרים	סיגנום, פולירם
	קוטלי עשבים	אפנון, ביסו, פיקס, משטח AX
	קוטלי מזיקים	גליגן, חז סופר, ליופרד, פוקוס אולטרא
	קוטלי מחלות	אקטראה, בז, דוריבו, טיגר, מוסטנג, מוספיין, מץ', פגסוס, פרוקלים, צ'ו,
	אחרים	אקטראה, בז, דוריבו, טיגר, מוסטנג, מוספיין, מץ', פגסוס, פרוקלים, צ'ו,
	קוטלי עשבים	בראבו, פולירם, קומודור, רידומיל גולדZW
	קוטלי מזיקים	קרקל

גידול	פצע	תכשיר
חניתה	קוטלי עשבים	אטופס, אלגנט, ברומטרייל, דופלוזן, דרבוקה, טרופיגן, לגטו, מוניטורה, שרדול
	קוטלי מזיקים	קרקל
	קוטלי מחלות	אטמי אקסטרה, בראבו
	טיפולי זרעים	אקטליך, דיווידנד, סלסט טופ, סנטרינו, קרוזר
	ס. ס. ס.	ס. ס. ס.
	קוטלי עשבים	גליגן, טרובוטרקס, פוקוס אולטרא, ריסר
	קוטלי מזיקים	קרקל
	קוטלי מחלות	אטמי אקסטרה
	קוטלי עשבים	חז סופר, טרובוטרקס, ליופרד, מגן, פוקוס אולטרא, ריסר
	קוטלי מזיקים	קרקל

חמצה	פצע	תכשיר
חמצה	קוטלי עשבים	אטמי אקסטרה, בראבו, קומודור, סיגנום, רידומיל גולדZW
	קוטלי מזיקים	קרקל
	קוטלי מחלות	אטמי אקסטרה
	קוטלי עשבים	חז סופר, קומודור, טרויינו, מוסטנג, מוספיין, מילבנק,
	קוטלי מזיקים	קרקל
	קוטלי מחלות	אטמי אקסטרה, בראבו, קומודור, סיגנום, רידומיל גולדZW
	קוטלי עשבים	חז סופר
	קוטלי מזיקים	אנדיבאג, אקטראה, דפנדר, רטימק, טיגר, מוסטנג, מוספיין, מייטוואט, מילבנק, צינקטו אלפא, ספידר, פגסוס, קרקל
	קוטלי מחלות	אדיגן סופר, אורבגנו, אמරולד אנרג', בראבו, טאצ'יגן, ניקון, נא, סוויז'
	בולייל AX, סלפי סטרים	סטרובו, סיגנום, פרולקטווס, קומודור, רידומיל גולדZW

חציל	פצע	תכשיר
חציל	קוטלי מחלות	אדיגן סופר, אטמי אקסטרה, נא, סוויז', סיגנום, פרולקטווס, קוала
	קוטלי עשבים	אנדיבאג, אקטראה, דפנדר, רטימק, טיגר, מוסטנג, מוספיין, מייטוואט,
	קוטלי מזיקים	מילבנק, צינקטו אלפא, ספידר, פגסוס, קרקל
	חץ סופר	
	קוטלי מחלות	
	קוטלי עשבים	
	קוטלי מזיקים	
	קוטלי מחלות	
	בולייל AX, סלפי סטרים	
	קוטלי מחלות	

תכשיר	פגע	גידול
פוקס אולטרא, גילגן	קוטלי עשבים	פרחים
אקטורה, בז, דפנدر, רטימק, טיגר, מוסטנג, מוספיקן, מלבנוק, מצ', ספיידר, פגסוי, פרוקליים, קללאץ, קראקל	קוטלי מדיקים	
אדיגן סופר, אטמי אקסטרה, בראבו, סוויז', סטרובי, סיגנות, רידומיל גולדزم, רידומיל גולדzm	קוטלי מחלות	
בוליכל CH, בוסן, מג'יק, 77-L, סלפי סטרים	אחרים	
פוקס אולטרא, חז' סופר, פרומטרכס, רייסר	קוטלי עשבים	
אקטורה, בז, רטימק, מוספיקן, מצ', ספיידר, פרוקליים, צ'ס, קראקל	תבלינים	
אטמי אקסטרה, בראבו, סוויז', סיגנות, רבוס, רידומיל גולדzm	קוטלי מחלות	תירוע
אטונקס, ברומטורייל, גלייפוגן, טומוהוק, ראנדאפ, אוברטוף, אוניביג, אקטורה, בז, דוריבו, דפנדר, רטימק, חוטי טוטה, אבסולטה, טרויגן, מוסטנג, מוספיקן, מלבנוק, מינקטו אלפא, מצ', ספיידר, פגסוי, פרוקליים, קראקל	קוטלי מדיקים	תות שדה
אדיגן סופר, אטמי אקסטרה, אטמי ארגני, בראבו, תאצ'יגראן, נחושתן, נא, סוויז', סופר��ופ, סיגנות, פולוי גולד, פולירם, פרולקטוס, קומודור, רבוס, רידומיל גולדzm	קוטלי מחלות	תפקיד
ח' סופר, ליאופרד, פוקס אולטרא	בוליכל CH, סלפי סטרים	אחרים
אקטורה, בז, דפנדר, רטימק, מצ', פרוקליים, קראקל	קוטלי עשבים	פלפל
בראבו, סטרובי, סוויז', סיגנות, פרולקטוס, צ'ס	קוטלי מדיקים	
גלוובס, לינורקס, חז' סופר, פוקס אולטרא, פיטון	אדיגן סופר, נא, סוויז', סיגנות, קואלה	
אקטורה, בז, דוריבו, רטימק, מוסטנג, מוספיקן, מיטויאט, מלבנוק, מצ', ספיידר, פגסוי, פרוקליים, צ'ס, קראקל	בוליכל CH, סלפי סטרים	
אדיגן סופר, אטמי ארגני, בראבו, נחושתן, סיגנות, פולוי גולד, פולירם, קומודור, רבוס, רידומיל גולדzm	אחרים	

תכשיר	פגע	גידול
גילגן, גליידר גלייפוגן, דיאורקס, טומוהוק, לגטו, סטריך, ראנדאפ	קוטלי עשבים	מנגו
אקטורה	קוטלי מדיקים	
אטמי אקסטרה, אטמי ארגני, נחושתן, סוויז', סופר��ופ, סטרובי, קואלה	קוטלי מחלות	
איירוגן, דורמקס, בוליכל CH, 77-L	אחרים	
gilgen, חז' סופר, ליאופרד, מונטור, פוקס אולטרא, פיטון	קוטלי עשבים	
אוברטוף, אוניביג, אקטורה, בז, דוריבו, דפנדר, רטימק, חוטי טוטה, אבסולטה, טרויגן, מוסטנג, מוספיקן, מלבנוק, מינקטו אלפא, מצ', ספיידר, פגסוי, פרוקליים, קראקל	קוטלי מדיקים	
אדיגן סופר, אטמי ארגני, בראבו, תאצ'יגראן, נחושתן, נא, סוויז', סופר��ופ, סיגנות, פולוי גולד, פולירם, פרולקטוס, קומודור, רבוס, רידומיל גולדzm	קוטלי מחלות	עגבניה
ח' סופר, ליאופרד, פוקס אולטרא	בוליכל CH, סלפי סטרים	
אקטורה, בז, דפנדר, רטימק, מצ', פרוקליים, קראקל	קוטלי עשבים	
אדיגן סופר, נא, סוויז', סיגנות, קואלה	בוליכל CH, סלפי סטרים	
אקטורה, בז, דורibo, רטימק, מוסטנג, מוספיקן, מיטויאט, מלבנוק, מצ', ספיידר, פגסוי, פרוקליים, צ'ס, קראקל	קוטלי מדיקים	

קיצור אנגלית	קיצור עברית	שם תוארית
RB	פנ	פטיאן
GB	פג	פתחון גרגרי
AB	פע	פטיאן גרענים
CB	פם	פטיאן מרוץ'
WF		פטיטים
OD	תשам	תרחיף שמן
OL	שן	שמן
SE	רת	תחליב רחיף
FS	תז	תרחיף זרעים
E	תח	תחליב
EW	תש	תחליב שכן בכים
EC	תמי	תרכיז מתחליב
EO	תוי	תחליב מים בשמן
SL	תונ	תרכיז נוזלי
CS	תק	תרחיף קפסולות
SC	תר	תרכיז רחיף
DC	תפ	תרכיז תפוזרי

קיצור אנגלית	קיצור עברית	שם תוארית
SP	אכ	אבקה מסיסה
WP	אר	אבקה רטיבה
DP	אב	אבקה
AE	אל	ארוסל
GR	ג	גרגרים
GA	גץ	גאץ
GL	גל	ג'ל
SG	גמ	גרגרים מסיסים
WG	גר	גרגרים רחיפים
TC	חט	חומר טכני
GE	חג	חומר משחרר גאץ
TB	טמ	טבליות מסיסות
PA	מש	משחה
L	NEL	נוֹזָל
UL	נד	נפח צער ביתר
KN	עַק	עירפול קָר
PR	פת	פתילים

הנבחרת שלנו

חדרה ועמק יזרעאל
אופיר יואל
052-6080361



רhoneot, השרון
ובקעת הירדן
ASF קופל
052-6080404



נגב צפוני ומערבי
מתניה אהרון
052-6080106



לכיש ונגב מזרחי
איתי לקס
052-6080114



מנהל מכירות צפון
גבי קופלמן
052-6080039



מנהל אזור המרכז
ומגזר עברי
מוראץ מסארווה
052-6080042



גליל עליון ורמת הגולן
אלמוג אברהם
052-6080380



עמק בית שאן וגליל תחתון
ינון גוזובסקי
052-6080251



חוֹף כְּרֶמֶל, עַמְקָן
הִרְדֵּן וְגַלְיל מִעָרֵבִי
שָׂקָד יִשְׂרָאֵלִי
052-6080302



מנהל רישי
ד"ר יעל גולני שביב
052-3350654



מנהל תברואה
רפִּי חַפְּצָן
052-6056047



מתאמת רכש ולוגיסטיקה
שי מזרחי
054-6927119



מנהל מכירות דרום
נדב דוד
052-6080350



חפשו אותנו בפייסבוק ואינסטגרם אדמה אגן-Chopan
www.adama.com/israel-agan/he

מנהל שוק מקומי
די דגן
052-6080306



מנהל פיתוח
צבי זידמן
052-6056107



מנהל קשרי לקוחות
טליז דרי
052-6082233



מנהל שיווק, פרסום
בטלי אלקריף
054-7171716



לִיכְלִי אֲדָמָה



 www.adama.com/israel-agan/he   ADAMA Agan - אדמה אגן

ATOPOS

**תרכיז מתחלב
קוטל עשבים דגניים בחיטה.**

מכיל: L/100g אולו-propargyl 25g/L Clodinafop-propargyl 1-L

כללי:

ATOPOS קוטל עשבים דגניים חד-שנתי בחיטה. בהתאם למינון,ATOPOS מADBIR שיבולת שועל, זנב שועל, מין חפורית, זון אשון ועשבים אחרים כגון קוטנדיה מדוקננת ודגןן בירות. התכשיר סיסטמי ומוצע לטיפול לאחר הצצת העשבים בחיטה. גודלית קדוקדי הצמיחה של העשב נעצרת תוך 1-2 ימים מהרישום, העלים הצעירים מצחיבים ומתים לאחר כך מתים העלים המבוגרים בהדרגה. מושך הדרישה: בין 3-6 שבועות. לATOPOS אין פעילות שרירית בקרקע וכן עשבים שייצרו לאחר הריסוס לא יודברו.ATOPOS ניתן לריסוס מהאוויר ומהקרקע.

הערות לטיפול:

אין לריסס חיטה בתנאי עקה (קירה, יובש, נזק מקטולי עשבים וכדומה). גשם היורד תוך 12 שעות מהרישום עלול לפגום בעילות הטיפול. מנע רוחף לגידולים שכנים. אין לריסס ברוח שעוצמתה 5 מ"י/שניה או יותר.

עמידות:

ישן אוכלאזיות של עשבים דגניים שפותחו עמידות לתכשירים בעלי מגנון פעללה מעקב ACCase (קבוצה A). בכל מקרה של חשש לעמידות, יש להשתמש בקוטלי עשבים בעלי מגנון פעללה אחר מכון שלא ניתן לצפות מראש את התפתחות העמידות והתרפשותה, היצרן ו/או המשווק לא נושאים באחריות כלשהי לנזקים העולמים להיגרם כתוצאה מהדבורה לא מספקת.

הוראות השימוש:

הערות	מועד הריסום המיטב (לפי גיל העשב)	נפח ריסום (ל"ד')	ה uninון (סמ"ק/ד')	העשבים המודברים	הגידול
1. הבטח כייסוי מלא של העשבים המודברים.	מגיל 3 עד גמר התבנתן בריסוס קרחע - בריסוס אוזיר- 5 ליטר/ד'*** מגיל 3 עד גמר התבנתן	בריסוס קרחע - בריסוס אוזיר- 5 ליטר/ד'*** מגיל 3 עד גמר התבנתן	60-40 60 **80-60	шибולת שועל חפורית מצוחה Ճב שועל دون אשון	חיטה רכה וקשה- משלב של 3 עד גמל התבנתן*
2. בוחיטה זן בית השיטה עלולה להופיע הצבה החולפת תוך 3-4 שבועות מהרישום לא פגיעה ביבול.					
* לשם השגת הדבירה מיטבית ולהקטנת התחרות של העשבים עם הגידול, רצוי לריסס עד גמר ההסתעפות.					
** לפיעוצמת השיבוש *** ריסוס מאוחר חייב בהיתר מוקדם מטעם השירותים להגנת הצומח ולבייקורת. יש למנוע רוחף שלATOPOS משיחות חיטה לשיחות שכנים של גידולים אחרים. אם לא ניתן למנוע רוחף כנ"ל ברישום מהאוחר יש לריסס במריסוס קרחע בלבד, תוך נקיית כל האמצעים הנדרשים למניעת רוחף.					
שילובים: ניתן לשלבATOPOS עם דופלוזן V, ברומוטריל, דרבו, אקספרט.					



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2007/גה"צ/1910
• סיווג HRAC: A • דרגת רעלות IV - מסוכן
• מיוצר ומשווק ע"י ADAMA AGRI
• ארידזוט: 1,5 ל' •

atraneX

**תרכיז ריחוף
קוטל עשבים ברני להדרכת עשבים ומניעת הצחתם**

**Atrazine 500 g/g
כללי:**

הערות	נפח התרסיס (ל'/ד')	המינון * (סמ"ק/ד')	מועד הריסוס	הגידול
להדרכת נבטים ועשבים עד גובה 5 ס"מ משלבים משטח AX ברכיך 0.5% לעשבים עד 10-15 ס"מ מוסיף טמן ב.ס.אל. ברכיך 5%***	30-10	80 - 70	קדם הצפה	גידולי שלוחין בהמטרה*: תירס מtok ותירס למספוא
		60 - 50	לאחר הצפה התריס, החל 3 עלים	גידולי שלוחין בהמטרה*: תירס מtok ותירס למספוא
		80 - 70	קדם הצפה עם הפעלה בהמטרה**	גידולי שלוחין בהשקייה בטפטוף: תירס מtok ותירס למספוא
		80 - 70	קדם הצפה לפני המטרת הנבטה	سورגים

קוטל עשבים מerbact הטריאזינים המונע הצפה ומדביר נבטים של עשבי בר חד-שנתיים עד גובה 5 ס"מ, בתירס, בכינוי סורגים, מידן, בדוחן ובפנסילריה. בין העשבים המכודברים - כינוי ירבוז (למעט ירבוז שרווע עכיד), כינוי סולנום, רגלה הגינה, חרדל השדה, מניע כף אווז, שיבולת שועל, מניע חפורית זוזן, מצליבים, לcid, דטורה, חלבוב, אבוטילן ועוד. ישנים ציומ' עשבים המכתחקקים מפעילות הטריאזינים. להדרכת עשבים מתחמקים ולקטילת עשבים קיימים גדולים יש לשלב atranek עם תכשיר מתאים המורה להידול לחיזוק ההדобраה של נבט עשבים ניתן לשלב משטח-AX ברכיך 0.5%.

הערות לטיפול:
מנע ריחוף התרסיס לגידולים שכנים. אין להעלות על שטח מרוסס בעלי חיים לרעה או לקצור עשב יrok אלא לאחר 30 ימים מהרישום. אין להאביר עשב יבש אלא לאחר 60 ימים מהרישום.

הפעלת התכשיר:
atraneX ימנע הצחת עשבים חד-שנתיים לאחר הפעלו ע"י גשם או המטרה של לפחות 20 ס"מ.

הוראות שימוש בגידול שדה:

הערות	נפח התרסיס (ל'/ד')	המינון * (סמ"ק/ד')	מועד הריסוס	הגידול
אין להשתמשatraneX בחלוקת בעל באזוריים בהם כמות המשקעים פחותה מ-400-500 מ"מ בשנה.	30-10	200-100	הכנת שטח לקראת זרעה-רסס בראשית החורף עם התחלת הגשים.	גידול בעל: תירס מtok, תירס למספוא וسورגים



מ"ס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 75/הגה"צ-278
סיווג HRAC: C • דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
אריזות: 1,5 ל' • מיצר ומשווק ע"י אדמה אגן

אלגנט ELEGANT

העשבים המודברים:
אכמיהה, בקיה, גידילן, דרדה, גזה, חבלבל, חלמית, חרדל, חרצית, כוכבית, כף אווז האשפות, כרוב החוף, נירית הקמה, סלק,
ספיח חמניות, עשנן, פרג, ציפורני חתול, קורטם, קחוון מצוי, שלח ספרדי ותלtan הארגן.

הערות	נפח תרסיס	המינון (סמ"ק לדונם)	הgidול ומועד הריסוס
מקרקע בלבד מכל: 1/g + 2,4-D ethylhexyl ester 452.4 (equivalent to 300 g/L 2,4-D acid): כללי: קוטל עשבים סיסטמי, המשלב שני מנגןוני פעולה ומיעוד להדבאת עשבים רחבי עלים לאחר הצטם בחיטה. התכשיר מכיל פולאצולאם, מקבוצת היסופולנויד טרייאזול פירimidינים (מעכב ALS) D-2,4-מקבוצת הפנוקס (הורקונול). שני החומרים הפעילים סייסטמיים, נקלטים דרך הנוף וכוברים בצמח לקדוקו הצעירה הפעילהם. כעבור 1-3 שבועות מריסוס, העשבים הרגשים מצהירים, מפסיקים לצמוח וקדוק הצעירה מת.	10-20 ל'/ד'	100	חיטה מגיל 6 עלים ועד התבנתנות מהזנים: אריאל, גidis, גדרה, גליל, בית השיטה, דאריאל, זהיר, מורג, רוטה, עומר ו-C-9.

שילובים:
אין לשלב עם תכשירים נוספים.

גידולים עוקבים לאחר הריסוס:
לקבלת הדבאה עיליה יש לריסס את התכשיר על עשבים במצב של צימוח נמוך. הדבאה מיטבית תתקבל כאשר הגידול סוגר על העשבים לאחר הריסוס. במקרה של עמוד דليل יעילות הדבאה נפגעת. בתנאים של צימוח צפוף של הגידול, התרסיס ניתן לצהה את עלות העשבים דבר אשר עלול לפגוע בעיליות הטיפול. גשם היורד תוך 4 שעות מהריסוס עלול לפגום בעיליות הריסוס. אין לריסס כאשר הטמפרטורה גבוהה מ-27 מעלות צלסיוס במשך 1-24 שעות לאחריו. מנע רחף לגידולים שכנים. רחף התכשיר עלול לגרום נזקים הרגשים לגידולים שכנים הרגשים לתכשיר. למניעת נזקי רחף, יש להשאיר פס ביטחון בלתי מרוסס ברוחב 100 מטר לפחות. בין הגידולים הרגשים ביותר לתכשיר: גפנים, בננות, כותנה.

ניתן לריסס חיטה מגיל 6 עלים ועד התבנתנות. אין לריסס חיטה בתנאי עקה (יבש, קרה, עדפיים או נזק מקרקולי עשבים). יש לריסס רק את הזרעים הרשומים בתווית. יש להקפיד על כוועד הריסוס בכוויחד בזרעים אפלים כמו דאריאל. התכשיר שאירועי בקרקע, אך אינו יעיל כמעט הצעירה. אין לשלב את התכשיר עם תכשיר אחר שנגןן פועלתו משתייך לקבוצה B או לשלבו במתקנות הדבאה עם תכשירים אחרים מקבוצה B.



מספר הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2018/הגה"ץ/4426
• סיג'וג HRAC: O+B+ • דרגת רעלות III - מסוכן לבראות
• מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן
• ארייזות: 5 ליטר

תחליב רחיף
קוטל עשבים להדבאת עשבים רחבי-עלים בחיטה

Florasulam 6.3 g/L + 2,4-D ethylhexyl ester 452.4 (equivalent to 300 g/L 2,4-D acid):

כללי:

קוטל עשבים סיסטמי, המשלב שני מנגןוני פעולה ומיעוד להדבאת עשבים רחבי-עלים לאחר הצטם בחיטה. התכשיר מכיל פולאצולאם, מקבוצת היסופולנויד טרייאזול פירimidינים (מעכב ALS) D-2,4-מקבוצת הפנוקס (הורקונול). שני החומרים הפעילים סייסטמיים, נקלטים דרך הנוף וכוברים בצמח לקדוקו הצעירה הפעילהם. כעבור 1-3 שבועות מריסוס, העשבים הרגשים מצהירים, מפסיקים לצמוח וקדוק הצעירה מת.

הוראות השימוש:
הוראות השימוש עליה יש לריסס את התכשיר על עשבים במצב של צימוח נמוך. הדבאה מיטבית תתקבל כאשר הגידול סוגר על העשבים לאחר הריסוס. במקרה של עמוד דليل יעילות הדבאה נפגעת. בתנאים של צימוח צפוף של הגידול, התרסיס ניתן לצהה את עלות העשבים דבר אשר עלול לפגוע בעיליות הטיפול. גשם היורד תוך 4 שעות מהריסוס עלול לפגום בעיליות הריסוס. אין לריסס כאשר הטמפרטורה גבוהה מ-27 מעלות צלסיוס במשך 1-24 שעות לאחריו. מנע רחף לגידולים שכנים. רחף התכשיר עלול לגרום נזקים הרגשים לגידולים שכנים הרגשים לתכשיר. למניעת נזקי רחף, יש להשאיר פס ביטחון בלתי מרוסס ברוחב 100 מטר לפחות. בין הגידולים הרגשים ביותר לתכשיר: גפנים, בננות, כותנה.

ניתן לריסס חיטה מגיל 6 עלים ועד התבנתנות. אין לריסס חיטה בתנאי עקה (יבש, קרה, עדפיים או נזק מקרקולי עשבים). יש לריסס רק את הזרעים הרשומים בתווית. יש להקפיד על כוועד הריסוס בכוויחד בזרעים אפלים כמו דאריאל. התכשיר שאירועי בקרקע, אך אינו יעיל כמעט הצעירה. אין לשלב את התכשיר עם תכשיר אחר שנגןן פועלתו משתייך לקבוצה B או לשלבו במתקנות הדבאה עם תכשירים אחרים מקבוצה B.

ברומוטריל BROMOTRIL

תרכיז מתחלב
קוטל עשבים ברני להדבאת עשבים רחבי עלים בחיטה, בשועורה ובדשא.

מכיל: L/g 240 (Octanoic acid ester) Bromoxynil

نפח התרסיס (ל'./ד')	המינון (סמ"ק/ד')*	מועד הטיפול	הגידול
בריסוס קרקע 10-20 ל'./ד'. כומלץ לרסס מהקרקע בনפח של 15 ל'./ד' פחות.	100	עשבים רגשים בגודל 4-2 עלים אכיתיים	חיטה, שעורה לגרעינים או למספוא מגיל 2 עלים ואילר
	200-150	עשבים קשי הדבירה בגודל 4-2 עלים אכיתיים כגון: גדיון, ברקן, חלמית, קדד, פרגוה. לא כומלץ לטפל על עשבים גדולים מהן"ל.	
15	100 בריסוס מכoon לבסיס הגידול**	עשבים רחבי עלים עד 4 עלים אכיתיים ותירס עד 8 עלים	תירס מתוק, תירס מספוא
40-20	200-100	עשבים רחבי עלים עד 6 עלים	דשא דגני

*המינון בהתאם לגודל העשבים.
** הרטבת נוף הגידול עלולה לגרום לצרבות
השתבלות או אחרת. אין לרסס במרוסס הפעול בהדרך אוויה גשם או המטרה תוך 6 שעות מהרישום יפגע בפעולות של התכשיש.

שילובים:

בחיטה ניתן לשלב ברומוטריל עם דופלוון KV, אקספרט, מוניטו, הויסא, דרבי וס.ו.ס. בהתאם לפרטים על תוכנית התכשיש המשולב. בשילובים, בזמן עקיה, עלולות להיגרם פגימות חולפות.

כללי:
ברומוטריל מדובר ביעילות נבט עשבים רחבי-עלים חד-שנתי בתכשיר מדברי עשבי לאחר הצפה, בכר מנעת תחרות של עשבים בגודל חיטה ושועורה כבר מרגע צעהו התכשיר מדברי עשבי בר שוניים כגון מיני חלמית, מצלבים שונים (חרדל, צנון), מורכבים, סוככים, כף-אוז, נורית, תלתן, סלק-בה, סולניים, קקד, פרגה.

הערות לטיפול: אין לרסס בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה או שרב או כאשר הגידול נמצא בתחום עקה כגון יובל, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אווור קרקע או מנזק מCKER עשבים ועד. מנע רוחף לגידולים שכנים. אל תרסס חיטה או שעורה במהלך השתבלות או אחרת. אין לרסס במרוסס הפעול בהדרך אוויה גשם או המטרה תוך 6 שעות מהרישום יפגע בפעולות של התכשיש.



מ. רישיון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 83/גה"צ/696
ס.ו.ג.ח: C HRAC: C
דרגת רעליות III - מסוכן מסוכן לבריאות
מיוצר ומשווק ע"י ADAMA AGRI
אריזות: 5 ל'

טבלת השימוש:

הרכיב (% בכתמים)	המינון (ס"מ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל'./ד')	העשבים המודברים	הגידול
1%	250	30-20	חד-שנתיים (רחבי עליים ודגניים) עד 10 ס"מ גובה	אבקדו, אפרסיכון, גפן, הדרים, נקטרינה, תפוח
2%	500		חד-שנתיים מעל 10 ס"מ גובה	
1%	300		gomaa הפקיים עד 20 ס"מ גובה	
2%	600	40-30	gomaa הפקיים בפריחה, ארוכבית שבבטית, דורת ארכום צובא (קוצאב)	לא נקלט ע"י השורשים. התכשיר אינו שארית בקרקע, אינו מונע הצצת עשבים ואין כל מגבלה בישומו לגידולים עזקים.
1%	300		ינבות, חבלבלי, קיזיצת, סולנום זיתני, הגא	
2%	1000		יבלית, חילף החולות	
	300	30-20		להקמתה נורף בתפוח אדמה*

* אין להשתמש בגידול הכיוון לדזרעים במטעים – ניתן לרסס מהנטיעה.

בחנת שטחים – יש להמתן 3 ימים מכועד הריסוס לפני זרעה או שתילה.

הערות לטיפול:
להדרת עשבים רב-שנתיים רסס לפני או במהלך הפריחה. להדרת עשבים חד-שנתיים רסס בגמר הצצתם. ההדרה מושגת לאחר 7-10 ימים בהתאם למזג האוויר וחינויו של העשבים. בתנאי טמפרטורת גובהות ניתן לצפות לפיגומים מהירה יותר אין לטפל באשר הטמפרטורות נמוכות מ-10°C גשם היורד תוך 6 שעות מהיריסוס או המטריה תוך 48 שעות מהיריסוס עלולים לגרום בעילות הטיפול. אין לרסס ברוח או בתנאי שרב. רוחם התכשיר עלול לפגוע בגידולים שכנים ובמיוחד בעצים גלעניים.

מנע ריסוס על עלות הגידול ועל גזעים לא מעוצים.
בהקמת הנורף בתפוח אדמה – אין לרסס על עלווה רטובה. אין לרסס בשודות המועדים לייצור זרעים.
במטעים – ניתן לרסס מהנטיעתם.

בכחנת שטחים – יש להמתן 3 ימים מכועד הריסוס לפני זרעה או שתילה.

העשבים המודברים:
אמייה, ארוכבית שבבטית, אספסת, בן חיטה, ברומית, גידין מצוי, גומא הפקיים, גראנוין, דורת ארכום צובא (קוצאב), הגא, דיפון, חבלבלי השדה, חבלבוב קעווה, חבלבוב פשוט, חילף החולות, חלמית מצרית (חלמית - הדבירה חלקית), חפוריות מציה, חפוריות מוזרה, חסת המצפן, חרדל, טוריים, ינבות השדה, יבלית, ירבוץ לבן, ירבוץ מופשל, ירבוץ עדין, ירבוץ פלמרוי, ירבוץ שרוע, ירוקת החכמה, כוכבית, כף אוזן, מרור הגינות, מצליים, נძנית לופתת, סלק בה, ספיק אבטיח, סבון, נירית הקמה, סולנום זיתני, סולנום שחור, עוקץ העקרב, פספלון דו טורי, קוטב מצוי, קורטם, קיזיצת קנדית, ליקין, רגלה הגינה, שעורת העכבה, שיבולות שועל, תולענית דוקרניתה.

גָלִיגָן טֹופּ GALIGAN TOP

תרכיז ריחף
קוטל עשבים ברני. מונע הצצה וմדבר עשבים קיימים במעט.

Oxyfluorofen 500 g/gr

כללי:

ההכשיר כועל ע"י גשם או המטרה. ומנع הצצה של העשבים:
לאחר הפעלה (מהסתוי ועד האבב) בהמטרה או בגשם ימנע הצצת העשבים לתקופה ממושכת בהתאם לעונה
ולמין ויקטול בריסוס את אותם העשבים שגובהם עד 10 ס"מ (למעט הדגנים שרק הצצתם תימנע):
החטודה, מרור הגנה, נורית, אספסת, ארכובית, בקיה, גדיין, חבלבל (מדרעים), חלמית, ילקוט הרועים, יrokeת החכו, לכיד הנחלים, מקור
ולפחות 6 חודשים. – אספסת, ארכובית, בקיה, גדיין, קדרוריה, תלtan.

החותדה, מרור הגנה, נורית, סביון, קחרון, קדרוריה, תלtan.

.

נפח התרסיס	נפח תרסיס	המינון (ס"מ"ק לדונם)	הגידול
החל מהנטיעה, סתיו-אביב	20-30	200	אבוקדו
החל מהנטיעה, מהסתוי לאחר הקטיף ועד שבוע לפני התטוערות בלבד. בגפן כנ"ל ולפחות 6 חודשים לאחר נטיעה.	200		גפן, נקרינה, שקד, תפוח

דגנים – בן חיטה, ברומית המטאטא, ברומית שעירה, זון משכחה זנב שועל ביצתי, שיבולת שועל
לקראת הטיפול למניעת הצצה: רסס על קרקע חלקה ללא רגבים. עיבוד השטה לאחר הריסוס יפחית את פעילות הtcpשיר
 למניעת הצצה. טמפרטורות גבוהות יקצטו את מושך פעולה מניעת הצצה של התכשיר היוזצרות בקעums בקרקע מטופלת
 בgaligan טופ תאפשר הצצת עשבים.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצמח ולביקורת: 96/הגה"צ/1425
• סיווג HRAC: E • דרגת רעלות IV - מסוכן
• ארייזות: 20, 5, 1 ל"ל • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן

גָלִיגָן (המשר)

יש להימנע מהרטבת העלואה של צמחי התרבות. (ראה סעיף "הפעלת התכשיר")
יער, פרחים, צמחים ועצים נוי:

גידולי שדה:					
אופן הריסוס	נפח התרסיס*	מועד הריסוס (ס"מ/ק"ד')	הגידול	המכינון (ס"מ/ק"ד')	נפח התרסיס*
התרסיס יכוון כר שלא יפגע בונף צמח הគותנה, אלא בסיס גבעוליהם בלבד ובעשבים שבמרווח בין השורות.(1)	30-50 ליטר לדונם. *הנפח הנמור לעשייה גבואה נמוכה, הגבואה לעשייה גבואה	200	כשהcotנה בגובה 25-30 ס"מ לפחות והעשבים לא יותר מ-10 ס"מ. לא יותר מ-60 יום לפני הקטיף.	כותנה שלחין לשיבים מושקית בהמטרה - ריסוס מס'ם	
ריסוס מוגן(2): התרסיס יכוון כר שלא יפגע בונף צמחי הគותנה ובגעוליהם, אלא כ-20 ס"מ משורת הគותנה ובעשבים הנמצאים במרווח בין השורות, משני צדי שלוחות הטפטוף.		100+100 ברומוטריל	כשהcotנה בגובה 25-30 ס"מ לפחות והעשבים לא יותר מ-10 ס"מ.	כותנה שלחין לשיבים מושקית בטפטוף - ריסוס מס'ם	
רסס את התכשיר והפעלו בהמטרה, לפחות שבועיים לפני השטילה. עדיפה שתיליה בדקר כדי להימנע מהזקת קרקע מטופלת. גם או המטרה אחרת השטילה עלולים לגרום לעיכוב, לצרבת עלווה /או לפחותה ביבול.		200	קדם שתילה, אולם לא בשדה שיישתל לפני 1 באפריל.	עגבניות לטעם תעשייה שתילות שתילו גוש בשדה הגלי בלבד (לא חיpoi או CISIO פוליאתילן)	
רסס את התכשיר והפעל בהמטרה לפני החיpoi. שתיל את האבטיחים לפחות 7 ימים לאחר הטיפול.		(3) 200 – 150	קדם שתילה	ابتיח מזן סיידלס 313 (גידול גלו או מכוסה - בקרקע מחופת בלבד)	

(1) הימנע מהרטבתה עלי הគותנה. יתכן שייפויו סימני הצהבה או צריבות בעלים התחתונים שייעלכו לאחר מכן ואין להם השפעה על רמת היבולים.

(2) **里斯וס מוגן:** פומיות המכוקפות מלמעלה ומהצדדים במגנים העשוייםUCH או פלסטיק.

(3) המכינון הנמור בקרקע קלה ובוננית, הגבואה בקרקע כבדה.

הערה: לפני גידול נוסף יש לעבד את הקרקע בסודיות לעומק של 5-10 ס"מ.

הגידול	מועד הריסוס	המכינון (ס"מ/ק"ד')	נפח התרסיס (ל"ד')
אורן ירושלמי, ברוש מצוי מהנטעה ואילך	אוקטובר-נובמבר כשבוגה השביה החד-שנתית לא יותר מ-10 ס"מ	(ניתן לשלב מגן 200 ס"מ/ק"ד')	50 - 20
סיגפן (פקעות מוגדל 4 ומעליה) מהזנים טריידר - הורן ופייטר- פירס	לאחר שתילת הפקעות וטרם הצצטם	300 - 200	50 - 30
פרח שעווה	לאחר השתרשות	300 בקרקע קלה 500-300 בקרקע כבדה.	כ-20 – 50. הימנע מהרטבתה העלואה בשעת הריסוס.
פיטוספורום, מלוליקה, איבונמוס, חבושים, בוהינה, ד'קרנדה, ספין, פיקוס בנייננה, קלוחוטרה, אלה אטלנטית	החל משנה שנייה לאחר הנטיעה	300 - בקרקע קלה. 500 - בקרקע כבדה.	



- (4) אל תרסס בצל ושם תוך 40 ימים לפני האסיף.
 - (5) המכון הנכור לעשביה נכוна ודיללה, הגבוהה לעשביה צפופה.
 - (6) ספטMBER- אפריל.
- הערה: לפני גידול נוספים יש לעבד את הקרקע בסיסיות לעומק של 5-10 ס"מ.**

הדרים ומטעים:

הערה: היזהר מהרטבתה עלות הגידול בשעת הריסוס.

הרידים ומטעים*	מועד הטיפול	נפח התרסיס**	הקידול	המינון (סמ"ק/ד')
החל מהנטיעה, סתיו- אביב.	הדרים	20-20 ליטר לדונם. **ראאה סעיף "הפעלת התcsiיר"	הדרים	*400 - 400
החל מהנטיעה, סתיו- אביב.	אבוקדו, אונונה, דית, ליצין, מנגו	*400 - 300		
החל מהנטיעת, מהסתוי לאחר הקטיף ועד שבוע לפני ההתעוזרות בלבד. בגפן כנ"ל ולפחות 6 חודשים לאחר הנטיעת.	אפרוסמן, אפרוסק, אגס, גפן, חbos, קיוי, רימון, משמש, נקטרינה, שזיף, שקד, תפוח	*400 - 300		
בשיטה מוקן לשטילה סתיו- חורף, בשיטות לשטילת אביב.	בננות	*300 - 200		
סתיו-אביב, לשיפור קטילות עשביה ק"ימת מומלץ לשלב ראנודאפ/ג'לי פוגן בריבוע 2%-1% לפ"גובה ועוצמת השיבוש במועד הריסוס.	תמר מתום שניים לנטיעת	400		

* המכון הגבוה ימנע הצצת עשבים לתקופה ארוכה יותר.

שילובים: באבוקדו, אפרוסמן, גפן, הדרים, אפרוסק, זית - ניתן לשלב מגלן 200 סמ"ק/ד.

הקידול	מועד הריסוס	המינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס*	הערות
קרוב, קרובייה (2)	קדם שתילה ובמעבר עד מרץ אפריל עד אוקטובר	(1) 200 - 150 (1) (2) 250 - 200	15-30 ליטר לדונם. *הנפח הנכור לעשביה נמוכה, הגבואה לעשבייה גבוהה מהודזת קרקע מטופלת.	
בTOTAL (6)	קדם שתילה	150		
בצל (שתול)	קדם שתילה	200		
בצלצלים "בית אלף"	אחרי נזיפה, לפני הצצה	200	יש להמיטר ב-10 מ"מ לפחות לאחר הריסוס.	
בצל (זרע ושתול) (3)	משלב של 4 עלים מפותחים ומעלה(4)	(5) 150 - 100	לאחר הריסוס עלות להופע צירות בעלים שייעלמו תוך 2-3 שבועות ולא יפגעו ביבול.	
שם זן שני (3)	משלב של 4 עלים מפותחים ומעלה(4)	(5) 200 - 100		
קינרס (ארטישוק)	קדם התעוזרות בקינרס מבוסס	(1) 350-200	רסס לפני השקיה התעוזרת. במינון הנכור ניתן לשלב עם דייאורקס 100 סמ"ק/ד.	
לآخر שתילה (שתיים יבשים)	לאחר שתילה (שתיים יבשים)	200	רסס לפני השקיה התעוזרת.	

(1) המכון הנכור בקרקע כליה ובינוי, הגבואה בכבדה.

(2) בין ט"ז:HRAC:E, לא יותר מ-200 סמ"ק/ד'.

(3) אל תרסס בצל ושם בעקה, צמאות או בקליטה חלקית. אל תשלב גליגן עם קווטלי עשבים נוספים מחשש להגברת הצריבות.

גליידר GLIDER

הדרים ומטעים:
הערה: היזר מהרטבת עלות הגידול בשעת הריסוי.

מועד היישום	טיפוס התרסיס	נוף הקרקע	המינו	הרידול
סתיו - אביב	50-30 ל'/'ד' בהתאם לגובה וצפיפות העשבים	כל הקרקעאות	400 סמ"ק/ד'	אבוקדו, הדרים (למעט סטאר רובי), מנגו, דית, תמר
מהסתוי לאחר הקטיף ועד שבוע לפני התעוררות הבלד		כל הקרקעאות	400 סמ"ק/ד'	תפוח, גפן, אפרסקון (בזן טריומף בלבד)
מהסתוי לאחר הקטיף ועד שבוע לפני התעוררות הבלד		בינוית כבדה בלבד	400 סמ"ק/ד'	שזיף, שקדים, רימון, אפרסק, נקטינה, אגוז

הפעלת התכשיר: גליידר ימנع הצצת עשבים חד-שנתיים לאחר הפעלה ע"י גשם או המטרה של 30-40 מ"מ.

הערות לטיפול: לקבלת הדבירה מכושכת רצוי לרסס לאחר הצצת העשבים. להדבירה עיליה יש לרסס את העשבים כשהם ירקים ורענים ולפני הגעתם לגובה 20-30 ס"מ. גשם היורד תוך 6 שעות מהרישום מפחית מייעילות הריסום. אבק המכסה את העשבים מפחית מייעילות הריסום. אין חשש מגעהתתרסיס בגזעי עצים מעוכזים. ניתן לטפל שנית בחולף 4 חודשים ממועד הריסום. אין לתת יותר משלבי טיפולים בשנה.

שים לב: התכשיר מזין למתקות למעט פלדה אל-חלד, השתמש רק במרקמים בעלי מקלים העשוים מחומר סינתטיים או מפלדת אל-חלד. **אין להשתמש מכל עשויה מברזל.** התכשיר צורב צמחים. מנע הגעת התרסיס או רוחף לעלווה ולפירות של גידולי תרבות ולגזעי עצים צעירים שטרם השטעמו וכל צחיה רצiosa, בריכות דגים ומקוות מים. אין לרסס גליידר בזכנן הפעלה ההשキיה בטפטוף וכן לפני או במהלך גשמי עדים. אין לרסס בחממות או מבנים סגורים.



מספר הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2006/גהה"צ/1847
טיפוס HRAC: C+E+G • דרגת רעלות IV - מסוכן
 • ארכיות: 1,75 ל' • מיצר ומשווק ע"י אדמה אגן

גְּלִיפּוֹגָן GLYPHOGAN

תרכיז נזלי

קוטל עשבים כללי

הוראות השימוש:

כללי - לקבלת הדבורה מיטבית של העשבים, הימנע מההשקייה בהמטרה במשך יומיים לאחר הריסוס. גשם היורד תוך שעה לאחר הריסוס מפחית מייעלות הטיפול. אבק המכסה את העשבים מפחית מייעלות הריסוס. בעונת החורף (בטמפרטורה נמוכה), פעילות גלייפוגן על עשבים רב-שנתיים אינה מספקת. אין לריסס בתנאי עקה לצמח (חמסין, יובש או קרה).

משטח:

הוסףת משטח לתריסס דרישה רק בכינוי גלייפוגן נמכרים: 100 או 150 סמ"ק לדונם. מומלץ להשתמש במשטח בכינוי כגן מכיל: מלח אゾפרופיל אמין של גלייפוסט, glycine (N-(phosphonomethyl)

מתאים ל-360 גרם בלטר אקוויולנט-חומרה.

נפח התריסס:

עלות הדבורה מרבית מושגת על ידי גלייפוגן בנפח נמוך להדבורה עשבים רב-שנתיים מפותחים ובשתחים לא חקלאיים גלייפוגן הננו קוטל עשבים סיסטמי לא ברני להדבורה עשבים קיימים. התכשיר נקלט ע"י העלווה הירוקה ומוביל לפני מטה גם לחקלים התה-קרקעים וגורם לתמונות הצמחים. כדי לקבל הדבורה מוגברת יש לריסס על צמחים ירוקים רעננים. בעשבים רב-שנתיים המסתפחים מאיברי ריבוי תה-קרקעים, יש להמתין לטיפול עד שהצמח יפרוץ מהם ולהימנע מעיבוד קרקע או כיסוח עלווה לפני הטיפול. פעילות גלייפוגן איטית, תוצאות ניתן לצפות תוך 2-6 שבועות, בהתאם לסוג העשביה ומועד הטיפול. לאחר ריסוס עשבים רב-שנתיים צריך להימנע מעיבוד הקרקע לפחות 7 ימים לאחר הריסוס.

כללי:

הערות לטיפול: אין לגעת תריסס או רוחף לעולוה ולפירות של גידולי תרבות ולגדע עציים בלתי מעוצים ולכל צמחיה רצiosa, בריכות דגים ומקרות מים. אין לריסס בגלייפוגן בזמן הפעלת ההשלקה בטפטוף. גשימים עדים לאחר ריסוס בגלייפוגן עלולים להחדיר את החומר למערכת השורשים ולגרום לנזקים בגידול.منع האbstה בעלי חיים וכניסתם לשטח מרווח תקופה 14 ימים מהריסוס. גלייפוגן תוקף מתקות למעט פלדת אל-חלד, השתמש רק במרססים בעלי מצללים העשויים מחומרים סינטטיים או מפלדת אל-חלד. **אין להשתמש מכל עשויה מבזל.**

העשבים המודברים:

גלייפוגן מדבר את כובית העשבים הקיימים למעט נזמית, סרפף, חלמית מפותחת, יבשות והגא.



מ"מ' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 95/גה"ץ/1350

• סיווג HRAC: G • דרגת רעלות IV - מסוכן

• אריזות: 20 ל, 200 ל • מיצר ושיווק ע"י אדמה אגן, אדמה סין

glyphogan

(המשך)

הדברת עשבים לקראת גידול שדה, ירקות ובשטי חרב

نפח התרסיס	מועד הטיפול	ה uninon (ס"ק לדונם או ריכוז)	הعشבים המודברים	הgidol
10 ליטר/ד' בריסוס קרקע.	על שלף ועשבים מלבלבים לאחר ההשקית יסוד ודריית הכותנה, לא אחור מיומם לפני	150 - 200 בהתאם לגובה העשבים, בתוספת 0.5% משטח DX	שלף מתחדש ועשבים חד-שנתיים קיימים, לבוטות דורת ארם-צובא שהציג מדעים.	לקראת כותנה בחו-גידול בזרעה למישרין (לאחר חיטה, שעורה, שחחת).
10-15 ליטר/ד' בריסוס קרקע.	על כרב או לאחר פינוי פני הקרקע משמעות הגידול הקדם, כל עוד העשבים ביצימות פעיל.	300-500 בשילוב 100-150 טומהוק	עשבייה רב-שנתית בעל עלווה מפותחת הכוללית יבנית, גומא הפקעים, דורת ארם- צובא, יבוט, סולנים דיטני, חבלבל, הגא. (מנון גלייפוגן הגבוה להדרת יבנית וגומא הפקעים)	טיפול קיצי לקראת דגני חורף בלבד.
10 ליטר/ד' בריסוס קרקע.		500 (במקדים 5.0%)	יבנית בעלי עלווה מפותחת וכן עשביה אחרת הקיימת בזמן הbrisos.	

نפח התרסיס	מועד הטיפול	ה uninon (ס"ק לדונם או ריכוז)	העשבים המודברים	הgidol
בריסוס קרקע 10 ליטר/ד'. בריסוס אוויר 5 ליטר/ד'.	לפני הזרעה או לאחר השקיית ההנבטה. למעט בקרקעות חוליות המכילות פחות מ-10% חרסית.	100 בתוספת משטח DX 0.5%	א. נבטים וצמחים חד-שנתיים עד גובה 10 ס"מ לרבות נבט שחזינו ארם-צובא שהציגו מדעים.	לקראת גידולי קיז: כותנה, מקש, אגוזי אדמה, תירס ירקות. מותר לרסס עד שבועיים לפני שתילה.
		150 בתוספת משטח DX 0.5%	ב. חד-שנתיים 10-40 ס"מ. יבנית ודורת ארם-צובא מקני שורש יצרו וידכו צמנית.	
10 ליטר/ד' בריסוס קרקע.	במצע מוכן לפני הזרעה ולאחריה (לא לשתייה) אין לרסס לאחר ה השקית ההנבטה. למעט בקרקעות חוליות המכילות פחות מ-10% חרסית.	500 (במקדים 5.0%)	עשבים רב-שנתיים: יבנית, דורת ארם- צובא, חבלבל, גומא הפקעים-בעלי עלווה מפותחת.	לקראת זרעת גידולי קיז: כותנה, מקש, אגוזי אדמה, תירס וירקות.
		300 (במקדים 3.0%)	דורת ארם-צובא בלבד.	



מ"מ הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 95/גה"ץ/1350

- סיווג HRAC: G
- דרגת רעלות IV - מסוכן
- אריזות: 20 ל, 200 ל'
- מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן, אדמה סין

גלייפוגן (המשר)

טיפול גלייפוגן להקמת הגידול

גידול	(ס"מ"ק לדונם)	המינון (ס"מ"ק לדונם)	נפח התרסיס	מועד הטיפול	נפח התרסיס
עד 7 ימים לפני הקציר 7-5 ל'./ד' - ריסוס אויר	300-100	עד 10 ל'./ד' - ריסוס	עד 20-10 ל'./ד' - ריסוס	עד 7 ימים לפני הקציר	עד 7 ימים לפני הקציר

הדברת עשבים בהדרים:

אין לריסוס כאשר הטמפרטורה מעל 30°C . אין לריסוס כאשר מהירות הרוח עולה על 7.5 קמ"ש. יש להימנע מריסוס אוויר של גלייפוגן בתחום 100 מטר מכל גידול חקלאי, מטעים וגינות. אין לריסוס בטיפות שקטנות קטן מ-400 מ"ק/קון. אל תכון פומיות קידמה אל כיוון זרם האויר ואל תגדיל את נפח התרסיס על ידי הגדלת החלץ בפומיות. הבטח יישום אחד. השתמש באמצעי סיכון נאותים בעת ריסוס התכשיר מהאוויר. מיד עם גמר הריסוס שטוף את המרסס על כל חלקו. רחץabisodium את מטוס הריסוס במיוחד את מתקן הנחיתה בתום יום הריסוס, על מנת לשטוף שרידי גלייפוגן שהנו קורזובי למתקת שאינה מצופה.

הדברת עשבים בהדרים:

הימנע מכמגע של תרסיס בגזעים לא מעוצים, בענפים וسورים של עצי פרי וגפן. אין סכנה מפגיעת התרסיס בגזעי העצים המכעדים. כאשר העשביה הרב-שנתית גבוהה מאוד, יש לכסח אותה ולתת לה לצמוח לגובה 10-15 ס"מ ואז לבצע הריסוס.

הדברת עשבים בהדרים, במטעים ובכרם

הערות	המינון (ס"מ"ק לדונם)	הרכיב		העשבים המודברים	הגידול
		בנפח תרסיס 30 ל'./ד'	בנפח תרסיס 10 ל'./ד'		
למנעת הצצה של ח'ש נתן לשלב דיאורקס או גלון בגידולים המורשים. (ראה סעיף שלובים)	150	0.5%	0.5% + 1.0% משתח	חד-שנתיים עד גובה 10 ס"מ	מטעים מגיל שנה ואילך: הדרים, אבוקדו, מנגו, פיג'ואה, ק'יוו', שוק, פלאן, תפוח, אגוז, חבוש, אפרסק, נектרינה, שדי, שקד, גפן, אפרסקון, דית, אנטונה, תמר, אנונה, גיאבה
הערה: אין לטפל בגידול המועד לזרעים.	300-200	1%	1.5% העשביה.	עד גובה 40 ס"מ.	
	300-250	1%	1.5%	פספלון מורחב	
	300-250	1%	3.0%	קוק'יה, דורות ארם-צובא.	
	500	2%	5.0%	יבליית, משין גלייל', דוחן, דוחל, עשב רודס	
לשיפור ההדרה יש לשלב עם טומהוק ברכיז 0.5% בפח 30 ל'./ד' או 150 ס"מ"ק/ד' בגידולים בהם טומהוק מורשה.		2%	4%	חלבלב, גומא הפקעים, טיון דבק, ארוכובית, הגא, סולנום זtiny, פטל, ינבות	
		3%		קנה מצוי, סופ מצוי, גומא, חילף החולות	



מ' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 95/גה"צ/1350

• ס'וג: HRAC: G • דרגת רעלות IV - מסוכן

• אריזות: 20 ל'./200 ל' • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן, אדמה סין

glyphogan

(המשר)

שילובים:

להדברת מגוון רחב של עשבים קיימים, ניתן לשלב עם גילן, טומוהוק, אלבר סופה, ניתן לשלב עם מונע הצעקה (כגון דיאורוקס, גיגון). להפעלת דיאורוקס נדרש גשם או המטירה תוך 2-3 שבועות לאחר הריסוס, לפחות תוך 7-14 ימים בהתאם לעונה. בכל השימוש יש להציג לפי התווית של התכשיטים לגבי הגידולים המורשים-אמצאי זהירות ונקיי המרסס.

הדברת עשבים בהדרים, במטעים ובכרם (המשר)



מ' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 95/גה"ץ/1350
• סיווג HRAC: G • דרגת רעלות IV - מסוכן
• אריזות: 20 ל, 200 ל • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן, אדמה סין

המקום	העשבים המודברים	המינון (ליטר לדונם)	הרכיב	נפח התרסיס (ל'/ד')	הערות
לאורך פסי רכבת ואדי דרכים בינעירונית, סביב מאגרי מים ותעלות ניוז, שטחים סיבוב ישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות, בתוך יישוב	פספלון מרחיב, פספלון דו-טור, עשב רודס, דורת ארם-צובא, בילית, קוקיה, חילף החולות, משין גלייל, זקן כפול שובלות, גומא הפקעים, חבלבל, טיון דביך, ושביה חד- שנתית.	1.0	2%	50-30	בהתאחד היצימות חווזרים על הריסוס כשהעשבים מגיעים לגובה כ-40-50 ס"מ סמור לפירחה.
	כניל +ינבות, הגא, סלונים זיתני, פטל, ארכובית*	0.5%	0.5%	*	* לשיפור הדבירה יש לשלב טומוהוק בריכוז % 0.5
תעלות ניקוז ודפנות של מאגרי מים	כל העשביה במשבצת העלינה +קנה מצוי, סוף מצוי, גומא ודוחן דוחל.	1.5	3%	60-50	

דופלוזן KV

תרכיז נזלי

קוטל עשבים הורומונלי סיסטמי להדבאת עשבים רחבי עלים

Mecoprop-P k-600 g/L בצורת מלח.

קוטל עשבים הורומונלי, ברנייני לחיטה ולшибולת שועל. התכשיר הסיסטמי, פועל על הצמח דרך העלווה הירוקה, גורם לעייפות והמתפרקויות וחודר למערכת השורשים. עשבים מפותחים שלא נקטלו נשראים לעיתים יوهקים, אך הם מעוותים ואינם מכשיכים לפחות. להדבאת עשבים מיטבית רצוי שהגידול יהיה בעומק מלא ולא יהיה במצב עקה כגון יובש, עדפי מים, קרה, פגעה מקטול עשבים, נזקי נטמודות ופגעים אחרים.

העשבים הנפגעים עד שלב 4 עלים אמיתיים הם: שען, חמצאה, אמייה גדולה, מצלבים (כגון שלח, חרדל), צפרנית, דבקה, דרדר, זנב עקרב, חמנית, חמצץ, מקור החסידה, קחוון, מרוגנית.

העשבים הנפגעים עד 2 עלים אמיתיים: אמיר קווצני, ברקן, גדיין, חמלית, חריצית, נזמית, סלק בה, קטניות, חבלבל, קדה,

מועד הטיפול	נפח התרסיס (ל'/ד')	המינון (סמ"ק/ד')	ה업체ים הרגיסטרים*	המקום
בחיטה- החל מ-2-3 עלים של הגידול ועד סגירת הנוף, כל עוד רחבי העלים צעריים. בשילובות שועל - החל מ-5 עלים של הגידול.	ריסוס קרקע - ריסוס אויר - 5-3	200 20-10 ריסוס אויר - 3-5	מצלבים, חלמית, קטניות, מורכבים שונים, סוככיים.	חיטה, шибולת שועל
	300-250		דבקה, ספיק חמניות, חמצץ, חבלבל.	

שילובים:
לשיפור הדבאת עשבים רחבי-עלים כגון סלק, גדיין, ברקן, אמיר קווצני, חמלית וקדד, ניתן **לשלב רק בחיטה דופלוזן עם התכשירים הבאים:** ברומוטריל (80 סמ"ק/ד'), סנקו, קוורא, אקספרט, בדרוקה ודרבן.
בחיטה ניתן **לשלב דופלוזן עם קוטלי העשבים הדגניים אטופה או טופיק.**

הערות לטיפול:
מנع רוח התרטיס לגידולים שכן מאחר שאלה עלולים להיגע מההוכחה ניתן לרסס בדופלוזן בכל שעות היום, בתנאי שלא תהיה רוח. רצוי לרסס כשהעשבים בשלב צעיר עד 2-3 עלים אמיתיים. אין לרסס בזמן עקה כגון יובש, קרה או חמסין.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 1299/גה"צ/94
סיווג HRAC: O
דרגת רעלות III מסוקן לבראיות
מיוצר ע"י: Nufarm
אריזות: 10 ל' **משקל ע"י:** אדמה אgan

דיאורקס

תרcit ריח

קוטל עשבים ברני למניעת הצעה של עשבים חד-שנתיים

Diuron 800

דיאורקס מונע היצטם של מנינן רבים של עשב בחר חד-שנתיים. בין העשבים המודברים: עשב קיז' כגון: מנינ'ירבוז (אכטנטואס), רגלה הגינה, סולאנום שחור ודגני קיז' כגון: אצבען מאדים, עוקצ'ר, דוחנית השלחון, מנינ'יזופן, בת'יבלית מצירתית, אלביסני הודיית, צינקורם, דזות ארם-צובא (קוצאב) הנובטת מזרעים, עשב חורף כגון: מנינ'יסוככיים, מנינ'מורכבים, קרפ אווז, מנינ'חפורית, מנינ'זון ועוד. להפעלת החומר לאחר הריסוס דרושא המטרה או גשם של 30 מ"ק/ד. למניעת נזק לגידול עוקב דרישים המטרה או גשם בכמות של 40-50 מ"ק/ד לפרוחות.

הערות לטיפול: מונע רוחף של התרטיס לגידולים שכנים. דיאורקס עלול לפגוע בגידולי התרבות. אין לטפל בו אלא בגידולים המפזרתיים בתווית, ובאה להKEEP להשתמש בו לפני ההוראות. אין לרוטס בתנאי שרב, קרה או רוח. במקורה של הפיכת שטח כווננה שרוסס בדיאורקס אין לדוחע גידול אחר פרט לכווננה אלא כעבור 6 חודשים מיום הריסוס. במטע מטופל בדיאורקס אין לשנטע טרם חלוף 4 חודשים מהטיפול. אין לטפל במינונים המכמלצים יותר מפעם אחת בשנה.

הערות	נפח התרטיס (ל'/ד')	מטעים			
		המינון (סמ"ק/ד')	סוג הקרקע	הgidol*	
בחדירים להדברת עשבים קיז'יים ניתן לשלב דיאורקס עם אורגן. את ההשילוב הנ"ל יש לרסס מיד אחרי הכנת התרטיס (ראה סעיף שילובים)	50-20	250 300	סתוי - חורף קלה-BINONIAT כבדה	סטוי - חורף קלה-BINONIAT כבדה	הדרים, תפוח, פקאן, אבוקדו
אין לטפל בדיאורקס בקרקע קלה, חול וט. קללה, חול וט.		300 400	אבייב - קיז' קלה BINONIAT-כבדה		
		200	BINONIAT-כבדה	אגס, גודגן, שקד, אפרסק	
		200	כל הקרקעות	מנגו	
		200 300	קלה-BINONIAT כבדה	אפרסקון, דית, אנונה, תמר	
בתקופת התרדמה ניתן לטפל בגפן גם בריסוס מהאוור בהתאם למינונים הנ"ל.		150 200 300	חול ולס BINONIAT כבדה	גפן	

* בכל הגידולים מהשנה השליישית לנטיעה ואילך.

שילובים:

תוספת משטח XD לדיאורקס (עונת סתיו חורף בלבד) - מגבירה את יעילות דיאורקס בקטילת מגע של עשבים ח"ש קיז'יים עד גובה של 5 ס"מ. אין להשתמש בתוספת XD בקרקע קלה. להדברת עשבים קיז'יים ניתן לשלב דיאורקס עם גילין או ראנדאף/גלייפונג - כמפורט בתוויתם שליהם.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביברות: 91/גה"צ/1116
סיווג HRAC: C • דרגת רעלות: III מסוכן לבリアות
אריזות: 1 ל, 5 ל' • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אgan

דיאורקס (המשך)

כותנה לסתבים: ניתן לטפל בדיאורקס בשטחי כותנה במועדים הבאים:-
(א) טיפול סתווי חורפי להכנת שטחים לקראת כתנת שלחין.

ממועד דיאורקס בטיפול סתווי-הורפי על שטח לא עשביה תלויים במועד הטיפול:

מועד הטיפול	המיןון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל'/ד')	הערות
נובמבר-ינואר	200	30-10	מאמצע דצמבר ואילך, משלבים דיאורקס לצורך הדברת עשביה קיימת עם ראנדאף/גליי פוגן כמפורט בתוויות שלחין.
מראשית פברואר צפונה מלכיש לכיש ודרומה	*180 < 140		
	140 < 120		

* ככל שמתקרבים למועד הזרעה מפחיתים בהדרגה את המיןון כמפורט.
(ב) ערבות דיאורקס בקרקע (תוחח) במשולב עם סטומפ:

מועד הטיפול	הקרקע	המיןון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל'/ד')	הערות
עד אמצע פברואר	כל הקרקעות	250	30-10	
מאמצע פברואר ועד סוף לזרעה	קליה ובינונית כבדה	150 200		

ג) טיפול קדם הצצה לזרעה ברטווב ולזרעה ביבש:

הערות	סוג הקrkע	המיןון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל'/ד')	הערות
יש לרסס את התכשיר עם זרעת הכותנה, מינוני דיאורקס יקבעו בהתאם לסוג הקrkע: ברעה ביבש יופעל התכשיר ע"י המטרת הנבטה, בקרקע בלבד השקה לפחות ב-40 קוב לדונם ובקרקע בנונית, 30 קוב לדונם.	קרקע בנונית, לס וחול-לס קרקע כבדה	100 120	30-10	

ד) הדברת עשבים קיימים בזמן גידול הכותנה (רישום מכון) - בשטחי המטרה בלבד. רסס דיאורקס כשהכותנה בגובה 10 ס"מ לפחות במינונים כמו בטיפול קדם הצצה, בשילוב עם משטח DX ביריכוז 0.5% או עם תכשירי מ.ס.מ.א. ביריכודים המכחלצים.

ה) הדברת עשבים לאורך שלוחות הטפטוף בכותנה

הערות	מועד הטיפול	המיןון (סמ"ק/ד')	שיטת היישום	הערות
החדרת התכשיר לשולחות הטפטוף מותרת רק בשדות אשר מערכת ההשקייה שלהם מנוטקת ניתוק פיזי מצנרת המוליכה מי שתייה והמצידת במערכת המכילה שסתומים אויר ושני שתומי אל-זרע. החדרת החומר תעשה לקראת סיום ההשקייה. לאחר גמר ההזרקה משקים כ-15 דקות נוספת.	לקראת סיום השקיית טפטוף כלשהי, לאחר נקודת חיבור המותקנת באקדמות ביןוניות ואחר שטפטוף כלשהי לשולחות הטפטוף דריך נקודות חיבור המותקנת כבדות. אין לטפל בקרקעות חול ולס. בסיום בהגיעם לשלב אחוריו שטפטום אל חזר (ראה העות). בימידת הצורך אפשר לטפל פעמי נסotta	50 (לפי 500 מטר שלוחה לדונם) 2-3 עלים אמיטיים.	החדרה לשולחות מערכת הטפטוף דריך הצדפה מחודשת של העצים בהגיעם לשלב וכבדות. אין לטפל בקrkעות חול ולס.	החדרת התכשיר לשולחות טפטוף כלשהי, לאחר נקודות חיבור המותקנת באקדמות ביןוניות אחרי שטפטום אל חזר בקrkעות חול ולס.

اذירה: כדי למנוע הגעת דיאורקס עם המים לגודלים אחרים, אין להתokin את מתקן ההזרקה לך הראשי המספק מים לחקלות נוספות, אלא לצינור מימי המספק מים אר ורך לשדה המכיעד לטיפול. לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכי החברה.

דיורקס (המשר) DIUREX

קנרט (ארטישוק) מבוסס (החל מהשנה השניה)

נפח התרסיס (ל'/'ד')	המינון (סמ"ק/ד')	מועד הטיפול	העשבים	המטרה
60-30	1000 800	מאכמצע אוקטובר מאכמצע דצמבר	עשבים חד-שנתיים למעט ש"ש בה. הערה: להדרת עשביה חורפית קיימת אפשרות לשלב דיורקס עם ראונדאפ/גוליפוגן	מניעת הצצת העשבים בצד דרכיהם ביןירוניים, לאורך פסי רכבת, בשטחים סביב יישוב ובסביב מתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות
60-30	7000	כל השנה בתנאי ^a шибועול ע"י גשם או המטרה.	הדברת רב-שנתיים כגון קנה מצוי, דורת ארם-צובא, קוקייה, עשב רודס, פספלון, נשרן, סיון ועוד. הדברה ומונעה של חד-שנתיים.	הדברת עשביה ולעיקור ממושך של הקרקע בצד דרכיהם ביןירוניים, לאורך פסי רכבת, בשטחים סביב יישוב ובסביב מתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות ובתעלות ניקוז כאשר אין בהם זרימת מים

מניעת הצצת עשבים לאורך שדרות נוי:

המינים	גיל העצים	המינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל'/'ד')	מועד הטיפול
טיפואנה, פיקוס, פלפלון בכות, דלברגיה, ברוש	מהשנה השלישית לנטיעה	200	60-30	a. אין לטפל בדיורקס בעצי אורן ובמינים אחרים שלא מזוכרים בטבלה. ב. להדרת עשבים קיימים עד גובה 5 ס"מ (למעט ק"ץ) מוסיף משטה AX במינון 0.5% מכמות התרסיס



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ול ביקורת: 91/הגה"צ/1116
 • סיווג HRAC: C • דרגת רעלות: III מסוכן לבリアות
 • ארידזוט: 17,5 ל' • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אgan

DINGO

תרכיז ריחוף
קוטל עשבים כללי משולב להדברת עשבים חד-שנתיים במטעים

Diflufenican 250 g/L + Glyphosate 40 g/L

dingo מדבר עשבים חד-שנתיים, ועשבים רחבי עלים חד-שנתיים כגון: מצלבים, סבון אביבי, מרור הגינה, ירבוזים, כוכביה, קוטב, אספסת, כף אווז, מרקלית מצזיה, לשישית הצבעים, גדיין, גזר בר, אכמיה, גראון נאה, חלמית (עד 6 עלים), קיצצת צעריה (עד 2 עלים), סרפדים, שחיל, ארוכיות, רגלה הגינה, עוקץ עקרוב, יוקת החכמה, סלק בר, שוש קירח, אספרגוס צער וחלבלב השדה.
התכשיר לא יעיל נגד קיצצת מפותחת, בקיה, ינבות ווגא.

הערות לטיפול:

יש לוטס את העשבים כשהם יוקים ורעננים ולפני הגיעם לגובה 20-30 ס"מ. יש למנוע השקיה בהמטרה במשך 12 שעות לאחר הריסוס. שם המירוץ תוך 6 שעות מהריסוס מפחית מייעילות הריסוס. אבק המכסה את העשבים מפחית מייעילות הריסוס. אין חשש מפגיעה התרסיס בגזעי עצים מעוצם.

התכשיר צורב צמחים. מנע הגעת התרסיס או רוחף לעלואה ולפירות של גידול תרבותות ולגזעי עצים צעירים שטרם השתעמו ולכל צמחיה רצואה, בריכות דגים ומקרוות מים. אין לוטס בזקן הפעלת ההשקה בטפטוף. גשמי עדם לאחר הריסוס עלולים להחדיר את החומר למערכת השורשים ולגרום לנזקים לגידולי התרבות.

התכשיר תוקף מתקות למעט פלדה אל-חלד, השתמש רק במרסיטים בעלי מכך העשויים מחומרים סינטטיים או מפלדת אל-חלד. אין להשתמש בכל עשי מברזל. אין לוטס בתנאי לחות ובתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה, שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום, נזקי קרה, חסור אוורור קרקע, נזק מקטול עשבים ועוד.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 2013/גהה'צ 4092
• סיווג HRAC: F+G • דרגת רעלות AI-מסוכן
• מיצר ומשווק ע"י ADAMA אגד
• א麗זות: 5 ל' • נזק כבוי

טבלת השימוש:
להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:

טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:	טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:</th><th>טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:</td><td>טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:</td></tr> </tbody> </table>	טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:</th><th>טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:</td><td>טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:</td></tr> </tbody> </table>	טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:						
טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:	טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:								
טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:	טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:								
טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:	טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:								
טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:	טבלת השימוש: להדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים:								

DARBUKA

תרכיז ריח'

קוטל עשבים להדבאת עשבים רחבי-עלים בחיטה

Florasulam 50 g

טבלת השימוש:

הערות	נפח תרסיס	המינון	הגידול ומועד הריסוס
מהקרקע בלבד	30-10 ל'./ד'	8 סמ"ק/ד'	חיטה זמן: אריאל, שוהם, בר ניר, גדרה, מ-3 עלים ועד שלב ההפרקה

שילובים: ניתן לשילב עם דופלוזן KV

גידולים עוקבים לאחר הריסוס:

ניתן לגדל את הגידולים הבאים 4 חדשים לאחר מועד הריסוס בתכשיר: כותנה, חמניות, תירס ועגבניות בשטילה. או על עשבים בעקבות ייבש או בעקבות קרה תיה איטית ועלולה רק לדכא את התפתחותם. להדבירה ייעלה רצוי שירד גשם אפקטיבי שירטיב את הקrkע לעומק 5-8 ס"מ בתוך ממועד הריסוס. גשם היורד תוך 4 שעות ממועד הריסוס עלול לפגום ביעילות הריסוס. אין לרטס ברוח. מנע רוחף לגידולים שכנים. עשבים עמידים לתכשיר מעכבי ALS (קברזה B) לא יודברו. כאשר

ניתן לגדל את הגידולים הבאים 6 חדשים לאחר מועד הריסוס בתכשיר: תפוחי אדמה, גזר, סלק וקטניות.

כפוף של הגידול, התריסס לא יססה את עלות העשבים וזה עלול לפגום ביעילות הטיפול. הדברת העשבים ביישום מאוחר על עשבים בעקבות ייבש או בעקבות קרה תיה איטית ועלולה רק לדכא את התפתחותם. להדבירה ייעלה רצוי שירד גשם אפקטיבי שירטיב את הקrkע לעומק 5-8 ס"מ בתוך ממועד הריסוס. גשם היורד תוך 4 שעות ממועד הריסוס עלול לפגום ביעילות הריסוס. אין לרטס ברוח. מנע רוחף לגידולים שכנים. עשבים עמידים לתכשיר מעכבי ALS (קברזה B) לא יודברו. כאשר יש חשש של אוכלי-זוחלים עשבים בעלות רגשות מופחתת לתכשיר, יש להשתמש בתכשיר אחר בעל מבנה פועלה שונה. אין לרטס את התכשיר לאחר אמצע פברואה.

ניתן לרטס חיטה כשלב צעריך (3 עלים) ועד סוף ההפרקה בלבד. אין לרטס חיטה בתנאי עקה (יבש, קרה, עודפי מים או נזק מכךוטי עשבים). יש לרטס רק את הדנים הראשוניים בתווויות. התכשיר שארתי בקרקע, אך אין יעיל כמנוע הצצה. אין לשילב דרבוקה עם תכשיר אחר שמנגן פועלתו משותף לerbacina B או לשילבו במתקנות הדבירה עם תכשירים אחרים מerbacina B. ניתן לרטס פעמי אחדות בעונה ולא לאחר אמצע פברואה.

ឧשבים בעלי רגשות גבוהה לתכשיר:

חלמית, תלתן, סבון, מצלבים, סלק, מצזי, פרג אגסני, אסתור מרצעני, ספיק חמניות, מרווה,

ឧשבים בעלי רגשות בינוניים לתכשיר:

אשבל ערבי, גדיין, גראנום, שען, קידד א', דבקה, ברקן.

מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביבורת: 2013/גה"ץ 4153
• סיג'וג HRAC: B
• דרגת רעלות AI-מסוכן
• מיזר ומשווק ע"י אדמה אgan
• אריוזת: 0.5 ל"



חץ סופר ARROW SUPER

תרכיז מתחלב

קוטל עשבים סיסטמי, ברוני לגידולים רחבי עלים המיעד להדברת עשבים דגניים לאחר הצחתם.

Clethodim:

להדרבת יעה של העשבים הדגניים רצוי לרסס על עשבים רעננים בגובה של 5 – 20 ס"מ ולפni פריחתם. לתכשיר תוכנות סיסטמיות והוא נع כהעלווה המורסמת כלפי השורשים ומגיע לכל חלק הצמח והתת-קרקעים. סימני ההדבורה מופיעים כעבור שבוע עד שלושה שבועות לאחר הריסוס, בהתאם לגודל ולסוג הצמחים ותנאי מג' האוויה. התכשיר אינו רעיל לדברים.

הוראות כלליות ומועד הטיפול:

מנع רוחף לגידולים שכנים וצמחי תרבות. חל איסור ריעיה או קציר לשחת תוך 8 שבועות מהישום. יש לשכור על מרוח של לפחות 5 ימים בין הריסוס בתכשיר ורישוס כל קוטל עשבים אחר.

בדגנים רב-שנתיים, עם הופעת לבלב חדש של הדגניים, מטיפולים שניית. עקב חשש מפעילות שאיריתית של התכשיר בקרקע, אין לדרע דגנים בשטח שטופל בתכשיר עד חלוף חודשיים ממועד הטיפול. עשבים דגניים שטרם נבעו בעת הריסוס לא יודרו. גשם או המכטרה 3 שעות לאחר הטיפול לא יפגעו בעילות ההדבורה.

אין לרסס בתנאי מג' אויר קיצוניים כגון קרה, או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום, או סובל מנזקי קרה, מחסור אוורור קרקע, או מנזק מכותלי עשבים ועוד.

עמידות: במספר מקומות בארץ התגלו אוכלוסיות של עשבים דגניים שפיתחו עמידות לתכשירים בעלי מנגן פועלה מעקב'i (קובוצה A). בכל מקרה של חשש לעמידות, יש להשתמש בקוטלי עשבים בעלי מנגן פועלה אחר. מכון שלא ניתן לצפות מראש את התפתחות העמידות והתפשחותה, היצרן ו/או המSupplier לא נושאים באחריות כלשהי לנזקים העולמים להיגרם כתוצאה מהדבורה לא מספקת.

טבלת השימוש:

נפח התרסיס	רכיב לטיפול במוקדים	המינון לדונם	העשוב	הגידול
10 – 30 ל'/ד' בהתאם גובה העשبية צפיפותה. ציר' להגעה להרטבה טוביה של נוף העשبية	(000 700 סמ"ק/100 ליטר מים)	70 סמ"ק	דגנים חד-שנתיים כגון: דון, חפורית, שיבולת שועל, מיינ' שעורת בר, מיינ' זיפן, אצבען מאדים, דוחנית, סיסנית, ספיק חיטה	אגוז-אדמה, אספסת, אפונה, בקיה, בצל, גזר, חמניה, חמצה, חסה, חציל, כתנה, ברוקולי, סלך, סלרי, עגבניה, פטרוזיליה, פלפל, פפריקה, תפוח-אדמה, זית, כרמ, הדרים
טובה של נוף העשبية	(1 ליטר/100 ליטר מים)	100 סמ"ק	דגנים רב-שנתיים: דורה, ארם-צובה (קוצאב), יבלית, פספלום	

שילובים: בחמזה ניתן לשלב עם סיגנון.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ול ביקורת: 2007/גהה"צ/1898
• סיווג HRAC: A **• דרגת רעלות AI-מסוכן**
• מיצר ומשווק ע"י אדמה אגן
• אריזות: 1 ל.5 ל'

טומהוק

תרכיז מתחלב

קוטל עשבים סיסטיי להדברת עשבים רחבי עלים בריסוס לאחר היצatom

Fluroxypyry 200 g/L (as meptylheptyl ester 288 g/L)

מנגנון הפעולה של טומהוק דומה לקטלי עשבים הורמוניים. הנזק לעשבים מתרbeta בעותקים ובהתפקידו של העלים והחיכוך הצעיר התcsiיר נקלט בעלה הירוקה וחודרגם למערכת השורשים. העשבים הרגישים הם מיini העשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים קשי הדברה כמפורט בטבלת הוראות השימוש.

הערות לטיפול: אין לד्रוע או לשתול כל גידול לאחר ריסוס בטומהוק במשך 3 חודשים ממועד היישום. ניתן לרסס בטומהוק בכל שעות היום.منع מגע התרסיס בעלות עצי הפרי. הימנע מרחף התרסיס לגידולים שכן העלים יהפגן מפעילות החוכמה. החומר חודר לעשב העלווה הירוקה لكن רסס על צמחים רעננים. רצוי לרסס לאחר ההשקייה. **אין להשתמש בטומהוק בזמן ההשקייה או לאשר יש מים עומדים בשטח.** אין לרסס בהרואה. אין לרסס טומהוק כאשר הגידולים או העשבים נמצאים בתנאי עקה (כגון יובש, שרב, עודפי מים, קרחה, פגעה מקרוטלי עשבים וכו').

שילובים: ניתן לשילב טומהוק עם ראנדאפ/גליפונג במועד הטיפול המוצרים בהוראות השימוש, כפוף לרישויים בגידולים הנ"ל. השילוב של טומהוק עם ראנדאפ מsofar את הדברת גומא הפקעים (סעידה).

הערות	נפח התרסיס (ל'/ד')	הרכיב (%) או המינון (סמ"ק/ד')	העשבים המודברים	הגידול	טבלת השימוש:
מנע רוחף של התרסיס לעלות העצים. בעצם מגנו צעירים באזרק בקעת הירדן אין לרסס טומהוק בתקופת הליבוב. ראה סעיף שלובים.	30-20	0.25% 0.5%	אבוטילון, דטורה, רגלה הגינה, יוקט, החמור ונבטים של רחבי עלים שונים.	מסעים - מהשנה השלישית לניטה: אגס, אפרסקון*, אפרסק, הדרים, דית, מנגו, משמש, פיג'ואה, פקאן, שדי, תמר, תפוח, רימון, אנונה, אספוגוס, הווי נודד.	
אין חשש מפגיעה התרסיס בעלות הגידול.		0.25%	חבלב, ייבוט, סולנום זיתני, ארכובי, אבוטילון, דטורה, רגלה הגינה, יוקט, החמור ונבטים של רחבי עלים שונים.	חוובגה	
יש לרסס בסיכון לאחר הרשאה.		120-150 סמ"ק/דונם	חבלב, ייבוט, סולנום זיתני, דטורה, לכיד, רגלה הגינה, אבוטילון, יוקט, החמור ונבטים של רחבי עלים שונים. בלבד.	תירס מוחק מזן ג'וביל ותירס למספוא בשלב 4-6 עלים	
תרסיס או רוחף שיפגע בצתמי תרבות בשולי הדשא עלול לגרום להם נזק חכו.		0.5%	מינימציא, מיני חבלבוב, אספסת, ארכוביות ונבטים של רחבי עלים שונים.	דשא דגני בתקופת החורף בלבד: בופלון, דורבן, דני, קיקיון, זואייטה, פספלון, ק'ק'יון	
הミニון לפי רמת השימוש ושלב התפתחות. ראה סעיף שלובים.	20-10	150-120 סמ"ק/ד'	יבוט, סולנום זיתני, הגא	הכתנת שטחים לקוראת זריעת חיטה בקרקעות בינוניות וכבדות. עד חדש לפני זריעת החיטה	
ראה סעיף שלובים.	50-30	250 סמ"ק/ד' או 0.75% בכתמים	הגא, ייבוט, סולנום זיתני, פטל, חבלב, ארכובי שבטבטית, חנק, אספוגוס וחד-שנתיים רחבי עליים המוצרים לעיל	לאורך פס רכב הצד דרכים בענויות, סבב מאוגני מים ותעלות ניקוז, שטחים סביב ישוב ומתקנים חקלאיים לא צמחי תרבות	

* אין לרסס באפרסקון בזמן לבולב וחנטה עד לאחר קיטיף ובזמן הימצאות סורי שורש מלבלבים.

- מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולבייקורת: 0000/2000/הגה"ץ/1581
- סיווג HRAC: O
- דרגת רעלות V-I-מסוכן
- מיזר ומשווק ע"י אדמה אגן אריזות: 1,75 ל'

טרבוטרקס

騰
רכיז ריחף
קוטל עשבים למניעת הצהה של עשבים חד-שנתיים בגידול שדה שונים

Terbutryn 500 g/L

טרבוטרקס הינו קוטל עשבים מerbaceous המונע הצאתם של מרבית העשבים החד-שנתיים פרט לדגני קזיא שבולת שעול, דון, בר גבעו ולשישית. קיימים גם עשבים שפיטתו עמידות לטוריוזינים. להדרכת העשבים אלו (במניעת הצהה או בקטילת מגע) יש לשלב לטרבוטרקס תכשיר מותאים המורשה לגידול. טרבוטרקס קוטל עשבים קיימים עד גובה 5 ס"מ במינונים הנחוצים בגידולים חד-שנתיים.

הערות לטיפול: אין לרוסס בתנאי מג אוויר קיצוניים כגון קרה או שרב או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובב מנזקי קרה, מחוסר אוויר או מנזק מקרוני עשבים ועוד. מנע ריחף תרסיס לגידולים שכנים וללא עצים מטופלים.

הפעלה התכשיר: הפעלת החומר תישא ע"י גשם או המטרה בכמות של 20-40 מ"מ. יש להפעיל את החומר לא יותר מאשר 7 ימים לאחר הריסוי, עד להפעלו לא ימנע החומר הצחת עשבים.

הערות	נפה התרסיס (ל'/ד')	המינון (סמ"ק/ד' מרוסס)	מועד הטיפול	הגידול
	30-10	120-150-200 קראע חולית קלה כבדה	קדם לצהה לפני מתן המטרת ההנבטה	אגוזי-אדמה למעט זני קונגו
צריך להקפיד שהזרעה תעשה בעומק של 4-5 ס"מ.	30-10 5	ריסוס קראע קראע קליה 200 קראע בנונית 250 קראע כבדה 300 ריסוס אוויר קראע בנונית וכבדה 200-250	לאחר דרישה- לפני הצאת הגידול	חמצה
	30-10	קרע קליה 150 קראע כבדה 200	לאחר דרישה- לפני הצאת הגידול	אפונה
חמניות הקפוד על עומק דרישה של 4-5 ס"מ. לא פחות מ-	30-10	קרע קליה ובונונית 150 קראע כבדה 200	קדם הצהה	חמניות לפיצוח

שילובים: בגידולי שדה טיפול קדם הצהה אפשר לשלב טרבוטרקס להדרכת עשבים הגבוהים מ-5 ס"מ עם גלייפוגן או ראונדאף, במינונים ובנפח התרסיס המפורטים בתוויתם, אולם במקורה של שילוב עם רגלאן צריך להכניסם למכל המרסס רק בגמר המילוי ולרטסם בנפח התרסיס של 20 ל"ד לפחות. ניתן לשלב עם ראונדאף או גלייפוגן בסוף המכילו.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 1036/גה"צ/89
סיווג HRAC: C
דרגת רעלות III – מסוכן לבリアות
מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן
אריזות: 1,5 ל'

TROPIGAN

להדברת עשבים רחבי-עלים במטע, החל מהשנה השלישי לנטיעה, צדי דרכים, לאורך פס' רכבת וצד דרכים בינויו נאות, שטחים סביב' יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות

הערות	הערות	הgidol	הרכוץ	נפח התרסיס	מודברים	עשבים	הערות
יש להקfid ולרסס בתנאים נאותים של העדר רוח וטמף מתונות. הימנע מפגיעה בחלקן הצמח הירוקים כולל חזרם. הימנע מרטסום בעת פריחה. היזהר מפגיעה בגידולים שכנים.	רחבי-עלים חד ורב-שנתיים חורפים וקיצים	אבוקדו, נקטרינה, זית, אפרסק, הדרים, רימון, שזיף, תפוח	0.3% בשילוב עם ריסוס עד הרטבה מלאה ואונדאף 1%	30-40 ל/ד'	ריסוס עד רטבה מלאה במצעות מוט ריסוס, ריסוס רוביים או כורסי גב	מקיל: L/g 720 אמין של חומצת D-4, בliter, אקוויולנט ל- L/g 600 D-4,	קוטל עשבים להדברת עשבים רחבי-עלים בחיטה, מטעים ולאורך פס' רכבת וצד דרכים בינויו נאות, שטחים סביב' יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות
יש לרסת בתנאים של העדר רוח ולהיזהר מפגיעה בגידולים חקלאיים סמכוכים.	30 ל/ד' ומעלה, כנדרש לכיסוי מטבי של העשייה	לאורך פס' רכבת וצד דרכים בינויו נאות, שטחים סביב' יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות.	0.6%-0.3% בשילוב ואונדאף 3%-1%	3 ל/ד' ומעלה, כנדרש לכיסוי מטבי של העשייה	מהאוויר 3-5(2) סמ"ק/ד'	מהפרקע 15-25(2) סמ"ק/ד'	חיטה (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)



מספר הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2020/גהה'צ/4605
 סיווג CHAC: O
 דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
 Adama Poland
 אריזות: 5 ל' מושוק ע"י אדמה אגן

הgidol מועד הטיפול נפח התרסיס (ל'/ד') המינון הגידול
 עם סיום התמיינות השיבולת ולאחר הופעת 6

- (1) אין לרסת חיטה בתנאי עקרה. עקט יובש לפני ואחרי ריסוס, עלולה לגרום לפגיעה בגידול. בזמן הריסוס יש להקfid על קיבול שדה.
- (2) ריסוס אוויר מותנה באישור השירותים להגנת הצומח. **הנחיות לריסוס אוויר:**
 לא יפזר אדם, מכירין או בעקביפין, רעל או כימיקל מדיק מכל' טיס -
 (א) מעל בית או במרחך של 120 מטרים מכמן.
 (ב) מעל דרך או במרחך 12 מטרים מכמן.
- (3) כאשר הרוח נשבת מכךון השטח המכועד לריסוס לכיוון בית או דרך. כיוון הרוח יבדק לפני הריסוס ובמהלכו על ידי אבקות עשן דלקת בשטח.
- (4) הגל הפנולוגי המכודיק לקבעת מועד הריסוס המכודם ביותר הוא סיום התמיינות השיבולת. ניתן לזהות זאת באמצעות חותך אורך בסיס הצמח. יש להימנע מריסוס מכודם מדי, במיוחד בזמן אפלים כגון אריאל. אין לשלב עם דשן אורgan מחשש להתגבותות.

לפני השימוש יש לקרוא את הנחיות המופיעות בתווית התכשיטים.

COTTOGAN

תרכיז ריחוף

קוטל עשבים ברני להדברת עשבים חד-שנתיים בគונתנה

Fluometuron 500 g / ליטר

គונתן מתאים לשימוש להכנת שטחי כותנה וטיפול קדם הצזה, בזרעה ביבש וברטווב. התכשיר מדבר עשבים חד-שנתיים כגון: מצליבים, כף-אווז, לשישית, ציני ירבוץ (אמרנטואס), סולנום שעיר, רגלה הגינה, קוטב, לכיד, דגניים שונים ועוד.

គונתן מופעל ע"י גשם או המטרה לאחר הריסות. למניעת נזק לגידול עוקב השטח חיב לקל לפחות 40-50 מ"מ המטרה (או גשם).

העורת לטיפול: הימנע מרוחף של התרסיס לגידולים שכנים. הכנת הקרקע: רצוי שהשתח יהיה מוקן לא הגבים כמו לזרעת דרעה.

הוראות שימוש בគונתנה בשלחין לסתיבים

הערות	הפעלת התכשיר	נפח התרסיס (ליטר/דונם)	המינון (סמ"ק לדונם מרוסס)	מועד הטיפול
אין לטפל בគונתן בלבד-קל. יש להקפיד שעומק הזרעה לא יהיה פתוח מ-2 ס"מ.	50-30 מ"ק/ד' בהמטרה תור 3 ימים לאחר הריסות	30-10	באדמות לס כבד 160 באדמות ביןיות עד כבדות 190 באדמות כבדות ממד 240	זרעה ביבש במושלב עם הזרעה, או מיד לאחריה, לפני הצחת הגידול והעשבים
גוף קרוב מאוד להצחה עלול לגרום לנזק חולף לכונתנה.		30-10	באדמות כבדות בלבד 240	זרעה ברטוב במושלב עם הזרעה, או מיד לאחריה לפני הצחת הגידול והעשבים



אדמה

מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ול ביקורת: 89/הגא"צ/1037
• סיג'וג HRAC: C • דרגת רעלות IV - מסוכן
• מיצר ומשווק ע"י אדמה אגן
• אריזות: 5 ל' •

הערות	הפעלת התכשיר	נפח התרסיס (ליטר/דונם)	המינון (סמ"ק לדונם מרוסס)	מועד הטיפול
* בטשטח שקיבט טיפול חורפי בគונתן או בתכשיר פלאואומטורון אחר, רצוי להימנע מרישום נוספת בעונה. אם השטח משובש בעת הריסוס בעשבים קיימים ניתן קוטל מגע מוששה.	גשם או המטרה	30-10 מ' מהקרקע כלול לס מטרת כבידה	480-320*	320-240*

1 חודש עד 1 ימים לפני הזרעה	240-160*	190-130*	1-3 חודשים לפני הזרעה
-----------------------------	----------	----------	-----------------------

* ככל שמתקרבים למועד הזרעה הקטן את כמות התכשיר.
לפני השימוש יש לזרע את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

cotongan (המשר)

הוראות השימוש בcotongan שלחין לסיבים (המשר)

מועד הטיפול	המינון (סמ"ק לדונם מרוסס)	הערות	הפעלת התכשיר	נפח התרסיס (ליטר/دونם)
אזהרה: כדי למנוע הגעת cotongan עם המים לניזדים אחרים, אין להתקין את מתקן ההזרקה לקו הריאשי המספק מים לחלקות נוספות, אלא לצינור משני המספק מים אחר וroken לשדה המועד לטיפול. לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכי החברה.	הזרמת החומר תעשה לקראת סיום ההשקיה. לאחר גמר ההזרקה יש להשקיות כ-15 דקות נוספת.			

שילובים:

כדי להרחב את מגוון העשביים הנקטלים ולפגוע בעשביה קיימת, ניתן לשלב cotongan עם דיאורקס. בכל מקרה של שילוב יש להכניס לככל קודם אתcotongan ואחר כך את התכשיר המשלב, ולבסוף את יתרת המים. ניתן לשלב גם עם גלון אך יש להכניסו לככל המרסס רק בגמר ملي המים ולרטס בנפח תרסיס של 20 ליטר/دونם לפחות.



ADAMA
אדמה

מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 89/הגא"צ/1037
• סיווג HRAC: C • דרגת רעלות VII - מסוכן
• מיוצר ומושוק ע"י ADAMA AGRI
• א麗זוט: 5 ל' •

LEGATO

תרכיז רח'ף
קוטל עשבים ברוני המיועד למניעת הצצה וקטילה של עשבים חד-שנתיים רחבי עלים בחיטה, באץ,
מטעים ולאורך פס' רכבת וצד' דרכם ביןירוניות, סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז, שטחים סבב יישוב
ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות, בתוך יישוב.

Diflufenican 500 g

לגטו הינו קוטל עשבים בעל מנגנון פעולה יהודי הגורם לפגיעה במערכת הפוטוסינטזה בדרך של פגעה בקרטונואידים וחמצון הצלוחופיל בעלי הצמח. העשבים הרגישים לתכשיר מלבים ומדברים סcour לאחר שימוש התכשיה. החומר נקלט על ידי העולה ושורשי העשבים והנבטים המודברים.

הערות לטיפול: התכשיר גורם להלבנת נוף הצמחים הרגישים -منع רוחף לצמחיה רצואה. אין לרסס בדמן שהగידול נמצא בתנאי עקה כגון עודף מים או חוסר ובתנאי מג אויר קיצוניים של חום וקור. להפעלת התכשיר כמנע הצצה דרישה הרטבה של הקרקע (השקה או גשם). בטיפול אחר הצצה לגטו מיועד בעיקר להשלמת פעילות ההדבורה של קוטלי עשבים רחבי עלים אחרים. השימוש בו יגדיל את סתווח העשבים המודברים. לגטו ידביר ימנע הצצת עשבים רחבי עלים בלבד. אין לשאלב לגטו עם קוטלי דגניים. יש לשאכזר על פער של 72 שעות בין ריסוס קוטלי דגניים לריסוס לגטו. אין לרסס לגטו יותר מפעם אחת בעונה. בכינויים המכמלצים לגטו יעליל נגד עשבים צעירים (עד 6 עלים אכייתיים או 20 ס"מ), ימנע הצצה של מינו עשבים הרגישים לו כמפורט להלן:

نبטים של העשבים הבאים יקטלו והצטטם תימנע: חלמית, חרדל השדה, דרדיה, ציפורן חתול, סלק בה, מניאירבו (שרוע, מופשל) נורת השדה, נזמית וכוכבית.

עצבים שהדברותם חלקית הם: חבלבל השדה, גדיין, ברקן, חריצית ודבקה.
עצבים שאינם מודברים: צמחים מכושחת הסוככים (מיini אכיתה, גזר בה, נירית הקמה) צמחים ממושחת הפרפרניים (גרגנית יוונית, כני קדד), שען ומקוור החסידה.

הפעלת התכשיה: נעשה באכזעות 15 ס"מ כימ (גושם או המטריה) לכל הפלחות.
גידולים עוקבים: גידולים שאפשר לגדל בmachzor לאחר גידול שטופל בלגטו: חיטה, חמניות, כתונה ותירס בלבד. יש לחרוש את השטח לkratet גידול עוקב.

לפני השימוש יש לקרוא את ההוראות המופיעות בתווית התכשירים.

מ"מ הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 2010/גה"צ/1893
סיווג HRAC: F · דרגת רעלות IV - מסוכן
מיוצר ומשווק ע"י ADAMA · אדמא אגן
אריזות: 1 ל'



לגטו (המשך)

הוראות שימוש בבצל

הgilול ומועד הריסוס והקרקע	של עשבי הבר	השלב הפנולוגי	המינון (סמ"ק/ד')	נפח תרסיס (ל'/ד')
חלמית: עד גיל 6 העלים, כל שאר העשבים על פ"י הרשימה המפורטת עד 4 עלים (לא גבהים מ-20 ס"מ) כבדות בלבד.	בצל* החל מגיל 2 עלים אכתיים בזמן: 95 והזרע 7 בלבד. באדרמות גובהם מ-20 ס"מ)	חלמית: עד גיל 6 העלים, כל שאר העשבים על פ"י הרשימה המפורטת עד 4 עלים (לא גבהים מ-20 ס"מ)	20	40-20

*אין להשתמש לגטו בבצל המועד לשיווק יIRON עקב הופעת סימני הלבנה על העלים.

הוראות שימוש בחיטה:

הgilol ומועד הריסוס	השלב הפנולוגי של ריסוס	השלב הפנולוגי של עשבי הבר	המינון (סמ"ק/ד')	נפח תרסיס (ל'/ד')
חלמית: עד גיל 6 עלים. שאר העשבים רחבי עליים: עד 20 ס"מ גובה ולא יותר נקיים, שטחים סבירים ישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמח תרבות, בתוך ישוב	לאורך פס רכבת וצד דרכיהם בין עירוניות, סביב מאגרים מים ותעלות נקיים, שטחים סבירים ישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמח תרבות, בתוך ישוב	חלמית: עד גיל 6 עלים. שאר העשבים רחבי עליים: עד 20 ס"מ גובה ולא יותר נקיים, שטחים סבירים ישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמח תרבות, בתוך ישוב	50	30-20

*לשיפור הדבירה של עשביה קיימת נתן לשלב ראנדאף/גליפוגן. יש להוסיף את תכשירים האלה בסוף המילוי של מכל המרסס.

אזהרה: מחשש לפגעה, אין לטפל בלגטו לפני הצצת החיטה.

שילובים בחיטה:

השימוש בלגטו היה בדרך כלל בשילוב עם אחד מן התכשירים הבאים, על מנת להרחב את מגוון העשבים המכודרים:
ברומוטריל, אלבר סופר. אין לשילב לגטו עם תכשירים אחרים. ניתן לשילב לגטו עם אלבר סופר ורק עד שביעיים לפני הגעת
החיטה לתחלת התפצלות או הופעת עליה דגל, לפי המכוקדם מבניהם. לאחר מכן אלבר סופר, יש להקפיד על ניקוי ציזד
הריסוס כמפורט בתרוית תכשיה. לריסוס מהאוויר יש לקבל היותר מהשירותים להגנת הצמח. מיוני התכשירים המשולבים
וכורת היישום יהיו בהתאם להוראות השימוש המופיעות בתוויות התכשירים המכודרים.



מ"מ' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2010/גה"צ/1893
• סיג'וג HRAC: F
• דרגת רעלות IV - מסוכן
• מיצר ומשווק ע"י ADAMA אגן
• אריזות: 1 ל'

ליואפרד

רכיז מתחלב

קוטל עשבים דגניים ברני

Quizalofop 100 g/100 g-ethyl-p-ethoxyfop

ליואפרד הוא קוטל עשבים סיסטמי, ברני לגידולים רחבי עלים, המועד להדרכת דגניים חד ורב-שנתיים רבים לאחר הצאתם. ליואפרד נקלט בעיקר דרך העלווה. מספר ימים לאחר הריסוס נוצר צימוח הדגן, העלווה מצהיבה ולאחר מכן מתיבשת. סימני הפגיעה בעשבים יראו תוך 4-5 שבועות ממועד הריסוס בהתאם למין העשב, גזע ותנאי האקלים.

הערות כלליות:

מודע הטיפול: ניתן לריסס את הגידולים המורשים בכל שלבי התפתחותם כל עוד העשביה נמצאת בשלב מתאים להדרכה ולא מכוסה על ידי הגידול. כדי לקבל הדобра מרבית יש לריסס על צמחים ירקניים ורעננים. אין לריסס גידול הנמצא בעקה (חמסון, יוב, קרה, פגעה מקרוטלי) עשבים או כל גורם אחר. רצוי לריסס עשבים חד-שנתיים בשלב של 3-4 עלים עד תחילת הסתעפות, דורות ארום-צובא עד גובה 40 ס"מ ויבളית בגודל עד 15 ס"מ. להדרכת עשבים מפותחים יותר נדרש המכון הגבוה. צריך לריסס את העשבים לפני פריחתם. עשבים דגניים שטרם נבטו בעת הריסוס לא יודברו.

הערות לטיפול: יש לשמר על מרווח של לפחות 3 ימים בין הריסוס בליואפרד וריסוס כל קוטל עשבים אחר. לקבל הדобра עילאה של העשבים ימנעו מהשקה בהמטרה ורקו שלא ירד גשם במשך 6 שעות מהרישוס. אל תרסס ברוח ומגע כל רוח לגידולים שכנים או לצמחים דגניים סוככים.

עמידות:

ישן אוכלאזיות של עשבים דגניים שפיתחו עמידות לתכשירים בעלי מגנון פעולה מעקב ACCase (קבוצה A). בכל מקרה של חשש לעמידות, יש להשתמש בקוטלי עשבים בעלי מגנון פעולה אחרת מכון שלא ניתן לצפות מראשת את התפתחות העמידות והתפשטותה, היצרן ו/או המשוווק לא נשאים באחריות כלשהי לנזקים העולמים להיגרם כתוצאה מהדобра לא מספקת.

גידולים עוקבים:

בשדה שטופל בליואפרד אין לדזרע גידולים רחבי עלים (פרט לאילו המורשים בתוויות זאת) לפני חלוף 4 שבועות מהרישוס, ואין לדזרע גידולים דגניים לפני חלוף 6 שבועות מהרישוס.

טבלת השימוש:

נפח התרסוס (ל'/'ד')	טיפול בموقعדים (הרכיב)	ריסוס רצוף*** ה uninon (ס"מ"ק/ד')	הعشבים המודברים*	הגידול
בהתאם לגודל העשביה וציפופטה. בריסוס רצוף: 10-30. בטיפול בموقعדים: 20-40.	0.25%	100-50	דגניים חד-שנתיים: шибולת שעול, שעורה, ספיק חיטה, ספיק תירס, מנិ חפורית, זן, ברומית, זיף, בן-חיטה, דורה רותמית, אלבנסין הודיית, דוחנית התרנגולים, דוחנית השלחין.	גד"ש כותנה, אגוזי אדמה, בקיה, אפונה*, חמצה ירקות עגבניה, פלפל, פפריקה, אבטיח, בצל, שום, כרובים, חסה
יש להגיע להרטבה מלאה של נוף העשביה.	0.5%	100-80 150-100	דורות ארום-צובא דרעים עד גובה 10 ס"מ צמחים מקנה שורש	מטע אגס, תפוח (מהנטיטה)
	1.0%	200-125	יבלית	הדרים (גיל 3 שנים)

* בדגניים רב-שנתיים מתחדשים ניתן לטפל שנית בהגיעה לגובה 20-30 ס"מ.

** באפונה זן, לעיתים בעקבות הריסוס מופיע העצהה בעלים העליונים. העצהה נעלמת בהמשך ללא כל השפעה שלילית

וחשש לעמידות, יש להשתמש בקוטלי עשבים בעלי מגנון פעולה אחרת מכון שלא ניתן לצפות מראשת את התפתחות העמידות

והתפשטותה, היצרן ו/או המשוווק לא נשאים באחריות כלשהי לנזקים העולמים להיגרם כתוצאה מהדобра לא מספקת.

*** לפני גובה העשביה.

**** מטרת רעלות IV - מסוכן

• מיזר ומשווק ע"י אדמה אגן

• סיג'וג HRAC: A • דרגת רעלות IV

• ארידזוט: 1,5,7' • מיזר ומשווק ע"י אדמה אגן

מכ' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2001/גה"ץ/1627

ADAMA אָדָמָה

LINUREX

תרכיז ריחוף

קוטל עשבים ברני בתופח אדמה ובגזר

Linuron 500 g/L

מכל: L/500 g

טבלת השימוש:

הערות	נפח התרסיס (ל'/ד')	סוג הקרחע	המינון (סמ"ק/ד') לפני	מועד הטיפול	הגידול
אסור לריסוס על גבי נוף ק'ים של תופוחי-אדמה	30 - 10	100-120 - קלחה 150 - בינוי ולס 180 - כבדה	לפני הצחת תפוי"א, לפני הצחת העשבים או טרם הגיעם לגובה 5 ס"מ	לפניהן של העשבים שארתי הכוונה לצאתם של עשבים חד-שנתיים וקוטל במקביל מגע עשבים חד-שנתיים עד לגובה של 5-8 ס"מ (אינו מוגן ואין מדובר ק'יצת, דzon או סוכרים).	תפקיד-אדמה
ניתן לבצע שני טיפולים בעונה.	30 - 10	150 - קלחה ולס 200 - בינוי וכבדה הانبטה.	1. מיד לאחר הדירעה ולפניה השקית 2. בהגיעו הגידול לגיל 3 עליים, לפני הצחת העשבים או כל עוד הם קטנים מ-8 ס"מ.	גדר	השתמש בתכשיר על שטח נקי מעשביה או על שטח שבו החלה כבר הצחת עשבים.

שילובים:

בטיפול לפני הצחת הגידול ניתן לשלב עם ראנידאף או גלייפונג, ג'לון. במקרה של שימוש של שילוב עם ג'לון נפח התרסיס 20 ל'/ד' לפחות.

יש להוסיף את התכשירים המושלבים בסוף מילוי מכל המרסס בכימם. בהתחשב במגוון דנים, בסוגי קרחעות ותנאי גידול שונים יש לבצע בדיקת שילובים בקנה מידה מצומצם ולבדוק את הבטיחות והיעילות בטרם יישום בקנה מידה משקל. במקרה של שימוש לינורקס עם תכשיר נוסף, יש להתחשב גם באמצעות הטעות המפורטים בתווית של התכשיר המשולב.

לינורקס הינו קוטל עשבים שארתי הכוונה לצאתם של עשבים חד-שנתיים וקוטל במקביל מגע עשבים חד-שנתיים עד לגובה של 5-8 ס"מ (אינו מוגן ואין מדובר ק'יצת, דzon או סוכרים).

לינורקס מתאים להדבירה ברנית של עשבים לפני הצחתם, ובמקרים מסוימים מותאים גם להדבירה עשבים ק'ימיים, لكن ניתן להשתמש בתכשיר על שטח נקי מעשביה או על שטח שבו החלה כבר הצחת עשבים.

הפעלת התכשיר:

הטכשיר ימנע הצחת עשבים לאחר הפעלתו ע"י גשם (לפחות 20 מ"מ) או המטרה של 20 - 30 ס"מ/ד. יש להפעיל לא יותר מ-8 ימים לאחר הריסוס. להטילת עשביה ק'ימית יש לדוחות את מתן הרשתקה עד חלוף 48 שעות מהרישוס. גידולים עוקבים: גידולים שאפשר לגדל במחזר לאחר גידול שיטופל בלגטו: חיטה, חמנית, כותנה ותירס בלבד. יש לחרוש את השטח לkratot גידול עוקב.



מכוון הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 90/גה"צ/1119
 • סיווג HRAC: C • דרגת רעלות IV - מסוכן
 • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן
 • אריוזת: 5 ל'

תרכיז ריחף

טטעים ועצי יער

הערות	נפח התריסוס (ל'/ד')	מועד הריסוס	המינון (סמ"ק/ד')	היגיון
יש לשלב עם גלgin בהתאם לאזהרות בתויתת הgalgin	20	קדם היצעה, סתוי-חויר	200 בכל הקרקעoot	אבקדו, אפרסמו, גפן, הדרים, אפרסק, דית, עצי יער (ברוש, אורן), תפוח משנה לאחר הנטיעת הגידול

טטעים ועצי יער

טטעים בגידולים: בקיה, חמצה, אספסת, חסה עלים, מטעים ויער

הערות	נפח התריסוס (ל'/ד')	מועד הריסוס	המינון (סמ"ק/ד')	היגיון
יש להכטיר מיד לאחר הריסוס.	20	לאחר שהשתלים נקלטו ולפניהם העשבים הראשוניים	300	חסה עלים משתילה
יש להכטיר סמוך לאחר הריסוס.	*	לאחר הצצה, לאחר הופעה תלת עלה ועד גובה 10 ס"מ ובין הקציררים לא יותר מ-5 ימים לאחר הקציר	250-125	אספסת לירק ולזרעים - להדברת העשבים דגניים ח"ש בלבד

* בהתאם לשימוש או גובה העשבים.

טטעים בגידולים: מגלן מדבר ומלכיבים. התכשיר מדבר עשבים רגשים לאחר קליטתו דרך מערכת השורשים, لكن רטיבות נאותה חלקית, כף אווז, סרפד ומצלבים. פעילות החומר נפגמת בטמפרטורות מעל 28°C. עיבוד שטחי לא מבטל את פעילות החומר.

טיפול לטיפול: אין לרסס ברוח. מנע ריחף לגידולים שכנים. אין לרסס בתנאי לחות ובתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה, שרב או כאשר היגיון נמצא בתנאי עקרה כגון יובש, חום, נזקי קרה, חסור אוורור קרקע, נזק מקרוטלי עשבים ועוד. אין לרטובות ואין לקטוץ על השיטה המכוסה ממועד הריסוס ועד חלוף 60 יום מכמועד הפעלת התכשיר ע"י גשם או המטריה.

הפעלה: למניעת הצצה יש להפעיל את התכשיר בגשם או המטריה של 20 מ"מ לפחות. הריסוס עיל אם יופעל תוך 30 יום מריסוסו. הטיפול ידביר עשבים קיימים רגשים רק בתנאים של רטיבות נאותה בביות השורשים.



גידולים עוקבים
תקופת המתנה בין הריסוס לגידול הבא כלהלן:

תקופת המתנה	הגידול
אין להשתמש בתכשיר בשודות בהם לא מובטחת כמות משקעים (גושם או המטרה) של 250 מ"מ לאחר הריסוס.	קינרס, חסה
למנועה הוצאה שעשים יש להפעיל את התכשיר עם גשם או המטרה לאחר הריסוס.	גזר, קרפו, קרוביים, תות שדה, תירס, כותנה, תפוחי אדמה, سورגים
חמצה.	פלפל, עגבניה, חציל, סלק, דלועים, בצל, שום, תרד

תקופת המתנה	הגידול
12 חודשים	דגנים לתחמץ, דשא
בקיה בזינים: שודות, פונני.	בקיקעות כבדות בלבד
תלtan בזינים: תבוח, פאל.	בקיקעות כבדות בלבד

הגידול	מועד הטיפול	(ס"מ"ק/ד'*)	המינון (מ"ק/ד'*)*	נפח התריסס (ל'/'ד')
חמצה.	מיד לאחר הזרעה, לפני הוצאה, לא יותר מראשית ינאי	200-100	200	20
בקיה בזינים: שודות, פונני.	מיד לאחר הזרעה, לפני הוצאה			
תלtan בזינים: תבוח, פאל.	מיד לאחר הזרעה, לפני הוצאה			

* בהתאם לשיבוש או גובה העשבים.

מוניטור MONITOR

גרגירים רחיפים

קוטל עשבים ברורי להדברת עשבים דגניים ורחבי עלים בחיטה, להדברת עלkat ועשבים נוספים בעגבניה
ולהדברת גומא הפקעים ועשבים אחרים בדשא.

מכיל: 75% Sulfosulfuron

טבלת השימוש

הערות	נפח תרסיס (ל'/ד')	נפח המינון (ג'/ד')	העצבים המודברים	הגידול
יש להוסיף משטח DX ברכיך 0.25%	30 - 20	5 - 3.5	דגניים** בהתאם לומת השיבוש. רחבי עלים*** עד גיל 4 עלים אכיתיים.	חיטה* מגיל 4 עד סגירת הנוף. באדמות ביוניות, לש וכבדות בלבד. עד גיל 4 עלים אכיתיים.

* מהזנים: גליל, עתיר, אריאל, דאריאל, בית השיטה, ענבר, איילון, נירית

**dagneys ורגשים: מיני ברוכמות (הגגות, מטאטא), מיני שעורה (התבוח, מכחילה, ספיק), מיני חפורית (קטנה, מצואה).

dagneys ורגשים חלקית: חפורית מוזרה, שיבות שועל.

***רחבי עלים מודברים עד שלב 4 עלים: שען, אכיתה, נזמית, מקור החסידה, מיני מצלבבים, סלק.

עצבים רחבי עלים שאינם מודברים: חלמית, ברקן, גידlon, דרדך, חבלבל. לשיפור הדברתם יש לשלב מוניטור עם דופלוזן VA, זיגואר, ברומוטריל (תיתכן הפעטה מסוימת בעילות הדברת העשבים הדגניים).

תנאים הדרושים לפעילות מיטבית של מוניטור ובתיות לגידול:

לקבלת דרך הקרקע דרישה הפעלה של המטרה (25 - 30 מ"ק/ד) או גשם.

הגידול והעצבים צריכים להיות במצב צימוח תקין ונורא. חסור משקעים לפני או אחרי הטיפול עלול לגרום בעילות ההדברת.

להדברת עשבים כיטבית, הגידול צריך להיות בעומק מלא ולא במצב עקרה (כמפורט באזהרות לעיל).

מוניטור הינו חומר שארית בקרקע - ראה מגבלות לגידולים עוקבים בהמשך.



מ"ס הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 2002/גהה"צ/1672
 • סיווג HRAC: B
 • דרגת רעלות 7A - מסוכן
 Sumitomo Chemicals
 • ארכ'זות: 133 גרם
 • משוק על ידי אדמה אגן

SOLETO

קוטל עשבים/ תרכיז רחיף תר.

מכל: **METOBROMURON 500 g/Liter**

כליל: סולטו הינו קוטל עשבים מerbocot מותמרות השטן, המכונע הצאה של עשב-בר חד-שנתיים רחבי עלים ודגניים בתפוח אדמה.

הערות	טבלת השימוש					
	ימי המנתנה לאס'יף	נפח תרסיס (ל'/ד')	המינון (סמי'ק/ד')	מועד הטיפול	הגידול	
"ישום יחיד בעונה המותנה"	לא ימי המותנה	25-20	200	אחרי זריעה ולפני הצצת קורונה, ויואלאן)	תפוח אדמה (ג'ורג'יה, ס'פירה, מנוק), הגידול והעשבים	

שימוש: "ישום בשילוב פיטון ג.ה, בכינון 50 גרם/ד' יספר את פעילות מניעת הצצת של העשבים כגון: חלמית, סבון העARBOT, ופגע בחינויות מני ירבות שיצץ.

סולטו 500 ת.ר. קוטל עשבים לשילוב קדם הצצה, להדרכת עשבים רחבי-עלים חד-שנתיים ודגניים חד-שנתיים.

סולטו 500 ת.ר. נקלט בצמח בעיקר דרך השורשים ומוועבר כלפי מעלה בתחום הצמח

סולטו 500 ת.ר. פועל על ידי עיכוב תהליכי הפוטו-וינטה בעשבים רגשיים.

"תיכון ותרחש שני צבע זמני בצמחים בתנאי מג אויר מסויימים, או כאשר גשם כבד יורד לאחר היישום תופעה שעוברת במהרה ואין לה השפעה על היבול או הגידול.

"שימוש התכשיר ימנע הצצה של מרור הגינות, סרפד צורב, כף אווז וקוכיה הודית ידביר נבטי ספיק חיטה ויבליות אחר הצצתם.

"שימוש בשילוב פיטון ג.ה, בכינון 50 גרם/ד' יספר את פעילות מניעת הצצת של העשבים כגון: חלמית, סבון העARBOT, ופגע בחינויות מני ירבות שיצץ.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביברות: 4673/הגה"צ/2025
סיווג HRAC: C2 • דרגת רעלות 3 - מסוכן לבリアות
אריזות: 1,5 ליטר • מיוצר ע"י CERTIS BELCHIM, בלגיה
שיווק על ידי אדמה אגן

מוניטור (המשר) MONITOR

שילובים בעגבנייה: ניתן לשלב באחד מטיפולי המוניטור בלבד סנקור או ציטוסו להרחבה תווור העשבים המודברים (בכיוון ירבוז שרוע).

גידולים עוקבים:
לאחר ריסוס מוניטור בחיטה ניתן לגדל חיטה, עגבנייה, תפוח אדמה או חמצה (בגידול זה מינימום משקעים מצטברים לאחר ריסוס המוניטור – 450 מ"מ).

לאחר ריסוס מוניטור בעגבנייה ניתן לגדל חיטה או עגבנייה בלבד. בחיטה שתיזרע עוקב לאחר עגבנייה או ת"א שטופלה במוניטור, אין לרטס מוניטור שנייה; לגבי גידולים עוקבים לאחר החיטה – ראה מגבלות בסעיף הקדום.

הערות	נפח תרסיס (ל'/'ד')	נפח המינון (ל'/'ד')	הטיפול (ג'/'ד')	מועד המודברים (ג'/'ד')	העצבים המודברים	הgidol	דאש להדברת גומא הפקעים (סעידה) במדשאות.
להדברת עשבים קיימים יש להוסף משטח AX בריכוז 0.25% לשיפור ההדבירה רצוי להמתיר 24 שעות לאחר הריסוס וטור 3 ימים ב-20-30 מ"מ. ניתן לטפל שנית במקדים מתחדים.	25 - 20	7.5	7.5	לאחר שתילה והتبססות הדsha. לרטס לאחר CISOTH.	גומא הפקעים שטילה זיסיה	דאש דגני מהזנים: קוקייה, פספלון, דרבן, בופאלן, זני דיאסיה	דאש דיאסיה



מ"ס הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 2002/גהה"צ/1672
• סיג'וג HRAC: B
• מיזור ע"י Sumitomo Chemicals
• אריזות: 133 גרם
• משוק על ידי ADAMA אגן

עגניות לתעשייה
למניעת עליקת בחודשים הראשונים של הגידול. בשלבים מאוחרים יותר יתרו הוצאות של צמח עילית ליד הטפטפות.

הgidol	המודברים	העצבים המודברים	מועד הטיפול	ה uninon (גרם/ד')	נפח התרסיס (ל'/'ד')	הערות והפעלה
עגניות לתעשייה מהזנים 5811, RLT, 4077 4303, H9382, Ab8, H9665, 3518, 8892, 9176 APT539, - APT 390 בקרקע כבדה בלבד.	עליקת (הטיפול ידביר עשבים קיימים)*	טיפול ראשון: שביעות לאחר שתילה ורק כאשר הגידול בעל התפתחות תקינה. טיפול שלישי: אם ידוע שהשדה נגע מאד בעלתה – 6 שבועות לאחר שתילה	טיפול ראשון: שביעות לאחר שתילה ורק כאשר הגידול בעל התפתחות תקינה. 4 שבועות לאחר שתילה	5 – 8 לכל טיפול. המינון לרמת העלתה הצפואה. אין לרסס יותר מ 15 ג'/'ד בעונה אחת.	25 – 20	להדברת עשבים קיימים יש להוסף משטח AX בריכוז 0.25%. מיד לאחר הריסוס יש להמתיר 20-30 מ"ק/ד'. אם יש עשבים קיימים, המtan 6 שעות לפני המטרה.
			טיפול שני: הסוף משטח AX בריכוז 0.25%. לשיפור ההדבירה רצוי להמתיר 24 שעות לאחר הריסוס ב-20-30 מ"מ.	5	2.5	טיפול ראשון: לפחות שביעים לאחר שתילה ורק כאשר הגידול בעל התפתחות תקינה. טיפול שני: בהתאם להתקדמות צמחי הגומא, לפחות שביעים לאחר הטיפול הראשון.

* העשבים המודברים: ירבוז מופשל, ירבוז שרוע (הדרה חלקית), חבלב השדה, סולגום שרוע, חבלב עין שマー.

לפני השימוש יש לקרוא את ההוראות המופיעות בתווית התכשירים.

STRIKE

אפקה רטיבה

קוטל עשבים לקטילת עשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים במטעים וצד דרכם ולמנעת הצצת עשבים חד-שנתיים באגוזי אדמה.
מכיל: Flumioxazin 50%.

סטרייק הינו קוטל עשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים, שבשימוש ראונדאפ מושפר את קטילת העשבים קשי ההדבירה ומתקבלת פעילות קטילה מהירה ויעילה. סטרייק נקלט במחירות ע"י הלווה הירוקה וגולם להחמה, נבילה והתיישבות מהירה של הצמח. ניתן להבחין בסימפטומים תור 1 - 3 ימים לאחר הריסוס. מגנון הפעולה של סטרייק הוא על ידי עיכוב האנדים פרוטופורפירינוגן אוקסיד (Ox=PPD). סטרייק פועל בנוכחות אור וחמצן. לאחר הפעלתו, סטרייק מונע הצצת עשבים חד-שנתיים באגוזי אדמה כמפורט בטבלת השימוש.

הוראות השימוש במטעים

השימוש המודברים: השימוש של סטרייק וראונדאפ קוטל מגוון רחב מאוד של עשבים ח"ש ור"ש, גם מינים שאינם נקטלים בעילות ע"י ראונדאפ בלבד. כדי לקבל הדבירה מיטבית, רסס על צמחים ירקניים רעננים. בעשבים ר"ש המפותחים מאברי ריבוי תת קרקע, יש להמתין לפחות 7 ימים לאחר הריסוס. לקבלה הדבירה עיליה של עשבים יש להמנע כושקה בהמקרה במשך יומיים מעיבוד קרקע לפחות 600-300 או 2%. מנגע הגעת תרסיס או רוח לעלווה ולפירות של גידול תרבות, לגדי עצי שטרם השתעמו ולכל צמחיה רצויה, לאחר שנזק חמור עלול להיגרם להם. למניעת רוח רסס רק בשעות ללא רוח. ביריסוס בתערובת של סטרייק וראונדאפ, נהג לפאי כל הזראות ואמצעי הזיהרות בתווית הראונדאפ. אין סכנה מגיעה התרסיס בגדי עצי מעצים, המנע מכיסוי של תרסיס בענפים של עצי פרי ווגן.

ח"ש מודברים: דגניים ורחבי עלים שונים כולל חלמית, מעוג, נזמית, סרפף, מרלקולית, סוככים ומצלבים.

ר"ש מודברים: דגניים, גומא הפקעים, סולנום זיתני, אספרגוס החורש, חבלבל השדה, לוֹפִ, לוֹפִית חנק מחודד, ארואה משנית וכוטלית יהודה.

פני השימוש יש לקרוא את הנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

ניתן להשתמש בסטרייק בשילוב עם ראונדאפ בגידולים הבאים:

نפח תרסיס (ל'./ד')	מינון ראונדאפ (ס"מ"ק/ד' או %)	מינון סטרייק (ס"מ"ק/ד' או %)	העשבים המודברים	מועד הריסוס	הgidול
30-20	0.5% או 150	0.05% או 10	חד שנתיים עד גובה 10 ס"מ	במשך כל השנה	אבוקדו, הדרים, מנגו - מתום שנה לאחר הנטיעת
	200 - 300 או 1%	0.05% או 10	חד שנתיים עד גובה 40 ס"מ	לאחר גמר הקטיף ועד שבוע לפני התעוזרות בלבד.	אגס, אנונה, אפרסקון, אפרסק, גויאבה, גפן, פקאו, קיוו, שזיף, תפוח - מתום שנה לאחר הנטיעת
	500 - 250 או 2%	0.1% או 20	רב שנתיים	במשך כל השנה	לאורן פסי רכבת וצד דרכים ביןירוניות, סביב מגاري מים ותעלות ניקוז, שטחים סביב ישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות
50-20	200 - 300 או 1%	0.05% או 10	חד שנתיים עד גובה 40 ס"מ	לאורן פסי רכבת וצד דרכים ביןירוניות, סביב מגاري מים ותעלות ניקוז, שטחים סביב ישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות	כדי לקבל הדבירה מיטבית, רסס על צמחים ירקניים רעננים. בעשבים ר"ש המפותחים מאברי ריבוי תת קרקע, יש להמתין לפחות 7 ימים לאחר הריסוס. לקבלה הדבירה עיליה של עשבים יש להמנע כושקה בהמקרה במשך יומיים מעיבוד קרקע לפחות 600-300 או 2%. מנגע הגעת תרסיס או רוח לעלווה ולפירות של גידול תרבות, לגדי עצי שטרם השתעמו ולכל צמחיה רצויה, לאחר שנזק חמור עלול להיגרם להם. למניעת רוח רסס רק בשעות ללא רוח. ביריסוס בתערובת של סטרייק וראונדאפ, נהג לפאי כל הזראות ואמצעי הזיהרות בתווית הראונדאפ. אין סכנה מגיעה התרסיס בגדי עצי מעצים, המנע מכיסוי של תרסיס בענפים של עצי פרי ווגן.
	300-600 או 2%	0.1% או 20	רב שנתיים	במשך כל השנה	



מספר הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 96/הגה"ץ/1349

- מיזור ע"י: Sumitomo Chemicals
- סיווג HRAC: E
- דרגת רעלילות IV - מסוכן
- משוק ע"י אדמה אגן

• אריזות: 5X200 גרם שקיות מסילות

strike (המשר)

שילובים במטעים וצד' דרכים: ניתן לשלב סטרייק עם ראונדאף ועם מונע הצעה כגון דיורוקס 80 ת.ה. בכל השילובים הנל' נהג לפוי ההווארות ואמצאי הצעאות שכוופיעם בתווית של כל תכשיה

גידול שדה

סטייריק מיושם באגוזי אדמה לאחר הזרעה ולפני הצצת הגידול והעשבים. לאחר הפעלה של לפחות 20 מ"מ גשם או המטרה, סטרייק ימנע את ההצעה של חבלבל, ירבוץ לבן, כף אווז, לשישית הצעבים.

הgidol	אגוזי אדמה בקרקעות לס בלבד	מועד הריסוס	מינון סטרייק (gram/D')	נפח תרסיס (L/D')
		מיד לאחר הזרעה ולפני ההצעה	15	30-20 (ראה סעיף הפעלה)



מספר הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 96/הגה"ץ/1349
Sumitomo Chemicals • מיזוג HRAC: E
• מושוק ע"י אדמה אגן
• דרגת רעלנות IV - מסוכן
• אריזות: 5X200 גרם שקיות מסיסות

פוקואו אולטרה ®

תרכיז מתחלב

קוטל עשבים להדבורה ברורנית של עשבים דגניים חד-שנתיים ורב-שנתיים לאחר היצטם.

מכיל: L/g 100 Cycloxydim 1- L/g 300 משטח

פוקוא אולטרה קוטל עשבים דגניים לאחר היצטם, התכשיר ברורי לגידולים רחבי-עלים. החומר נא באופן סיסטי מהעלים לנקיות הצימוח. להדבורה ייעלה של העשבים הדגניים רצוי שהם יהיו בשלב של צימוח י록 ורען, לפני הפריחה. לתכשיר אין פעילות שאיריתית لكن לא יפגעו עשבים שטרם הציצו בעת הטיפול או טרם פתחו נוף מספיק לקליטת החומר סימני פגיעה בעשבים ייראו תוך 2-3 שבועות לאחר השימוש בהתאם לסוג הדגן, גלו ותנאי הגידול.

הערות לטיפול: על שטח שקיים טיפול בפוקוא אולטרה ניתן לדוחע גידולים דגניים רק החל מ-30 ימים לאחר הטיפול. מנע הרחף של תרסיס לגידולים שכנים. אין לרוסס בתנאי מג אויר קיצוניים כגון קרה או שרב או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע, או מנזק מוקטן עשבים ועוד.

ישן אוכליות של עשבים דגניים שפיתחו עמידות לתכשירים בעלי מגנון פעולה מעקב ACCase (קבוצה A). בכל מקרה של חשש לעמידות, יש להשתמש בקוטלי עשבים בעלי מגנון פעולה אחרת מכון שלא ניתן לצפות מראשת את התפתחות העמידות והתפשטותה, היצרן ו/או המשוויק לאושאים באחריות כלשהו לנזקים העולמים להיגרם כתוצאה מהדבורה לא מספקת.

הרכיב בטיפול בכתמים בונפה 20-30 ל'/ד'	המינון ב-ס"ק/ד' 30-10 ל'/ד'	טיפול רצוף בונפה ל' ד'	העשב	הגידול
0.75% 1.0%	*150-120 *200-150	200	דגנים חד-שנתיים חורפיים כגון דון, ברומית, חפורית, שיבולת שועל, בן חיטה, שעורת בר, שפחים של דגני חורף. על עשבים עד גובה 5-10 ס"מ: על עשבים מפותחים יותר:	cotonea, agave, adema, afonna, asperula, talta, bekia, bical, shom, gazar, kneras, dolouim b'shatot haftot, chosa, chamaea, chamaea, crub, crubita, crufos, ugbenia, flefel, zemach tablin (rabbi), ulim shonim), tephohi adema, sluk mspfa, sluk adam, terd, uszi peri nshirim, uszi, peri sbotrofim, hadrin, gfen, mashthalot uszi peri, prachim*, zmach noi rabbi ulim
1.0%	200	300-200*	דגנים חד-שנתיים קיצים כגון דוחניות, אלבסיין, אצבען מאדים, זיפן, זרעי דורות ארם-צובא (קוצאב), ספחים של דגני קיז	
1.5%-1.0%	300-200	400	דורות ארם-צובא (קוצאב), מקנה שורש יבלית	

*המינון הגבוה מיועד לעשבים מפותחים יותר ובצפיפות רבה יותר.

ניתן להשתמש בפוקוא אולטרה בפרחים הבאים: אספרוגים, אסתה, איריס, גיפסונית, ורד, חרצית, ליכונום, נרקיס, נורית, סיפון, סולידאסקו, פרח שעווה, פרגוניום, ציפורן, קלאה, רוסקו, שושן. **אזהרה: אין לטפל בפלוקס וליזיאנטום. לפני ריסוס פרחים

שאינם בראשימה ולפני ריסוס צמחי נוי וצמחים Tablin, יש לבדוק תחילת את בטיחות התכשיר על מספר מצומצם של צמחים.

מועד הטיפול - ניתן לרוסס בכל שלבי הצימוח של הגידול. הדברת דגנים יعلاה תתקבל מריסוס על עשבים במצבם פועל.

קוצאב יודבר ביעילות כשירוסס לפני שלופת עמוד התפרחת. גשם או המטרה שעה לאחר הטיפול לא יגרען מיעילות ההדבורה.

ריסוס חזדר ינתן בכתמים בהם התהדר צימוח העשבים הדגניים בהגעים לגובה 20-30 ס"מ.

שילובים - ניתן לשלב פוקוא אולטרה עם טומוהק או אלבר סופר רק באוותם הגידולים בהם תכשירים אלה מורשים לשימוש.

במקרים אלה הקפד על תנאי השימוש המכופטים בהתאם של תכשירים אלה.



מכו' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 90/גה"צ/1118
סיווג HRAC: A • דרגת רעלות 7A - מסוכן
אריזות: 1,5 ל' • מיזור ע"י BASF
שיווק ע"י ADAMA אגן

PYTHON

גרגירים רחיפים

קוטל עשבים ברני ל הדברת עשבים ולמניעת הצצטם בתפוחי אדמה ובקצה.

Metribuzin 70%

קוטל עשבים מכבצת הטריאזינים המדבר נבטים של מניע עשב-בר דגניים ורחבי עלים חד-שנתיים עד גובה של 5 ס"מ ומונע הצצטם לאחר הפעלה.

העשבים רחבי העלים המודברים:

מניע ירכוץ (למעט ירבוזים עכידים), רגלה הגינה, מניע כף אווז, מצליים (חרדל השדה, טוריים, צנון, שלח), חלמית, עוקץ ערב, אמיית גדולה, שען, נורית, לשנית, אמיר קוצני, קיזיצת, תורמוס.

עשבים דגניים מודברים: ספיק חיטה, שיבולת שעול, מניע חפוריות, זון, אצבען מאדים, דוחנית השלחין.

ישנים חיים עשבים המתחמקים מ פעילות הטריאזינים. הדברת עשבים מתחמקים ולקטילת עשבים קיימים גדולים צריך לשלב פיטון עם תכשיר מותאים המושהה לגדר.

טבלת השימוש

הערות	נפח התרסיס (ל'/ד')	המינון (גרם/ד')	מועד הטיפול	הגידול
ראה את רשימת הדנים מכיל: 70% Metribuzin	20	50 קרקע קלה - 75 קרקע כבדה -	קדם הצצת הגידול בלבד	תפוח אדמה בזרנים מורשים בלבד
יש לרטס בדיקנות לאחר כויל ולמנוע חיפויות ועכירות.	25-20	35 קרקע קלה - 50 קרקע כבדה -	לאחר 60 יום מהצצת הגדר או בהגיע אשrosis הגדר לעובי של עיפרון.	גזר
התחל בריסוס לא מאוחר מתחילה צימוח אך לא לפני הגיע צמח העגבניה לשלב של 4 עליים מפותחים. אין להשתמש בתכשיר בעגבניות חסויות. יש לשימוש לבביחוד על כויל ומינון מדויק ולהימנע מעכירות וחיפויות.	20	25	לאחר שהשתלים נקלו והתבססו בקרקע, בכל מקרה לא יותר מ-10 ימים לאחר השתילה.	עגבניות שחלולות בسطح פתוח בלבד בזרנים: 3540 9780, 3517

פיטון נבדק בתפוח אדמה בזרנים: מונדייאל, סנטנה, שרלוט, ואלו, דיטה.

הפעלה:

יש להפעיל את התכשיר ע"י גשם או המטרה של 30 ס"מ. לשיפור הדברה של עשביה קיימת יש להפעיל את התכשיר 48 שעות לאחר מכן הריסוס.

הערות לטיפול: אין לרטס את התכשיר בזמן של שינוי במצג האוויר כגון: סוכר לאחר גשם, ביצים סגריים, מיעוננים, קרם או זמן מעבר פתאומי למציג אויר חמ. יש לדחות את הריסוס עד יוכאים לאחר התייצבויות מצג האוויר. יש לרטס רק כאשר הגידול במצב התפתחות תקינה. אין לרטס בתנאי מצג אויר קיזוניים כגון קרה, או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יבש, חום או סובב מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע או מנדק מקטולי עשבים ועוד. מנע רוחף של התרסיס לגידולים שכנים. עלות מירבית תתקבל כאשר העשביה אינה עולה על 5 ס"מ.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ול ביקורת: 2007/גה"צ 1909
• סיווג HRAC: C
• דרגת רעלות V - מסוכן
• מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן
• אריזות: 1 ק"ג

PENDIGAN

תרכיז מתחלב

קוטל עשבים חד שנתיים

Pendimethalin 330 g/L

פנדיגן קוטל עשבים חד-שנתיים ברנייני לגידולים שונים במוגדים המפורטים בטבלת השימוש. הפעל את התכשיר ע"י ערבותו בתוך הקרקע בעומק 8-10 ס"מ או ע"י המטטרה למפורט בטבלה.

הוראות השימוש

בהתאם הוראות השימוש או המטטרה תימנע הצחת העשבים הבאים: מנិירבוז, רגילת הגינה, כף אוז, דוחנית השלחין, מנិירבוץ, אלבסייני הודיית, דורת ארם-צובא (מדרעים), עזקה העקרוב, מרוגנית, מנិנוריות ובר גבע.

לאחר הפעלת התכשיר בהמטרה יודברו גם העשבים הקיימים ממופרט להלן: חלמיית, מצליבים, סלק בה, כף אוז, וסרפץ עד שלב של זוג עליים אכתיים, רחבי עליים אחרים בשלב של פסיגים ודגניים עד שלב של עליה ראשונה. לא יודברו עשבים ממושחת הסוככים וקיצת. הפעלת פנדיגן ע"י תיחוח בקרקע או ע"י המטטרה תיעשה תוך 7 ימים לאחר הריסוס.

טבלת השימוש

הערות	נפח התרסיסים (ל'./ד')	המינון (סמ"ק/ד')	צורת הפעלה	מועד הרישוס	הגידול
מכל: L/g Pendimethalin 330 g/L	40-20 כמות זו מיועדת לריסוס רצוף. בריסוס בפסוי זרעה בלבד יש להקטין את הכמות יחסית לאחוז השתת המטופל	550 550 900-550	המטרה 50-30 מ"מ המטרה 50-30 מ"מ המטרה 30-50 מ"מ	לאחר הזרעה ולפני המטרה ההנבטה אחר הצחאה. כאשר לצמח הבצל עליה אמיתית ראשונה (לאחר עליה דגל) באורך 5 ס"מ. קדם הצחאה או אחר הצחאה	cotenna בצל (מלבד בצל יירוק) 1. דרווע בצל אם מבצללים גדר

גידולים עוקבים: מותר לרסס פנדיגן רק החלקות שיידלו בו בעונה הבאה רק אחד מהגידולים הבאים:cotenna, חמניות,
שעועית, בצל, שום, תפוח אדמה, קינוס, תות שדה, שמייה, כוסברה, פטרוסיליה עלים, גזה.



מספר הרישוי של השירותים להגנת הצומח: 09/גה"צ/1890
• סיווג HRAC: K
• דרגת רעלות 7A - מסוכן
• מיוצר ומושוק ע"י אדמה אגן
• ארייזות: 1,5 ל'

PROMETREX

תרכיז ריחוף
קוטל עשבים למניעת הצצת עשבים חד-שנתיים ולהדברת עשבים קיימים בגידולים שונים

מכל: 7/g Prometryn 500

פרומטרקס הינו קוטל עשבים מerbicide הכוון הצצת מינים רבים של עשבים חד-שנתיים וקוטל עשבים קיימים בגובה 5-10 ס"מ כגון: ענבי שועל, בוער, קיזצ'ת, ירבוזים (למעט ירבוזים עמידים), סלקים, אבוטילון, דטורה, מצלבים, מיני קטניות ועוד. ישנים גם עשבים שפיטחו עמידות לטריידינים. להדברת העשבים אלו (במנעת הצצה או בקטילת מגע) שלב פרומטרקס עם תכשיר מתאים המורשה לגידול. פרומטרקס מיועד לטיפול קדם הצצה בלבד בפטרוסילינון ושמיר ולטיפול קדם הצצה או לאחר הצצה במשתלות קרפס ולאחר הצצה בגדר וקרפס שתול.

הוראות השימוש:
השקייה לאחר הטיפול - לשם הפעלת התכשיר נדרש גשם או המטרה בכמות של 20-40 מ"מ. כשהטיפול ניתן במקמה להדביר שעשבים קיימים דחה את ההמטרה עד חלוף 48 שעות מהטיפול. הימנע מרוחף לגידולים שכנים.

הערות	נפח התרסיס (ל"ד/ד')	הכינון לפי קרכען (סמ"ק/ד')	מועד הטיפול	הגידול
ניתן לבצע שני טיפולים בעונה.	30-10	קלה ו低调-150 בינונית-175 כבדה-200	מיד לאחר הזרעה לפני המטרת הנבנה ו/או בהגיע הגידול לגיל של 3 עלים אמיתיים, כל עוד העשבים קטנים מ-5 ס"מ.	גדר
אין להשתמש בפרומטרקס במשתלות בקרקעוות לש או חול.		בכל הקרקעוות למעט לש וחול- 150	סוכוך לאחר הזרעה לפני הצצה הכרפס או לאחר היוצרות 4 עלים אמיתיים.	קרפס במשות
		לש, חול ובינונית-150 כבדה- 200	החל מ-4 ימים לאחר השטילה ועד סגירת נוף הכרפס, כל עוד העשבים קטנים מ-5 ס"מ.	קרפס שתול
בפטרודזיליה ניתן לרסס גם במשור הגידול או לאחר קציר בהתאם לניסיון המוקומי.		לש, חול ובינונית - 150 כבדה - 200	סוכוך לאחר הזרעה לפני המטרת הנבנה	פטרודזיליה, שמייר



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולBIKORTOT: 89/הגה"ץ/1038
• סיווג HRAC: C
• דרגת רעלות V - מסוכן
• מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן
• אריזות: 1,5 ל'

קרובר KROVAR

**גיגרים רחיפים
קוטל עשבים משולב להדבירה ומנעת הצעה של עשבים חד-שנתיים בהדרים**

טבלת הייעום:

הערות	מועד היעום	נפח התרסיס ברייסוס קרקע (ל'./ד')	המינון (ג'./ד')	סוג הקרקע	פירוט העשבים	הגידול
טיפול מותר בעצים שנטעו כמורכבים וחלו לפחות 24 חודשים מעת נטיעתם והתפתחותם תקינה ואופיינית לגילם. תמכים: לאור זמן. הבromoסיל בקרובר נקלט ע"י מערכת השורשים של העשביה ונע באופן סיסטי בצמח. הפעלתו מתחילה לאחר הצנתו ע"י גשם או השקיה. סימני הפגיעה בעשביה אינם מיידים. השימוש עם דיאורן מօסיף מנוגן פולה אחר ומרחיב את טווח המונעה. התכשיר שארתי בקרקע. מידת השארתיות מותנית ב מכון, בסוג הקרקע, ב佗ת ההשקיה ובכמויות המים. התכשיר עלול להוות שרירות לדמן מכושך ויש לCHKת זאת בחשבון בעת היעום ולקראת יעוד הקרקע – לאחר עקירת הפרודם המטופל.	"קבוע בהתאם למצב העשביה בעת היעום. ניתן לרטס עד 10 חודשים לפני הנטיעה.	400-80 בהתאם לגובה העשבים בעת היעום.	400 בינוית העשבים	קלה- כבדה	גדר המפרקם, דגנים (ברומית, דוון, זון, זיפן, шибולת שועל), ירבוע מושפל, ירבוז עדין, חלמית, מרור הגינוט, כובית, נדמית, קיזצת מסולסלת	הדרים (בכל הזרנים למעט פומלו ואשכליות אדומות – סטר רובו או סן-רייז)

הדברה בינוית: חסת המכפן, סבון, דו-שן

השקיית הפעלה: הפעלת התכשיר באמצעות מכטירים או מותדים יכול להידוחת עד 15 ימים לאחר הריסוס. מנת המים תיננתן
בכמות המלאה המקובלת באותה עונה. יש להפעיל את התכשיר ע"י המכטרת כל השטח המרוסס או עם גשם.
יש למנוע הגעת התרסיס לעתולות ולנחלים המספקים מים לשקיית שדות.



מספר הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2021/גהא"ץ/4527
סיווג HRAC: C1+C3
דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן
אריזות: 5 ק"ג

הערות לטיפול: מנע רוחף של התרסיס לגידולים שכנים. אין לרטס בתחום בית השורשים של משבבי רוח שאינם עצי הדרים
וש להתרחק 10 מטר מכבשי הרוח. אין לרטס בגבול בית השורשים של גידולים חקלאיים. אין לטפל בתכשיר בשטחים
מדרונים מהם יש חשש לשחרר עילאי אל שדות תרבות הנמצאים בהמשך למדרון או בנטייה הסחיפה.
אין לרטס את התכשיר באטרים מהם יש חשש לשחפת קרקע לשדות תרבות.
אין לטפל בתכשיר במאגרי מים המשמשים לשקיית גידולים חקלאיים, אין לטפל בתכשיר בתעלות ניקוז שמיינן מודרכים
למאגרים ולבריכות דגים.

ראונדאף ROUNDUP®

**騰龍
ROUNDUP®**

וניפוי כגון משטח AX ברכיך 0.5% מנפח התרסיס.
נפח התרסיס: עלות הדבירה מרבית מושגת על ידי ראונדאף בנפח נמוך, להדברת עשבים רב-שנתיים מפותחים ובשתחים לא חקלאים מרססים בנפחם רגילים-ראה טבלאות.

הדברת עשבים לקראת גידולי שדה, ירקות ובטוחי כרב

נפח התרסיס	מועד הטיפול	העשבים המודברים (ס"מ"ק לדונם או ריכוך)	הגידול	הדברת עשבים לקראת גידולי שדה, ירקות ובטוחי כרב
בריסוס קרקע 10 ליטר/ד'. בריסוס אוויר 5 ליטר/ד'.	לפני הזרעה או לאחר ריבוי/ לקראת שתילה. אין לרוסס לאחר השקיית הנבנטה. למעט בקרקע/ חוליות המכילות חוליות המכילות פחות מ-10% חרסית.	100 בתוספת 0.5% AX	א. נבטים וצמחים חד- שנתיים עד גובה 10 ס"מ לרובות נבטיו דורות ארום-צובא שהציגו מצדעים.	ראונדאף הנהן יכול עשבים סיסטיים לא בררי להדברת עשבים קיימים. התכשיר נקלט ע"י העלווה הירוקה ומוביל לפיטוף גם לחקלים התת-קרקעיים וגורם לתסומות הצמחים. כדי לקבל הדבירה מורבית רוסס על צמחים יוקים רעננים. בעשבים רב- שנתיים המתפתחים מאיברי ריבוי תת-קרקעיים, המtan בטיפול עד שהחיצות יפרץ מהם ולהימנע מעיבוד קרקע או CISOTH עלולו לפני הטיפול. פעילות ראונדאף איטית, תוצאות ניתן לצפות תוך 2-6 שבועות בהתאם לסוג העשביה ומועד הטיפול. לאחר ריסוס עשבים רב-שנתיים צריך להימנע מעיבוד הקרקע לפחות 7 ימים לאחר הריסוס.
	ב. חד-שנתיים - 40 10 ס"מ. יבלית ודורת ארום-צובא מקני שורש יצבו וידוכאו זמנית.	150 בתוספת 0.5% AX		הערות לטיפול: אין לרוסס ברוחה. מנע הגעת תרסיס או רוחף לעלווה ולפירות של גידולי תרבותות ולזעע עצים בלתי מעוצים וכלל צמחיה רצויה, בריכות דגים ומקורות מים. אין לרוסס בראונדאף בזמן הפעלת ההשקייה בטפטוף. גשמי עדים לאחר ריסוס בראונדאף עלולים להיחדר את החומר למערכת השורשים ולגרום לנזקים בגידול. מנע האבסטה בעלי חיים וכניסתם לשטח מרוסס תוך 14 ימים מהריסוס. ראונדאף תוקף מתקנות למעט פלדת אל-חלד, השתמש רק במרססים בעלי מכלים העשויים מחומרים סינטטיים או מפלדת אל-חלד. אין להשתמש בכלל עשוי מברזל.

העשבים המודברים: ראונדאף מדבר את מרבית העשבים הקיימים למעט נזמית, סרפק, חלנית מפותחת, ינבות והגא.
הוראות השימוש: כללי. לקלת הדבירה מיטבית של העשבים, הימנע מהשקייה בהמטרה במשך ימים לאחר הריסוס.
गשם היורד תוך שעה לאחר הריסוס מפחית מייעלות הטיפול. אבק המכסה את העשבים מפחית מייעלות הריסוס. בעונת
החוור (בטפרטורה נמוכה), פעילות ראונדאף על עשבים רב-שנתיים אינה מספקת. אין לרוסס בתנאי עקה לצמח (חמסין,
יבש או קרה).

משטח: הוספת משטח לתרסיס דרושה רק בכינוי ראונדאף נמכרים: 100 או 150 ס"מ"ק לדונם. מומלץ להשתמש במשטח



מ"מ' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 91/הגה"צ/1132/
ס"וג: HRAC G · דרגת רעלות V · מסוכן:
אריזות: 1,5 ל', · מיזור ע"י Bayer
משווק ע"י אדמה אגן
10 · 20, 7, 200, 7'

ראונדאף ROUNDUP® (המשר)

טיפול ראונדאף להקמת הגידול

נפח הטרסיס	מועד הטיפול	המינון (סמ"ק לדונם)	הגידול
7-5 ל'/'ד' - ריסוס אויר	עד 7 ימים לפני הקציר	300-100	חיטה, שעורה, בקיה, ש"ש, תירס, פנסילריה - לשחת או לתחרמי.
20-10 ל'/'ד' - ריסוס קרקע			

ערה: אין לטפל בגידול המועד לזרעים.

טיפול מן האויר: אין לריסוס כאשר הטמפרטורה מעל 30°C . אין לריסוס כאשר מהירות הרוח עולה על $7.5 \text{ Km}^{\text{-1}}$. צריך להימנע מריסוס אויר של ראונדאף בתחום 100 מטר מכל גידול חקלאי, מטעים וגנים. אין לריסוס בטיפות שקיוטר קטן מ-400 ס"מ. אל تكون פוכיות קידמה אל כיוון זרם האויר ואל תגדיל את נפח הטרסיס על ידי הגדלת הלחץ בפומיות. הבטח יישום אחיד השתמש באמצעי סיכון נאותים בעת ריסוס התכשיר מהאויר. מיד עם גמר הריסוס שטוף את המרסס על כל חלקי. רחץ ביסודות את מcontents הריסוס בכיוון הנחיתה בתום יום הריסוס, על מנת לשטוף שאריות ראונדאף שהנו קורזיבית למתקנת שאינה מצופה.

הדברת עשבים בהדרים, במטעים ובגפן

הימנע מגע של תרסיס בגדיים לא מעוצים, בענפים וسورים של עצי פרי וגפן. אין סכנה מפגעת הטרסיס בגזעי העצים המועוצים. כאשר העשבייה הרב-שנתית גבוהה מאוד, יש לכסח אותה ולתת לה לצמוח לגובה 15-10 ס"מ ואדי לבצע הריסוס.

הגידול	העסקים המודברים	המינון (סמ"ק לדונם או ריכוז)	מועד הטיפול	נפח הטרסיס
לקראת דריית גידולי קיז' צובא, חבלב, גומא הפקעים-בעל אגוזי אדמה, תירס יירקות.	עשבים רב-שנתיים: יבלית, דורשת ארם-צובא כותנה, מקשאה, אגוזי אדמה, תירס יירקות.	500 (במקדים 5.0%)	בריסוס קרקע.	במצע מוקן לפני הדזרעה ולאחריה (לא לשטילה) אין לריסס לאחר השקיית ההגבטה. לפחות בקרקע עותחוליות הממלכות פחות מ-10% חרסית.
	דורת ארם-צובא בלבד.	300 (במקדים 3.0%)	בריסוס קרקע.	לקראת כותנה בדו-גידול בזרעה למשירן (לאחר חיטה, שעורה, שחחת).
טיפול קיז' לקראת דגני חורף בלבד.	שלף מתחדש ועשבים חד-שנתיים קיז'ים, לרבות דורשת ארם-צובא שחצץ מדיערים.	150 - 200 בהתאם לגובה העשבים, 0.5% בתוספת % משטח AX	בריסוס קרקע.	על שלף ועשבים מלבלבים לאחר השקיה יסוד וודיעת הכותנה, לא אחר מינים לפני הצחתה.
	עשבייה רב-שנתית בעל עלווה מפותחת הכלולית יבלית, גומא הפקעים, דורשת ארם-צובא, ינבות, סולנות דיתני, חבלב, הגא. (מנון ראונדאף הגבוה להדברת יבלית וגומא הפקעים)	300 - 500 בשילוב 100 - 150 טומהוק	בריסוס קרקע.	על כרב או לאחר פינוי פני הרקיע משאריות הגידול הקודם, כל עוד העשבים ביצימות פעיל.
יבליית בעלה עלווה מפותחת וכן עשביה אחרת הקיימת בזמן הריסוס.	יבליית בעלה עלווה מפותחת וכן עשביה אחרת הקיימת בזמן הריסוס.	500 (במקדים 5.0%)	בריסוס קרקע.	יבליית בעלה עלווה מפותחת וכן עשביה אחרת הקיימת בזמן הריסוס.



מ"מ הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 91/הגה"צ 1132/
HRAC G · דרגת רעלות V-A - מסוכן
 סיווג: · ארידזות: 1,5 ל' · מיזער ע"י Bayer
 · אריזות: 1,5 ל' · משאקו ע"י אדמה אגן
 · מושך ע"י ADAMA

ראונדאף® (המשר)

הדברת עשבים בשטחי בור

הערות	נפח התריסי (ל'/'ד')	הሪcod	המיןון (ליטר לדונם)	הعشבים המודברים	המקום
בהתהדרש הצימוח חזרנים על הריסוס כשהעשבים מגיעים לגובה כ 40-50 ס"מ סcour לפירחה.	50-30	2%	1.0	פספלון מורחב, פספלון דו-טור, עשב רודס, דורת ארם-צoba, בילית, קוקייה, חילף החולות, משין גילי, זקן כפול שיבולת, גומא הפקעים, חבלבל, סיון דביך ושביה חד-שנתית.	לאורך פסי רכבת וצד דרכים ביןעירוניות, סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז, שטחים סביב' יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבotta, בתוך יישוב
לשיפור ההדברה יש לשלב טומוהוק בריכוד 0.5%				כנ"ל +ינבות, הגא, סולנום זיתני, פטל, ארכוביית	
	60-50	3%	1.5	כל העשביה במשבצת העליונה +קנה מצוי, סוף מצוי, גומא ודוחן דוחל.	תעלות ניקוז ודפנות של מאגרי מים

שילובים: להדברת מגוון רחב של עשבים קיימים, ניתן לשלב עם גליגן, טומוהוק, אלבר סופה, ניתן לשלב עם מנוני הצצה (כגון דיאורקס, גליגן). להפעלת דיאורקס דרוש גשם או המטרה תוך 2-3 שבועות לאחר הריסוס, גליגן תוך 7-14 ימים בהתאם לעונה. בכל השימושים נהג לפני התווויות של התכשירים לגבי הגידולים המורשים-אמצאי הזרירות וניקוי המרפס.



מ"מ הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 91/הגה"צ/1132/
• ס"וג HRAC: G • דרגת רעלות V - מסוכן
• אריזות: 1 ל. 5 ל. • מיוצר ע"י Bayer
• משוק ע"י ADAMA אדמתה אגן

הערות	המיןון (סמ"ק לדונם)	הሪcod		העשבים המודברים	הגידול
		בנפח תריסי ל'/'ד'	בנפח תריסי 10 ל'/'ד'		
למנעת הצזה של ח'ש ניתן לשלב דיאורקס או גליגן בגידולים המורשים. (ראה סעיף שלובים)	150 ס"מ	0.5%	+ 1.0% 0.5% משטח	חד-שנתיים עד גובה 10 ס"מ עד גובה 40 ס"מ.	מטעים מגיל שנה ואילך: הדרים, אבקוז, מנגו, פיג'ואה, קיוו, שוק, פקאן, תפוח, אגס, חbos, אפרסק, נקטינה, שדי, שקדים, משמש, גודגן, גפן, זית, אפרסמן, תمرة, אונונה, גיאבה
	300-200	1%	2%-1.5% לפי גובה העשביה.	פספלון מורחב	
	300-250	1%	1.5%	קוקייה, דורת ארם-צoba.	
	300-250	1%	3.0%	יבלית, משין גילי, דוחן דוחל, עשב רודס	
לשיפור ההדברה יש לשלב עם טומוהוק בריכוד 0.5% עם דיביך, ארכוביית, הגא, סולנום זיתני, פטל, ינבות גומא הפקעים, סיון דביך, מושוק ע"י ADAMA אגן	500	2%	5.0%	חבלבל, גומא הפקעים, סיון דביך, ארכוביית, הגא, סולנום זיתני, פטל, ינבות גומא מצוי, סוף מצוי, גומא חילף החולות, גומא ע"י ADAMA אגן	
		2%	4%		
		3%			

לפני השימוש יש לקרוא את הנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

רייסר RACER

תרכיז מתחלב

להדברת עשבים בגזר, חמצה, חמנית, פטrozיליה, כוסברה, שמייר, בטטה וכותנה
מכיל: L/g 250 Flurochloridone

החוור הפעיל של הריסר נקלט ע"י שורשים, ניצרונים וגבולים ומונע יצירת קרטואנידים שכגנים על הכלורופיל. עשבים רגישים נקטלים לפני הצצתם או הם נובטים מובלבים ונקטלים במכהירות.

הערות לטיפול:

אין לרסר ריסר בצווד לגידולים רחבי-עלים - מפני שרחרף או אדי הריסר עלולים לפגוע בהם. הגידולים הרגישים הם: סלק, כרובים ועלואה צעירה של קרפדים ועצי פרי נשירים. בהתאם לרטיבות הקרקע, ריסר ימנع הצצת עשבים רגישים במשך מספר חודשים. ריסר אינו קוטל עשבים לאחר הצצתם. הריסס בריסר ניתן על שטח נקי מעשבים. "תיכון הלבנה בעליים הראשונים של הגידול שלא פוגע בהתקפות הגידול או ביבול.

העשבים המודברים:

לאחר הפעלתו ריסר פועל כמנע הצצה על העשבים הבאים: ברקן, גדלן, חסט מצפן, לכיד, מרור הגינה, סבון, ציפורני- החתוכ, קורטם, טוריים, חרදל, שלח, עוקץ-העקרוב, ירבוז מופשל, ירבוז שרוע, סולנות שחוח, חלמית, כף-אווז, רגילה הגינה, זגב העקרוב, בקיה. הדבורה בינוונית: בר-גביע, קדד, קוֹטָב, לשישית הצבעים.

הפעלת התכשיר: סוכר ליישום הפעל את הריסר בהמטרה של 10-30 מ"מ. קלטוור לאחר ישום התכשיר יקטין את ייעילות הטיפול.

הוראות השימוש:

נפח התרסיס (ל'/ד')	המינון (סמ"ק/ד')	מועד הטיפול	הגידול
30-20	250	מיד לאחר הרקע כבדה ובינויו בלבד הזרעה ולפני השקיית ההנבטה	גזר בקרקע כבדה ובינויו בלבד חמצה מהזנים: ירדן, ספרדי, גיא בקרקע כבדה בלבד חמנית מהזנים: עומר, ד.ג, גיתית בקרקע כבדה בלבד פטrozיליה מהזנים: מוסקלד, דריין בקרקע כבדה בלבד cosaברה מהזנים: איטלקי, SB בקרקע כבדה בלבד. שמייר מהזנים: דליקאט, פוקה בקרקע כבדה בלבד.
			בטטה בקרקע כבדה ובינויו בלבד cotuna בזנים פימה, אקלפי בקרקעות כבדות בלבד
20		מיד לאחר הרזרעה ולפני הצצת הגידול	cotuna בזנים פימה, אקלפי בקרקעות כבדות בלבד ולפני הצצת הגידול
			קדם שתילה

גידולים עוקבים: ניתן לזרוע ללא הגבלה את כל הגידולים בתווית ותפוחי אדמה. ניתן לזרוע דגניים ותריסר 6 חודשים לאחר הריסס ובתנאי שהקרקע נחרשה. ניתן לזרוע או לשתחול גידולים אחרים 12 חודשים מהריסס ובתנאי שהקרקע נחרשה.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 93 / הגד'צ/ 1265
סיווג HRAC: F · דרגת רעלות 7- · מסוכן
אריזות: 1 ל, 5 ל · מיצור ומשווק ע"י אדמה אגן

SHOTGUN

תרכיז נוזלי

קוטל עשבים כללי להדברת ומניעת הצפה של עשבים בשטחים לא חקלאיים

מכל: 240 g/L Imazapyr בצורה של Ammonium Isopropyl

הערות	נפח התרסיס (ל'./ד')	המינון (סמ"ק'/ד' או ריכוך)	המטרה
להדברת עשבים חד-שנתיים מתחמכים רצוי לשלב דיאורקס במינון 500-250 סמ"ק לדונם.	*70-30	250	להדברת עשבים חד-שנתיים בלבד
	*70-30	500	להדברת קנה ועשבים רב שנתיים אחרים
	*70-30	600	להדברת קנה ועשבים רב שנתיים אחרים ודורת ארם-צoba
לא יותר מ-600 סמ"ק'/ד'.	עד 100	1%	קנה גבוה

* בהתאם לגובה וצפיפות העשבים.

שילובים: כאשר צפויים בשטח עשבים חד-שנתיים מתחמכים שלב דיאורקס.

SHOTGUN קוטל עשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים ע"י קטיילת מגע ומונעת הצפה. להדברת עשבים קיימים פועל החומר דרך העלווה הירוקה וגם דרך מערכת השורשים של העשבים. פועלות החומר איטית, חזותית ניתן לראות שינוי בעשבים תוך זמן פרקי זמן שונים בהתאם למינון. עדיף לרוסס על עשביה ק"מאות. רוב מיני העצים רגישים לשוטגן, لكن צריך להקפיד שלא לרוסס באזורי בית השורשים. עצים עמידים לשוטגן הם ברוש ותוכו סבבים ניתן לרוסס. התכשיר מזכיר את מרבית העשבים החד-שנתיים פרט למיני ק"מצת.

העשבים הרב-שנתיים המודברים הם: קנה מצוי, יבלית, דורת ארם-צoba (קוצאב), גומא הפקעים (סעידה), זקן שעיה, חילף החולות, משין גלילי, טיןון דביך, ארכובית שבטיבתי, ארכובית הכתמיים.

התכשיר מדבר גם ינבות, הגא ופטל בריסוס בחודשי הסתיו, כל עוד יש לעשבים עליים ירוקים.

הפעלת החומר: על-ידי גשם או המטראה. ניתן להשתמש בשוטגן על שטחים החיים (כגון אזורים המורטבים ליד הטפטפות) גם ללא הפעלה על-ידי גשם.

הוראות השימוש

בשטחים לא חקלאיים: צדי דרכים, סביבה מבנים, סביבה ברדיים ומוגפים, לאורך צינורות השקה. בתעלות ניקוז ודרכי מים כאשר אין בהם זרימה, בבריכות זרים ואגני חמצן שמייניהם אינם מיועדים להשתקה. אין לרוסס בתכשיר על גבי מים במאגרים או על פני מים זורמים.



מ"מ הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 2006/גה"ץ/1885
סיווג HRAC: B
דרגת רעלות 7A - מסוכן
מיוצר ע"י אדמה קולומביא
משווק ע"י אדמה אגן

CHARDOL

תרכיז נוזלי

קוטל עשבים הורמוני סיסטמי להדבאת עשבים רחבי עלים

מיכל: L/g 600 C-4,2 בצורת מלח DMA

שරדול הננו קוטל עשבים הורמוני ברני להדבאת עשבים רחבי-עלים במטעים, חיטה ובצד דרכי בינעירוניים, פועל על הצמח דרך העלה הירוקה, רכבת, בשטחים סביר ישוב וסביר מתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות. החומר סיסטמי, גורם לעיוותים והתקפלוויות ומגע למערכת השורשים. התכשיר מדבר עשבים חד-שנתיים כגון: שען, מצליבים, ברהן, גידלן, נירית הקמה, חוח עקיים, מירור הגינות, מיני ירבוז, רגלה הגינה, לצד הנחלים, מיני כף האווז, מיני קיזיצת ועוד. התכשיר מדבר עשבים רב-שנתיים כגון: חבלבל, ארוכבית שבטיבתי, טין דביך והגה.

הערות לטיפול

על מנת למנוע נזק לגידולים סמכים בעת הריסוי, אין לרסס בשטחים סמכים לגידולים רגשיים כגון כותנה, גפן, בננות. אין לרסס במרוסס מפותח. יש לרסס מוט הריסוי ספוך לפני הקרקע ככל האפשר, בלחץ נמוך. אין לרסס בתנאי רוח או כאשר הטמפרטורות גבוהות במיוחד.

בחיטה

הADBART עשבים מיטבית רצוי שרגידול יהיה בעומך מלא ולא יהיה במצב עקה כגון יונט, עופפי צים, קרה, פגעה מהקטל. עשבים, נזק נמוכות ופגעים אחרים. עקט יושם לפני או אחרי הריסוי עלולה לגרום לפגעה בגידול.

הgidol	המיןוא	נפח הריסוי	מועד הריסוי
חיטה	20 סמ"ק/ד'	רישום קרקע: 15-25 ליטר לדונם בהתאם לגובה העשבים.	בגיל סיום התמיינות השיבולית ולאחר הופעת 6 עלים והתארכות פרק ראשון עד שבועיים לפני השתבלות*

* גיל הפנולוגי המדיון לקביעת מועד הריסוי המוקדם ביותר הוא סיום התמיינות השיבולית. ניתן לזרוח מועד זה ע"י חתך אורך בסיס הצמח. יש להימנע מריסוס מוקדם מדי, ביחוד בזנים אפילים כגון אריאל.

ציד הריסוי	נפח הריסוי	הريقוד	הgidol
מוט ריסוס, רובים או מרסס גב. יש להגיע להרטבה מלאה מכיל: L/g 600 C-4,2 בצורת מלח DMA	30-40 ל"ד/ד בהתאם לגובה העשבים.	0.3% בשילוב עם ראונדאף/ גלייפוגן 1%	זית, הדרים, שקד, אבקדו (החל מהשנה השלישי לנטיעה)
	30 ל"ד	0.6%-0.3% בשילוב עם ראונדאף/ גלייפוגן *3%-1%	בצד דרכי בינעירוניים, לאור רPsi רכבת, בשטחים סביר ישוב וסביר מתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות

* בהתאם לעוצמת השיבוש והרכב אוכלוסיית העשבים.

בחיטה ניתן לשלב עם דרבוקה. אין לשלב עם דשן או ראן כחישש להתגבשות.

שילובים:



- מ"ס הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביברות: 2016/הגה"ץ/4281
- סיווג HRAC: O
- דרגת רעלות 1A - מסוכן Nufarm
- ארייזות: 5 ליטר
- משוקע ע"י אדמה אגן



אוברטוף UBERTOP

תרכיז תפזרי

תכשיר מושולב ייחודי המדביר חרקים מוצצים וזהלים של עשי הלילה.
החומר רעל לדבורים ב嚷ען ישר בלבד.

Acetamiprid 218 g/L + Emamectin Benzoate 37 g/L

כללי:

אוברטוף מכיל 2 חומרים פעילים Emamectin benzoate השיר לקבצת מנגן פועלת על וויסות העברת יוני כלור בממברנות התא (קבוצה 6 IRAC) ו- Acetamiprid מלבוצת הניאוניקוטינואידים (קבוצה 4A IRAC) הפעול על וויסות יוני נתרן במערכת העצבים של החרק. השימוש גורם לפעילות הדבירה מקסימלית ותורמת למניעת התפתחות עמידות חרקים.

הערות לטיפול:

שילובים: אין מידע על שימושים.

רעלות לדבורים ולדבורי בומבו:
אסור לריסוס ישירות על הדבורים והכוורות. מומלץ לסגור את הכוורות לքראת ערב ולרסוס כאשר הדבורים לא פעילים בשטח. לריסוס בשעות החמות של היום, רצוי לריסוס בשעות הבוקר או הלילה. אין לריסוס צמחים בעקה. אין לריסוס בתנאים קיצוניים (חמסון, קרה וכדומה).



מספר הרישוי של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4431/גגה"צ/2019
סיווגים IRAC: 6 + 4A • דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
אריזות: 0.5 ליטר • מיוצר ע"י אדמה קולומביא.
משוק ע"י אדמה אגן

אנדיBUG ANDYBUG

טבלת השימוש:

dag לכיסוי מלא של עלות הגידול בתמיסת התרסיס.

המינון (סמכ'ק/ד' או %)	המידוק	הגידול	נקה תרסיס (ל'/'ד')	ימי המתנה לפני קיטוף
1%	אקרית אדומה עגבניה, פלפל	30-100 לפי גודל הצמחים	3	מכל: 80% כללי:
1%	כנית עש הטבח חציל שטח פתוח בלבד	50-30 לפי גודל הצמחים	3	התכשיר פוגע בשלמות מבנה השילד החיצוני ע"י פירוק השכבה השעונית - דבר הגורם לאיבוד נזלים והתיישבות החרק. התכשיר אינו פוגע בדבוריים.
1%	תפוח אקרית אירופית	200-150 לפי גודל העצים	3	בבדיקות מוצאו כי התכשיר בטוח לחרקים מועילים ברכז 1% ברישום ישר: אקרית טורפת <i>Phytoseiulus persimilis</i> - אין פגעה אקרית טורפת <i>Amblyseius swirskii</i> - אין פגעה פשפש טורף <i>Orius laevigatus</i> - פגעה מועטה
1%	הדרים פומילת ההדר האסייתית	100-350	3	שילובים: אין מידע

תרכיז מתחלב
תכשיר אורגני מבוסס על אסטרים של סוכרוז ושומנים
להדרכת מזיקים בגידולים שונים.

Sucro-Glycerides



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 4529/הגה'צ/2021
מספר רשום לחקלאות אורגנית: 7555
• דרגת רעליות IV - מסוכן • מיוצר ע"י TENSAC
• אריזות: 1 ליטר, 5 ליטר • משווק ADAMA אגן

לפני השימוש יש לקרוא את ההוראות המופיעות בתווית התכשירים.

אקטארה

תרכיז ריחוף

קוטל חרקים סיסטמי להדברת חרקים בירקות, הדרים, נשירים, סובטרופים,
גפן, תבלינים, פרחים ודקלים

Thiamethoxam 240 g/L

הערות	ימי המתנה לפני הקטיף	נפח התרסיס (ל'/ד'**)*	המינון בריסוסו*	הכינון בהגעה*	המזיק	הגדול
	28	-	-	80 סמ"ק/דונם כינמית עליה הבננה	בננה	
	50	-	-	בשנה ראשונה: 1 סמ"ק/עץ בגיל 5-2 שנים: 2 סמ"ק/עץ מגיל 5: 3 סמ"ק/עץ כינמית עליה הדלועים	רימון	
כללי: מטפלים באביב, בעצים גושאי פר', לפני עליית הכנימות על הפירות. לא יותר מ-200 סמ"ק/דונם בעצים בוגרים.				3 סמ"ק/עץ הכינמה הקמחית של ההדר		
	21	200-100	0.02%	בשנה ראשונה: 1 סמ"ק/עץ בשנה שנייה: 1.5 סמ"ק/עץ בשנה שלישית ורביעית: 3 סמ"ק/עץ כינימות עליה (כינימת התפקיד הרויקה וכינימת הספרירה), ציקדה ירוקה	תפוח	
ממשק ל민יעת עמידות: לא ניתן לחזות מראש הופעת עמידות لكن יש להקדיד על הנהניות באאות: כיוון שלא נצפתה עמידות צולבת בין אקטארה לתכשיר אחר קיימים מקבוצות אחרות, מומלץ להשתמש לחילופין עם תכשירים בעלי מנגן פולה שונה מזה של הניאוניקוטינוואידים.				במשתלה: 1 סמ"ק/שתיל במטע: 2-1.5 סמ"ק לעץ עד גל שנתיים. לעץ מגיל: 3-4 סמ"ק 3 סמ"ק לעץ מגיל 3 עש שלפוחיות האגוז	ציקדה, כינימת הדם	
בהגעה: המינון קיבע לפי גובה העץ והתפתחותו						

אקטארה 240 ת"ר הינו קוטל חרקים סיסטמי מerbicide הניאוניקוטינוואידים. אקטארה פוגע בכל דרגות החרק מלבד בבייצים, פגיעתו של אקטארה מהירה מאוד. עד 30 דקות לאחר קליטתו ע"י כינימות עליה או עד שעה לאחר קליטתו ע"י ע"ט מפסיק החרק להיזון. גם אם החרק מת רק כעבור 24 שעות מתקבלת הפסקה מידית של הנזק, מאחר והחרק אינו חוזר להיזון. ברישום, חודר אקטארה לצמח דרך הקוטיקולה, ברקמת הצמח נע בעצה או במדוזיל ונספג לkörper החרק תוך מציצת המכשול הצמח. בתוך הצמח מוגן התכשיר מפני התפרקתו ע"י קרנית UV או שטיפה ע"י גשם או המטרה.

בהגעה, נמלט אקטארה דרך השורשים ומועבר לכל חלק הגוף בתוך צינורות העצה. בהזרקת גזע, התכשיר מוחדר לגזע העץ דרך 2-3 קדרים ואחר הוא נעדך דרך צינורות העצה לכל חלק הגוף שמעל הקדרת.

ממשק למיניעת עמידות: לא ניתן לחזות מראש הופעת עמידות لكن יש להקדיד על הנהניות באאות: כיוון שלא נצפתה עמידות צולבת בין אקטארה לתכשיר אחר קיימים מקבוצות אחרות, מומלץ להשתמש לחילופין עם תכשירים בעלי מנגן פולה שונה מאשרים האחרונות פיתחו מזיקים שונים כמו כינימת עש הטבק, ציקדות באזוריים שונים של הארץ עמידות לתכשירים מקבוצת הניאוניקוטינוואידים בכלל ולאקטארה בפרט. אין לישם אקטארה כנגד מזיקים אלה במקומות בהם התפתחה כבר עמידות. בישום בהזרקות גזע מומלץ מספר פעמים בשנה לישם תכשירים בעלי מנגן פולה שונה של הניאוניקוטינוואידים. אין לישם יותר מפעמיים רצוף אקטארה.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביברות: 2001/גהה"צ 1635/
• סיג'וג IRAC: 4A • דרגת רעלות IV - מסוכן
Syngenta Crop Protection Ag • מיזור ע"י Ag • אריזות: 1 ל', 5 ל' • משוק ע"י אדמה אגן

לפני השימוש יש לקרוא את הנהניות המופיעות בתווית התכשירים.



אדמה

מוס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביבורת: 2001/גהה"צ 1635/
 • סיווג IRAC: 4A • דרגת רעלות IV - מסוכן
 Syngenta Crop Protection Ag • מיזור ע"י 5 ל' • אריזות: 1 ל' 5 ל'
 • משוק ע"י אדמה אגן

הערות	ימי המתנה לפניו הקטיף	מספר התרסיס**	נפח בריסוס (ל'/{ד"}**)	המינון בהגמעה*	המדדיק	הגידול
	7	20 סמ"ק לדונם	20 סמ"ק לדונם	כニמת עלה הדלו"ים מלפפון, מלון אבטיח,		
כיפוף אחד בעונה	7	70 סמ"ק לדונם	-	כニמת עש הטבק - כニמת עש הטבק והcosaft עלים	קיישוא	
מקסימום 2 טיפולים בעונה	14	20 סמ"ק לדונם	-	כニמת עלה (כニמת עלה האפרסק, כニמת עלה הדלו"ים) עלת תפוח האדמה, כニמת עלה הדלו"ים)	תפוח אדמה	
	14	20 סמ"ק לדונם	20 סמ"ק לדונם	כニמת עלה הדלו"ים	ברוקולי, קולרבי, קרובי, קורוביט, חסה	
		60 סמ"ק לדונם	40 סמ"ק לדונם	כニמת עש הטבק		
		60 סמ"ק לדונם	-	חיפוית פרעושית		
		60 סמ"ק לדונם	-	תריפוס הטבק		
מקסימום 2 טיפולים בעונה	3	20 סמ"ק לדונם	20 סמ"ק לדונם	כニמת עלה הדלו"ים	חיציל	
		60 סמ"ק לדונם	40 סמ"ק לדונם	כニמת עש הטבק		

*שים לב להנחיות "ישום בגמעה" ** בהתאם לגודל העצים / גפנים

הערות	ימי המתנה לפניו הקטיף	מספר התרסיס**	נפח בריסוס (ל'/{ד"}**)	המינון בהגמעה*	המדדיק	הגידול
יש לרטס מיד עם הופעת ציקדות בעלים	7	200-100	0.02%	בשנה ראשונה: 0.5 סמ"ק/ע"ץ בשנה שנייה: 1 סמ"ק/ע"ץ	ציקדה יrokeה	גלוועים: שדי', משכם, אפרוסין, נקטרינה
	30	200-100	0.02%		ציקדה יrokeה	שקד
	7		-	ציקדה יrokeה	אפרוסכו	
	60		-	כניota המגנו	מנגו	
	14	100-60	0.02%	ציקדה יrokeה	גפן	
		0.2 סמ"ק/גפן	-	כניota קימוחית של הגפן		
		1.5-1 סמ"ק/גפן	-			

*שים לב להנחיות "ישום בגמעה" ** בהתאם לגודל העצים / גפנים

הערות	ימי המתנה לפניו הקטיף	מספר התרסיס**	נפח בריסוס (ל'/{ד"}**)	המינון בהגמעה*	המדדיק	הגידול
פסילת האגס ישום בגמעה	30	-	-	9 סמ"ק/ע"ץ	פסילת האגס	אגס
	-	-	-	4 סמ"ק/ע"ץ	אננסטיגמה	
המיון בהתאם למzdול הע	120	2-1 סמ"ק/ע"ץ	-	המיון בהתאם למzdול הע	עש מנורות ההדר	דרמים עצים שאינם נושא-פרי
	120	הרטבה מלאה	0.02%	-	כניota על הספרואה, כניota על הדלו"ים, כניota ההדר השחוכה	
	120	-	-	8-10 סמ"ק/ע"ץ	כניota קימוחית של ההדר	דרמים עצים נושא-פרי

לפני השימוש יש לקרוא את hnachiot המופיעות בתווית התקציריהם.

אקטארה (המשר)

ימי המתנה לפני הקטיף	נפח התרסיס (ל'/'ד'')**	המינון ברכיבים	המזיק	הגידול
- - -	30-10 פתוח 100-50 בחממה	0.02%	כינמת עלה הורד כינמת עלה הדלועיים כינמת עש הטבק	40 סמ"ק לדונם 20 סמ"ק לדונם 60 סמ"ק לدونם 40 סמ"ק לدونם
			פרחיהם: (ורד, פיטוסופורום, עצובונית רוכוקו)	
			אסטר, ליאטרום, ליזיאנטוס, טרכליום, בגוניה, סולידיון, היפריקום, ג'יפסוניית, גבראה	
14			-	כינמת עש הטבק מרווה

*ישום בהגמעה

הצמאת השטח ע"י דילוג על השקיה האחרונה ביום שלפני היישום.

ניתן לטפל בהגמעה בשני אופנים :

1. מתן החומר כומס במים מותחת לטפטפת באמצעות מזרק אוטומטי או מזלף גינה.
2. ניתוק צינור הטפטוף מכערכת ההשקיה והזרקת הכמות המתאימה לצינור באמצעות מרסס מוטורי . מלא את המרסס במים ומוסך לו את הכמות המתאימה של אקטארה. הפעל את המרסס בלחץ של 4-2 אטמוספירות. לאחר ההזרקה יש לשטוף את הצינור במים באמצעות המרסס לפני חיבורו מחדש למערכת ההשקיה. את הגמעה מותחת לטפטפת יש לחתה במלול השלישי האחרון של ההשקיה, לפני סיום ההשקיה. רצוי לטפל בקרקע יבשה או בלקרקע לחה. אין לטפל בהגמעה בקרקע רווייה, הנמצאת בקיבול שדה! אין להש��ת בעודף לאחר הטיפול – החומר עלול להישטף לעומק ורב יותר מעומק בית השורשים. יש לישם את החומר באזורי הרשותים. לאחר ההזרקה יש להכשיר ולהשקיות מעת ולא להשאיר את החומר בפני השטח. אין לטפל בקרקע משובשת בעשביה. יש לזכור כי מוגע הטיפול בהגמעה ועוד לקבלת תוכאות הדבירה בשטח, קיימ פרק ذקון עד לקליטת החומר בצמחי ותנוועתו לעלוה, והוא משתנה בהתאם למזיק ולגידול: בירקות-2-3 ימים ובמטעים-5-14 ימים.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביבורת: 2001/גה"ץ 1635
 • סיג'וג IRAC: 4A • דרגת רעלות IV - מסוכן
 Syngenta Crop Protection Ag Ag • מיזור ע"י ל' 5 ל' • מושוק ע"י אדמה אגן

*שים לב להנחיות "ישום בהגמעה" ** בהתאם לגודל העצים / גפנים

הערות	ימי המתנה לפני הקטיף	נפח התרסיס (ל'/'ד'')**	המינון ברכיבים	המזהם בהגמעה*	המזיק	הגידול
מקסימום 2 טיפולים בעונה	3	10 סמ"ק לדונם	- - - - - -	כינמת עלה הדלועיים כינמת עש הטבק כינמת עש הטבק כינמת עש הטבק כינמת עש הטבק עגבניה	פלפל	
בזמן מותם המטופלות בדברוי הבומבוים, ניתן לטפל באקטארה בהגמעה בלבד לאחר השתייה עד 21 ימים לפני הופעת גל הפריחה הראשון והכנסת דברוי הבומבוים לחממה. לאחר גל הפריחה הרبيعي ניתן לטפל באקטארה בנוכחות דברוי הבומבוים בחממה.	3	60 סמ"ק לדונם	- - - - - -	כינמת עש הטבק כינמת עש הטבק כינמת עש הטבק כינמת עש הטבק כינמת עש הטבק תות שדה	גדר שועית	
טיפול אחד בעונה	14	- - - - - -	60 סמ"ק לדונם	כינמת עש הטבק כינמת עלה הדלועיים, כ. עלת האפרסק, כינמת תות השדה (המשר)	ציקדות	
טיפול בהגמעה הדבירה איטית (טור-5-7 ימים), אך לפחות 15 ארוך (כ-45 ימים)	4	20 סמ"ק לדונם	- - - - - -	כינמת עלה עלת הדלועיים, כ. עלת האפרסק, כינמת תות השדה		

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

אקטרה (המשר)

רצוי שהטיפול יהיה מניעתי (לפני הופעת חידוקונית) אם מתחילה לטפל אחרי הימצאות חידוקונית יש לשלב בטיפול הראשון גם "הגmutת-קווודקוו" בתכשיטים המורשים. יש לישם כל חדשים במהלך כל השנה.

הדיקלון (הדיבל וסוס):

האבירז כולם "צינורית" עם חרומים המכאפשרים לתמיסה לפעוף לטרע העז, הדיקלון כולל פרקי איטום עם נעלם בטיחותית, ביחסו הראשון נדרש להתקין את הדיקלונים (קידוח בעץ, ואיתום הדיקלון עם משחה) ובשימוש הבאים יש לפתח את הפוך ולישם.

אופן היישום:
יש לבצע את הקידוח בגובה 0.5-1.0 מטר מפני הקרקע (אין לחדוח ממטר העליון שהרוכב לקווודקוו) בדזוזית של 45 מעלות כלפי מטה, והכנסת דיקלונים (SosPalm) לחור הקידוח, נפח הדיקלון 12.5 סמ"ק.
מספר קידוחים: שני קידוחים בטור מצוי. שלושה קידוחים בדקל קני או בתמגר עם גז עבה במיוחד. יש להכין תמייסה ברכוץ של 30% ולהזרקה עם צינורית לעומק הדיקלון, בישומים חוזרים ישום בצורה הנילג' גורם להחלה התמייסה בדיקלון ובבטיח שהתמייסה החדשה תמלא את הדיקלון, פעם בשנה מוכלו לשתוף את הדיקלון עם 100 סמ"ק של מים, כדי לשמר על אפקטיביות היישום.

שילובים:
בגפן: ניתן לשלב אקטרה עם דורטן, אופיה, סוויז', אביה, פליננט, פוליקוה, סימבוש
באפרוסק נקטרינה: ניתן לשלב עם אופיה, שבט, סיסטיאן, הליוגנופורית ופלינט.
בפלפל: ניתן לשלב עם טרייס, אופיה, פרוקל'ים, ורטימקן וכוסאו.
במלפפון: ניתן לשלב עם אופיה, שבט, ורטימקן המשולב עם BB5 מסאי, אקרובט, רידומיל גולד ZM ג'ר, דומרק ושמן וירול.
בתפוח: ניתן לשלב עם אופיה, שבט, פליקטן ופלינט.

המינון בהגעה*	המינון בריסוס	ימי המתנה לפני הקטיף	הזרקת גזע	המינון בזרקת גזע	הערות
דקל קני	חידוקונית הדקל האדומה	ראה סעיף "הכנת תמייסה להזרקת גזע"	30% סמ"ק של תמייסה 30%	12.5 סמ"ק	-

הgidol	המזיק	המינון	ימי המתנה לפני הקטיף	הערות	הזרקת גזע	בריסוס	בגעה	
עצמייש	צמרנית המיש (shivaspis celti)		קוטר גזע העץ ימדד בגובה 1.5 מטר (גובה חזה). יש להגמיע את התכשיט לאחר ערבות ב-60 120 ליטר כ"מ לעץ, באופן יחסו. כמות המים בהתאם לגודל העץ, ישום בהשקייה איטית ללא נגנה.					



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביבורת: 2001/גה"צ 1635
סיווג IRAC: 4A • **דרגת רעלות IV - מסוכן**
Syngenta Crop Protection Ag • **אריזות: 1 ל' , 5 ל'** • **מושוק ע"י אדמה אגן**

הגדיל	התות שדה	המינון (סמי'ק/ד' או %)	נפח תרסיס (ל'י/ד')	ימי המתנה לפני קטיף
ברוקולי, כרובית, כרוב, כרוכית,	עשית המצלבים (עש הכרוב), עש לב הכרוב, פרודניה	20	50-20	5
חסה	פרודניה	20		10
טטרודיליה, שמייר, כוסברה		20		10
גזר				21
אגדוזי אדמה	פרודניה, תנשמית האביב (הליוטיס)	20		7
תפוחי אדמה	פרודניה, תנשמית האביב (הליוטיס), פלוזיה	20		7
בטטה				14
תירס, תירס מתוק	תנשמית האביב (הליוטיס)	20		5
חימציה	תנשמית האביב (הליוטיס)	20		21
תות שדה	פרודניה	20		5
מלפפון**	תריפס הטעבן	50	כיסוי מלא של העלווה	5
כוונה	תנשמית האביב (הליוטיס)	20		15
ג'יפסונית, גרבירה, אסקליפיום, ווד*	פרודניה, לפיגמה	20		-

* בורד נבדק בזנים: Lovely Red, Enigma, Kashmir, Kashmire. בגרבירה נבדק בזנים: פיקולו, דיוינה. בג'יפסונית נבדק הדן: מיילון סטאה.

** בעת הופעת המזיך ינתנו 2 ריסומים בהפרש של 7-10 ימים. לאחר מכן ינתנו טיפולים עם תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחרת.

למיישת תנוגדות, אין לרסס יותר מפזחים בגולד בעונה. במלפפון נבדק שלוב עם ניכגראד 1%.

מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 2007/גהה"צ 1857/
סיווג IRAC: חדש • **מיוצר ע"י Sumitomo**
דרגת רעלות V - מסוכן • **משווק ע"י אדמה אגן**
אריזות: 0.5 ליטר

TRACTOR MACHINERY AND TRAILERS
 קוטל חרקים בעל מנגנון פעולה חדש, פועל על זחלים של עשי לילה וטריפס
 פועל כרעל קיבה ומגע, אינו סיסטמי ואני קוטל ביצים.
 Pyridaly 500 g/L

הוראות השימוש:

כדי למנוע התפתחות תנוגדות לתכשיר יש לרסס חליפות בתכשיר זה ובתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחרת. גשם היורד שעה לאחר הריסוס לא יפגע ביעילות הטיפול. אין לרסס צמחים בעקה. אין לרסס יותר מאשר ריסומים בעונה. גשם היורד שעה לאחר הריסוס לא יפגע ביעילות הטיפול. אין לרסס צמחים בעקה.

הגדיל	המזיך	המינון (סמי'ק/ד' או %)	נפח תרסיס (ל'י/ד')	ימי המתנה לפני קטיף
עגבניה	פרודניה, לפיגמה, תנשמית האביב (הליוטיס)	20	50-20	3
	פלוזיה	30	30-20	30-20
	טוטה אבסולוטה**	30	60-30	12
	תריפס פרחים קליפורני	***100	(כיסוי מלא של הعلווה)	70-30
פלפל	פרודניה, לפיגמה	20	50-20	3
	פפריקה			13

DURIVO

תרכיז ריח'

קוטל חרקים להדרכת חרקים בגידול שדה, ירקות, מטעים, כותנה, גפן והדרים
מכיל: L/g 200 + Thiamethoxam 200 g/L

כלל:

הערות	מועד אחרון ליריסוס לפנ' אסיף (ימי)	נפח הריסוס (ל'/ד')	המינון (סמי'ק/ד') או הריכוז (%)	המזיק	הגידול
	7	50-25 לפי גודל הצמחים	30	לפיגמה פרודניה	מלפפון
	7	20	30	פרודניה, לפיגמה הליוטיס (תנשכית האביב)	תפוח אדמה
כלל:	14	20	30	מלדרה מטרידה	בטטה
טפלמודי חודש משתלה, סח'כ קוטני A4 - ניאוינקוטינויואדים) 4 טיפולים, מתחום 2 טיפולים בזרוב. יש להכטיר לאחר הריסוס בכמות של 25-30 מ"ק/ל מים לחומם רצוי כידית ועד 24 שעות מריסוס. אין לטפל יותר מ-2 טיפולים בעונה בזרוב.					
ממשק מניעת עכידות: למניעת התפתחות עכידות מצד המזיקים יש לריסס דורייבו לחילוףן עם תכשירים בעלי מנגן פועלה שונה ולהשתמש בשיטות הדבירה אלטרנטיביות. בכל מקרה אין לריסס יותר מ-2 ריסוסים בעונה בזרוב או בחוכרים המכילים חוכר פעיל מקבוצה 28 בעלי אותו מנגן פעולה.	7	150-100 לפי גודל העצים	0.03%	עש המשמש (אנרטסיה), ציקדה יירוקה	אפרסק, נקטרינה, משמש, שקדים, שדי
טבלת הוראות שימוש: עמידות חרקים לחומר הפעיל שבדרבי עלולה להופיע. לפיכך אין לריסס יותר מ-2 ריסוסים רצופים ולא יותר מ-2 ריסוסים בעונת גידול, ולהחליףם עם חומרם בעלי מנגן פעולה שונה. קיימ השיש לעמידות אצל ציקדות יירוקות לתכשירים מכובצת הניאוינקוטינויואדים, ובתוכם, Thiamethoxam שבתיכшир דורייבו. לפיכך, בכל מקרה של הדבירה בלתי מספקת של ציקדות, יש להזור ולрисס בתכשירים בעלי מנגן פעולה שונה.	7	150-100 לפי גודל העצים	0.03%	בוגרי קפנודיס	אפרסק, נקטרינה, משמש, שדי
מטפלים בהתאם למועד הופעת המזיק ולמשך הדוח	45	25-10	20	מלדרה מטרידה	אגוזי אדמה




מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2012/גה"ץ/4102
 • סיווג IRAC: A4 + 28
 • דרגת רעליות IV - מסוכן
 Syngenta Crop Protection Ag Ltd
 • אריזות: 1 ליטר
 • משוק ע"י אדמה אגן

המינון (סמי'ק/ד') או הריכוז (%)	נפח הריסוס (ל'/ד')	המזיק	הגידול
30	20-50 לפי גודל הצמחים	עש הכרוב, שע לב הכרוב, פרודניה	כרוב, קרובי, ברוקולי
30	20	פרודניה	גזר
30	20-50 לפי גודל הצמחים	הליוטיס (תנשכית האביב), פלוסיה, טטה אבסולוטה	עגבניה, בחממה ובשטוח פתוח
30	30	פרודניה, לפיגמה	פלפל

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

דוריבו DURIVO המשך



מס' הרישון של גניוקטם להגנת הצומח ולביקורת: 4102/גה"צ/2012
28+
 • סיווג: IRAC 7A
 • מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag
 • אריזות: 1 ליטר
 • משוק ע"י ADAMA אגד

הגידול	המציק	המינון (ס"מ"ק/ד') (%)	נפח הריסוס (ל'/ד')	מועד אחרון לפני אסיף (ימים)
תפוח	עש התפוח, ציקדה יירוקה	0.03%	200-100 לפי גודל העצים	21
גפן	עש האשכול, ציקדות	0.03%	150-100 לפי גודל העצים	14
הדרים (לא מניבים)	עש המנהרות	0.03%	הריטהה מלאה	-
គוננה	הלווטיס (תנשכית האביב)	30	25-10	-
רימון	כחיל הרכימון, כנימת עליה הדלועים, כנימת הריכמון	0.03%	200-100 לפי גודל העצים	21

לפני השימוש יש לחרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

DEFENDER

תרכיז ריחוף

Cyflumetofen 215 g/L

כללי:

DEFENDER בעל מנגנון פעולה חדש ומישר הדבירה ארוך. התכשיר מדביר אקריות מכל הדרגות ומתאים לשימוש בהדבירה משולבת.

רעילות לדבוריים: התכשיר לא רעיל לדבורי הדבש ולדבורי בומבו.

איבאים טבעיים: לדפנדר רעלילות נמוכה לאקריות טורפות ולהחרקים מועילים:

(Phytoseiulus persimilis, Typhlodromus pyri, Orius strigicollis, Aphidius colemani, Encarsia formosa, Amblyseius cucumeris, Neoseiulus cucumeris) וכן מותאים לריסוס בתוכנית הדבירה משולבת.

כדי למנוע התפתחות תנוגדות לתכשיר יש לסתס חליות בתכשיר זה ובתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. אין לרסס יותר מפעם אחת בעונה. התכשיר לא סיסטמי - DAG לסייעו מושלם של העלווה בתרטיס. השתמש בנפח תרטיס מותאים לההתפתחות הגידול ותנאי הריסוס. 850 בתחילת הנגיעות באקריות. אין לרסס צמחים בעקה. אין לרסס בתנאים קיצוניים (חמים, קרה וכדומה).

הgidol	המזיק	המינון # (סמ"ק/ד' או ריכוז)	נפח תרטיס (ליטר לדונם)	יקטיף	ימי המנתנה לפני
עגבניות*	אקרית חלודה	0.1%	כעל 100	3	
פלפל*	אקרית עיוויתים	100	100-30	3	
הדרים	אקרית מזרחתית, אקרית ארגמנית כיסוי מלא של העלווה	0.05%		7	
חסה בחכמה**	אקרית אדומה מציה	100	40-30	5	
cosaera, פטרוזיליה **	אקרית אדומה מציה	100	50-100	10	

* ניתן לשלב שמן EOS בריכוז 1.0%.

** ריסוס 1 בעונה

שילובים:

במלפפון ניתן לשלב עם: נץ + שביט, מנקה, אקרובט, ספידיה, ולבון.

צ'וד הריסוס:
להדבירה יעללה כומלץ לרסס עם ריסוס מפוח או בכל ריסוס מומלץ אחר המאפשר כיסוי מלא של העלווה וחדרה מרבית לתוך הנוף.

הgidol	המזיק	המינון (סמ"ק/ד' או ריכוז)	נפח תרטיס (ליטר לדונם)	יקטיף	ימי המנתנה לפני
מלון*	אקרית אדומה מציה	100	100-30	7	
אבטיח*, דלעת, דלוריית עגבניות*, חיציל*, פלפל*, מלפפון*			100-30	3	
תות שדה*					
תפוח	אקרית אירופית, אקרית צהובה	0.1%	150-200 לפי גודל עצים	12	



מס' הרישויון של השירותים להגה"ץ ולביבורת: 2011/הגה"ץ/1939
 • סיווג IRAC: חדש
 • מיצר ע"י OAT Agro Co, Ltd
 • דרגת רעלילות AI - מסוכן לבリアות
 • משוק ע"י ADAMA AG
 • אריזות: 0.5 ל', 1.0 ל'

וָרְטִימֶק

תרכיז מתחלב

קוטל אקריות וחרקים

Abamectin 1.8% w/g

כללי:

החומר הפעיל אבමקטין הוא מוצר תסיסה של מיקורוארגניצמים של הקרקע. התכשיר חודר לתוך רקמת הצמח (טרנסילכינרי) ופועלו על החרק הינה בעיקר דרך מערכת העיכול. אבמקטין פועל על מערכת העצבים של החרק. אבמקטין מכירץ את שחרותו של החומר GABA וקשרתו לתאי העצב. פועלה זו עצרת את הדחף העצבי וביבאה לשיתוק מהיר של החרק או האקרי. חרקים ואקריות מאבדים את כושר התנועה שלהם זמן קצר אחרי חשיפה לורטימק. התכוותה חלה 4-7 ימים לאחר הריסוס. מומלץ לרוטס ורטימק בשעות הבוקר או הערב והלילה.

הערות	מועד טיפול לפני הקיטוף (ימים)	אחרון לפני הקיטוף (ימים)	המינון (ס"ק/ד' או %)	המזיק	הגידול
בורדים - לא פחות מ-100 ל/ד'. יש להוסיף משטח BB5 ברכיב כ-0.2%-0.1% לפ' טיב המים, עד לקבלת צבע ורוד כללי:	-	-	50 ס"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל/ד' (50 ס"ק לכל 100 ל')	אקרית אדומה	רוד, ציפורן, ליזיאנטוס
			75 ס"ק/ד' או 0.075% בנפח מעל 100 ל/ד' (75 ס"ק לכל 100 ל')	תריפס קליפורני	
7 בחממה - אין לרסס בימים חמים, שביהם צפוי טמפרטורה של מעל 29°C בשילוב BB5 ברכיב 0.15%	7	-	50 ס"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל/ד' (50 ס"ק לכל 100 ל')	אקרית אדומה	מלון, מלפפון, כרפס, אבטיח
			60 ס"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 60 ל/ד' (100 ס"ק לכל 100 ל')	מנגרן העורקים מנגרן החמצכות	
			50 ס"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל/ד' (50 ס"ק לכל 100 ל')	פלפל	
7 צמחי תבלין	7	-	50 ס"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 50 ל/ד' (100 ס"ק לכל 100 ל')	מנגרן העורקים מנגרן החמצכות	חרצית, גפסונית, גרברה, אסטה, סולדיסטה, פלוקס, ורוניקה
			30-50 ס"ק/ד'	אקרית העיימות	
50 ס"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל/ד' (50 ס"ק לכל 100 ל')	7	-	50 ס"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 50 ל/ד' (100 ס"ק לכל 100 ל')	אקרית אדומה	אקרית אדומה תריפס קליפורני מנגרן החמצכות
			50 ס"ק/ד' או 0.05% בנפח מעל 100 ל/ד' (50 ס"ק לכל 100 ל')	מנגרן העורקים מנגרן החמצכות	



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 1998/גגה"צ/1507
 • סיג'וג IRAC: 6 • דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
 • אוריינות: 1,5,7 • מיצר ע"י Ag Syngenta Crop Protection Ag
 • משוק ע"י אדמה אגן

הערות	מועד טיפול לפני הקיטוף (ימים)	אחרון לפני הקיטוף (ימים)	המינון (ס"ק/ד' או %)	המזיק	הגידול
יש להוסיף משטח BB5 ברכיב לפ' טיב המים, עד לקבלת צבע ורוד, נפח תרסיס חדש לכיסוי נור' הצמחים אר לא פחות מ- 50 ל/ד.	-	-	50 ס"ק/ד' או 0.05% 0.2%-0.1% בנפח מעל 100 ל/ד' (50 ס"ק לכל 100 ל')	אקרית אדומה	חרצית, גפסונית, גרברה, אסטה, סולדיסטה, פלוקס, ורוניקה
			100 ס"ק/ד' או 0.075% בנפח מעל 100 ל/ד' (75 ס"ק לכל 100 ל')	תריפס קליפורני	
			100 ס"ק/ד' או 0.1% בנפח מעל 100 ל/ד' (100 ס"ק לכל 100 ל')	מנגרן העורקים	

וָרְטִימֶק (המשר) VERTIMEC

הערות	מועד טיפול אחרון לפני הקטיף (ימים)	מינון (סמ"ק/ד') או הריכוז (%)	המזיק	הגידול
הריסות-בתיחילת העונה כאשר רוב הלווה עדין צערה.	7	0.1% (100 סמ"ק לכל 100 ל')	אקרית אדומה אקרית אירופית	תפוח
בתוספת שמן קיצי (לבנולה) ברכיבוד 1.75%	7	0.05% (50 סמ"ק לכל 100 ל')	אקרית האבקדו אבקדו	
בתוספת שמן אולטרפיין ברכיבוד 1%-0.5%	7	0.1% (100 סמ"ק לכל 100 ל')	אקרית הkers של התכור	תמר
בתוספת שמן אולטרפיין ברכיבוד 0.25%	7	0.075% (75 סמ"ק לכל 100 ל')	אקרית אדומה, אקריטץ צהובה, פסילת האגס	אגס

שילובים:

במלפפון - ניתן לשלב ורטימק עם אופיר, רידומיל גולד, ZM נימגארד ואקרובט. בתות שדה - עם אופיר וסטרובי. בעגבניה - עם אופיר, סקור ונימגארד. בפלפל - עם סקור ונימגארד. בהדרים - שמן לבנולה עד 2% בהדרים שאינם נושא פרי - אוריה דלת ביורט. בחיזיל, באבטיח ובמלון - עם פלינט ונימגארד.

מניעת עמידות: אין לתות יותר מ-2 ריסוטים ורטימק בשונה בהדרים, בכותנה ואגסום. 3 ריסוטים בעגבניה, פלפל, חיזיל, מלפפון, כימלאן, אבטיח, תות- שדה, סלרוי, בפרחים וצמחיו נוי, **ובשות אופן לא יותר מ-2 ריסוטים רצופים.**



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 1998/גהג"צ 1507
 • סיווג IRAC: 6 • דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
 Syngenta Crop Protection Ag • מיצר ע"י Ag • משוק ע"י אדמה אגן

הערות	מועד טיפול לפני הקטיף (ימים)	מינון (סמ"ק/ד') או הריכוז (%)	המזיק	הגידול
	7	0.05% (50 סמ"ק לכל 100 ל')	אקרית אדומה, אקרית צהובה	אפנסין, נקטרינה
יש לשלב שמן לבנולה ברכיבוד 0.5% או BB5 0.2%-0.1% (עד לקבלת צבע ורוד של מי התרסיס) אין לתות יותר מרסוטס אחד בעונה כנגד אקרית החלודה של ההדר -	7	130 סמ"ק/ד' בנצח 300 ל/ד'. 500-350 ד'/ל (30 סמ"ק לכל 100 ל')	אקרית החלודה של ההדר	הדרים
יש לשלב שמן לבנולה או אולטראי- פיין ברכיבוד 0.5%		0.03% (30 סמ"ק לכל 100 ל')	עש המנרות של ההדר	
יש לשלב אולטראי- פיין ברכיבוד 0.5%. אין להוציא אולטראי-פיין לאחר שלב הפריחה.	7	0.1% (100 סמ"ק לכל 100 ל')	אקרית מצחיה	הדרים (משתלות)
יש לשלב אולטראי- פיין ברכיבוד 0.5%.	7	0.075% (75 סמ"ק לכל 100 ל')	אקרית הפוך, עש האשכול	גפן
אקרית החלודה	3	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנצח מעל 100 ל/ד' (50 סמ"ק לכל 100 ל')	מנהרה החמצאות	עגבניה, חציל
60 סמ"ק/ד' או 0.1% בנצח מעל 60 ל/ד' (60 סמ"ק לכל 100 ל')		60 סמ"ק/ד' או 0.1% בנצח מעלה 60 ל/ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')	מנהרה העורקים	תפוח-אדמה
60 סמ"ק/ד' או 0.1% בנצח מעלה 60 ל/ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')	7	50 סמ"ק/ד' או 0.1% בנצח מעלה 50 ל/ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')	מנהרה העורקים	תות-שדה
50 סמ"ק/ד' או 0.1% בנצח מעלה 50 ל/ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')	3	50 סמ"ק/ד' או 0.1% בנצח מעלה 50 ל/ד' (100 סמ"ק לכל 100 ל')	אקרית אדומה, תריפוס קליפורני	
50 סמ"ק/ד'	7	50 סמ"ק/ד'	אגרוז אדומה, כותנה	

חוטי אל-עש + AL-ASH

מועד הטיפול:
למנועת הזרוגות החל מהדור הראשון יש לטלות את הנדייפות לפני לכידת עש התפוח הראשון באחת ממילכות הניטור.

הערות לטיפול
אין להשתמש בחוטי אל-עש בחלוקת אשר בהן הייתה נגיעה רבה בעש התפוח (מעל - 10%) בעונה הקודמת. במטע המכזי במדרון שיפויו עד 30%, הצב שורה של חוטי אל-עש מחוץ לקצהו הגבוה של המטע, כ- 5 מטרים לפני העצם הראשוני. לא מומלץ להשתמש בחוטי אל-עש במטע הנטווע במדרון מעל- 30% ובעצים גבוהים מכך: כל נדייפית מכילה 120 מ"ג HO:12-E8, E10:OH. אין לטפל בחוטי אל-עש בחלוקת קצרות או קצרות או 50 דונם. אין לטפל בחוטי אל-עש בחלוקת שבשכנות (במקרה קטן כ- 300 מטר) מצויים פונדקאים של עש התפוח שלא מבצעים בהם הדבירה סדרה של העש, כאשר אלה עלולים להיות מקור לאלוח בנקבות מופרות.

שיטת התליה
תלה בגידול מחוץ לקרינה ישירה של השמש. קשרו את החוטים היבש אל ענף בגובה ידם המורמת של הקשרים רצוי בגובה כ- 2 מטרים. הצב את החוטים באופן אחד ע"פ כל המטע, להוציא עצי השולים, בהם מציבים חוטים בكمות כפולה.

ניתור
במטע המכיזע לטיפול בחוטי אל-עש יש להציב מלוכות פרומון לניטור לפני תליית החוטים. במשך כל תקופת פעילות הנדייפות צריכה הלכידה במלוכות הניטור להיות אפס. תחילת הלכידה במלוכות הניטור מסמנת גמר פעילות החוטים. לצורך בקרה על יעילות פעולה הנדייפות בדיכוי הנגיעות יש לבדוק פירות לגבי נגיעות בעש, כמו כן יש צורך בניטור לגבי נגיעות אפשרית בפוגעים אחרים.

נדיפיות לבבלול ذרכי עש התפוח

Codlemone-E8, E10:OH HO:12-E8, E10:OH

נדיפיות פרומון הגורם לבבלול הזכרים ומונע הזרוגות, ע"י קר מתה-בלת הפחתה באוכלוסיות עש התפוח. משך פעילות הנדייפות 120-100 ימים.

הוראות שימוש :

המינונים :

הקידול	המידק	המינון
תשוף, ארגו	עש התפוח	70 חוטים לדונם



מס' רישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון : 93 / הגה"ץ / 1239.
מספר הגה"ץ קלדות ארגנטית : 7053
סיווג: פרומון
דרגת רעלות: I-A - מסוכן
תכולה: 400 נדייפות
מיוצר ע"י ETSU- SHIN-AL-ASH
משווק ע"י ADAMA AGRI

חותי עשבחנים המשמש (אנרסיה)

הערות לטיפול:
בשנה הראשונה יש לשלב במשטר הדבירה ריסויים עם קווטלי חרקים המורשים. השימוש בקווטלי חרקים לא פוגם בפצעיות הבלבול, אין לטפל בנדייפות בחלקות לצרות או צרות. מינימום גודל חלקה לטיפול 50 דונם גוש אחד. ככל שהאזור המובלבל גדול יותר כך האפשרות לנזק בפרי מהירתן של נקבות מופרות יהיה קטן יותר. חלקות לא מטופלות עלולות להוות מוקן לנקבות **נדיפות פרומון לבלבול זכרים של (אנרסיה) עשבחן המשמש**.

מכיל:
7.11 גר'/נדיפית acetate 1-y-Decen-1-E-5
0.007 גר'/נדיפית 1-o-Decen-5-E

כללי:
נדיפות מנדים פרומון הגורם לבלבול הזכרים ומונע הדזוזגות, ע"י כך מתקבלת הפחטה באוכליות של עשבחן המשמש (אנרסיה).

נטור:
בגידול המועד לטיפול בחוטאים יש להציב מלכודות פרומון לניטור לניטור לפני תליית הנדייפות. במהלך העונה תיתכן לכידת פרטם במלכודות הניטור. במקרה קפיצה במספר הנקבות במלכודות הניטור, היא מסכנת את גמר פעילות הנדייפות. יש לבצע פיקוח רציף לניטור נגיעות. במקרה של נגיעה יש להתייעץ עם ארגונים החברה.



מ"ס הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2021/גה"צ/4618
• ס"זג - פרומון • דרגת רעלות IV - מסוכן
• מכיר ע"י ETSU SHIN • מכיר ע"י אדמה אגן
• תכלה: 200 נדיפיות

נדיפות מנדים פרומון הגורם לבלבול הזכרים ומונע הדזוזגות, ע"י כך מתקבלת הפחטה באוכליות של עשבחן המשמש (אנרסיה).

הוראות השימוש

הנידול	המינון (חותמים/ד')	מועד התלייה
שלק	50	לפני גיחת בוגרי הדור הראשון. תלייה ב 1/3 העליון של העץ

שיטות התלייה:
תלה בגידול מחוץ לקרינה ישירה של השטח. הצב את נדייפות באופן אחד על פני כל המכטע, בשולים יש להציב חותמים בכמות כפולה. יש לקשר בצוואר הרופפת ולהקפיד לא לשבור את החותם. יש לישם בשליש העליון של נוף העצים.

מועד הטיפול:
תליית הנדייפות תעשה על פי ניסיון מוקמי /או בעצת הארגונים האזרחי של החברה. יש לתלות לפני גיחת הבוגרים. בתנאי אקלים לא קיצוני צפוי להתקבל פיזור אחד של הפרומון במשך כ- 3 חודשים.

הערות לטיפול:

אין להשתמש בחוטי אשכול בחלקות, אשר בהן הייתה נגיעה רבה בעש האשכול (מעל 10%) בעונה הקודמת. כולם המציגו במדרון ששיאו עד 30%, הצביעו על חוטי אשכול מוחז לזכרו של הכרם, כ-5 מטרים לפני הגפנים הראשוניים. לא מומלץ להשתמש בחוטי אשכול בכרם הנטווע במדרון מעל 30%. אין לטפל בחוטי אשכול בחלקות הראשונות או בשטח מטופל קטן מ-50 דונם. אין לטפל בחוטי אשכול בחלקות שבשכונות (במרחך קטן מ-300 מטר) מצוין מכל: כל נדיפת מכילה לפחות 172 מ"ג E,Z-7,9-dodecadienylacetate.

כללי: פומדנוקס נדיפת מכילה לפחות 172 מ"ג E,Z-7,9-dodecadienylacetate. מומלץ לשלוחם כטיפות מתקצר בתנאים של רוח תמידית וטמפרטורות גבוהות. במקומות כאלה ובכל תנאי שטח בעיתים אחרים, נא לפנות לציג החברה ליעוץ.

שיטות התליה:

תלה בגידול מוחז לкриינה ישירה של השימוש. קשור את החוטים על ענף בגובה ידם של הקשרים. הצביע את החוטים באופן אחד על פני כל הכרם, להוציא גפני השוליות, בהם מציבים נדיפות בكمות כפולה.

הערה:

יש לקשור בצורה רופפת ולהקפיד לא לשבור את הנדיפות.

ניתור:

בגפן המיועד לטיפול בחוטי אשכול יש להציב מלכודות פרומון לניטור לפני תליית הנדיפות. במשך כל תקופה פעילות החוטים צריכה הליכידה במלכודות הניטור להיות אפס.

לצורך בקרה על יעילות פעולות הנדיפות בהפקחת הנגיעות יש לבדוק אשכולות לגביהם נגיעות בעש, כמו כן יש צורן בניטור לגביהם אפשרות בפגעים אחרים. מיד עם גלוי הנגיעות בעש האשכול, רסס בתכšíיר מורה להדרתו.

* בהתאם לרמת האוכלוsie

חוטי אשכול ESHKOL ROPES

נדיפות פרומון לבלבול זרכי שע אשכול

E,Z-7,9-dodecadienylacetate

נדיפות פרומון לבלבול הזקרים ומונע הדיזוגות, ע"י קר מתקובלת הפחתה באוכלוsie שע אשכול. משך פעילות הנדיפות 100-120 ימים.

כללי:

המינונים:

הגידול	המדיין	המינון (חוטים/ד')
גפן	עש אשכול	75-50*

מועד הטיפול:

למניעת הדיזוגות החל מההדר הראשון יש לתלה את הנדיפות לפני לכידת שע אשכול הרראשון באמצעות מלכודות הניטור.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביברות: 2001/גה"צ/1645

מס' גה"צ

7158

דגלת רעלות 7- מסוקן

סיווג: פרומון

מיוצר ע"י SHIN-ETSU

טול: 500 נדיפות

משקל ע"י אדמה אגן

חוטי אשכול פלו'

נדיפות לבבלול ذרכי עש האשכול

E,Z-7,9-dodecadienylacetate 290 מ"ג לפחות מכיל כל נדיפתת לפחות

הערות לטיפול:
אין להשתמש בחוטי אשכול בחלקות, אשר בהן הייתה נגיעה ובה בעש האשכול (מעל 10%) בעונה הקודמת. בכרם המצויה במדרון שטיפועו עד 30%, הצב שורה של חוטי אשכול מחוץ לקצהו הגבוה של ה الكرם, כ-5 מטרים לפני הגפנים הראשוניים.

לא כומלץ להשתמש בחוטי אשכול בכרם הנטו' במדרון מעל 30%.

אין לטפל בחוטי אשכול בחלקות קצורות או צרות או בשטח מטופל קטן מ-50 דונם.

אין לטפל בחוטי אשכול בחלקות שבשכונתן (במקרה קטן מ-300 מטר) מצוים פונדקאים של עש האשכול שלא מבצעים מכיל: כל נדיפתת מכילה לפחות 290 מ"ג E,Z-7,9-dodecadienylacetate

במהדורה סדירה של העש, כאשר אלה עלולים להיות מוקור לאילוח בנקבות מופרות.

מכיוון שהפרומון כבד יותר מהאוויר יש לו נטייה לשקוע כלפיון הקרקע. באזוריים תלולים ליד כבישים מהירים יתכן קושי של

שמירת ריכוז הפרומון באופן בוואיה. משך הפעילות של הנדייפית מתתקצר בתנאים של רוח תמידית וטמפרטורות גבוהות.

כללי: במקומות כאלה ובכל תנאים טוח בעיתים אחרים, נא לפנות לנציג החברה ליעוז.

ניתור:
בגן המיועד לטיפול בחוטי אשכול יש להציב מלכודות פרומון לניטור לפני תליית הנדייפיות. במשך כל תקופה פעילות החוטים צריכה הלכידה במלכודות הניטור להיות אפס.

לצורך בקרה על יעילות החוטים בהפקחת הנגיעות יש לבדוק אשכולות לגבי נגיעות בעש, כמו כן יש צורך בניטור לגבי נגיעות אפשרית בפוגעים אחרים. מיד עם גלוי הנגיעות בעש האשכול, רסס בתכšíיר מורה להדברתו. תחילת הלכידה במלכודות הניטור מסמנת גמר פעילות החוטים.

ESHKOL ROPES PLUS

חוטי אשכול פלו'

נדיפות לבבלול ذרכי עש האשכול

E,Z-7,9-dodecadienylacetate 290 מ"ג לפחות מכיל כל נדיפתת לפחות

נדיפות פרומון הגורם לבבלול הזכרים ומונע הדיזוגות, ע"י כך מתקבלת הפחתה באוכלו'ית עש האשכול. משך פעילות הנדייפיות 100 ימים.

הוראות שימוש

הgidol	המזיק	המיון (חותמים/ד')
גפן	עש האשכול	35-25 בהתאם לרמת האוכלו'יה

מועד הטיפול:

למניעת הדיזוגות החל מהדור הראשון יש לטלות את הנדייפיות לפני לכידת עש האשכול הריאשן באחת מלכודות הניטור.

שיטות התלייה:

תלה בגידול מחוץ לקרינה ישירה של השימוש. קשרו את הנדייפיות על ענף בגובה ידם של הקשורים. הצב את הנדייפיות באופן אחד על פני כל ה الكرם, להוציא גפני השולים, בהם הצב חוטים בכמות כפולה.

הערה:

יש לחשור בצורה רופפת ולהקפיד לא לשבור את הנדייפית.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכšíירים.

מ"ס הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 2012/גה"ץ/4090

- סיווג: פרומון
- דרגת רעלות IV - מסוכן
- תכולה: 250 נדיפות
- מיוצר ע"י SHIN-ETSU
- שיווק ע"י ADAMA אגן



חוטי עש טוטה אבסולוטה

TUTA ROPES

הוראות שימוש:

הערות לטיפול:

בגידול המכיוון לטיפול בנדייפות יש להציב מלכודות פרומון לניטור עם תליית נדייפות. יש להציב את המלכודת בסמוך לצמחים ובוגבה של עד 1 מטר מפני הקרקע. בצע פיקוח רצף לניטור נגיונות. במקרה של נגיונות יש להתייעץ עם אגרונום החברה / או המדריך האזרו.

נדיפיות פרומון לבבלול זקרים לא פוגם בפעולות הבלבול, لكن יש לרסס בהתאם לצורך.

בלבול זכרי תוכזה אבסולוטה מהווה טיפול תומך בהדרכה של המכזין, והואנו כוהזה פתרון או טיפול יחיד. יש לישם תכשירים להדרכה של טוטה אבסולוטה בהתאם להנחיות אנשי השדה והפקחים והגינות בחילקה.

נדיפיות פרומון לבבלול זקרים של עש טוטה אבסולוטה.

תכולה:

(E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrienyl acetate 70.7%
(E,Z)-3,8- tetradecadienyl acetate 7.7%

כללי:

נדיפיות פרומון הגורם לבבלול הזכרים ומונע הדיזוגות, ע"י כך מתקבלת הפחתה באוכלויסית של עש תוכזה אבסולוטה. משך פעילות הנדייפות כ- 120 ימים

הוראות שימוש:

מועד טיפול:

מהשתילה ועד חודשים לאחר מכן לאחריה. בהתאם להתפתחות הנגיונות – יש להתייעץ עם איש השדה.

שיטות התליה:

הצב את נדייפות באופן אחיד ע"פ כל החכמה, בגובה 1.6-1.8 מטר מפני הקרקע. יש להקפיד לתלות את נדייפות כך שוגרים ישמר במרקם הגידול. הדק את החוט למקומו למניעת תזוזתו. יש להקפיד על שלמות המבנה עם רשת נגד חרקים למניעת הכניסה של נקבות מופרות.

הערות	המינון* (חוטים/ד')	הגידול	tablet השימוש:
מהשתילה ועד חודשים לאחר מכן לאחריה.	80	עגבניות חממה	



מ"ר הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 4599/2021/גהה"צ
סיווג: פרומון
דרגת רעלות V - מסוכן
תכולה: 500 חוטים לאירועה.
מיוצר ע"י SHIN-ETSU
שיווק ע"י ADAMA אן

חוטי סס הנמר LEOPARD MOTH ROPES

דיפיות פרומון להפחחת אוכלאסית עש סס הנמר

כל נדיפית מכילה:

(E, Z)-2, 13-octadecadienyl acetate 57 mg/rope

(E, Z)-3, 13-octadecadienyl acetate 2.3 mg/rope

כללי:

החותמים מנדרפים פרומון הגורם לבבלול הזכרים ומונע הדזוזגות, ע"י קר מתקבלת הפחתה באוכלאסית עש סס הנמר במשך

כ-80 ימים.

טבלת השימוש:

הגדיל	המינון (חותמים/ד')	הعروת
תפוח, אגוז	60	בהתאם לרמת הנגיעות בכרם
דיית	65-45	

הוראות השימוש בהדרים

שיטת התליה:

תלה בגובה 1 מטר מתחת לצמרת מהוזן לкриינה ישירה של השימוש. האזב את החוטים באופן אחד ע"פ כל המטע, להוציא עצי שוליים, בהם האזב חוטים בكمות כפולה.

הערה:

יש לקשור בצורה רופפת ולהקפיד לא לשבור את החוט.

מועד טיפול:

תלה לפני גיחת הבוגרים מתרdemת החורף. באקלים לא קיצוני צפי להתקבל פיזור אחד של הפרומון למרחק כ-80 מ'.

הערות לטיפול:

בשנה הראשונה צריך לשלב במשטר הדבירה ריסוסים עם קווטלי חרקים מתאימים או טיפול ידני עם השימוש בחוטי פרומון, בהתאם לרמת הנגיעות. השימוש בקווטלי חרקים אחרים לא פוגם בפעולות הבלבול, אך מותר לרסס בהתאם לצורכי טווח הנידידה של הנקבה כ-6 מטר, שכן יש סכנה של אילוח רה מחלקות לא מטופלות במיוחד או מכיוון הרות.

מכיוון שהפרומון יותר כבד מהאווריר יש לו נטייה לשקווע לכון הקרע. באזרורים תלולים ליד כבישים מהירים ניתן לקוושי של שבירת ריכוז הפרומון באוויה במרקם כאלה תיכון צוריך לפחות פעמי נסס. פנה לנציג החברה לעזר.

משך הפעולות של החוט מתקצר בתנאים של רוח תמדית וטמפרטורות גבוהות. בתנאים כאלה יש צורך להגבר את המינון או לתכנן משטר הדבירה משולב עם קווטלי חרקים.

ניתור:

היום אין שיטה יעילה לניטור המכזיק באמצעות מלכודות פרומון. בצע פיקוח רציף לניטור נגיעות.

במקרה של נגיעות יש השתמש באמצעות הדבירה המכובלים.

מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביברות: 2005/הגה"ץ/1853

מס' הגה"ץ לחקלאות ארגנטינית: 7281

• סיווג: פרומון

• דרגת רעלות: IV - מסוכן

• מיזר ע"י חברות ETS-SHIN-ETSHIN

• משוקע ע"י אדמה אגן



חוטי עש התפוח המדומה

FALSE CODLING MOTH ROPES

נדיפיות פרומון להפחחת האוכלאסיה של עש התפוח המדומה.

מכל:

Z-8-dodecenyl acetate 71 mg/rope
E-8-dodecenyl acetate 167 mg/rope
E/Z-8 dodecenol acetate 2.5 mg/rope

כלי:

נדיפיות פרומון הגורם לבלבול הזכרים ומונע הזרזות, ע"י קר מתיקת הפחתה באוכלאסיה של התפוח המדומה. משלך נדיפיות הנדיפית 100-120 ימים.

שיטות התליה:

تلיה בגובה 1 מטר מתחת לצמרת מחוץ לקרינה ישירה של השימוש. הצב את הנדייפות באופן אחד בכל המכטע/פרנדס. הצב כמותנדיפיות כפולה בשולי המכטע/ הפרנדס. הקפד לקשור בצורה רופפת את החוט על-מנת שלא לפגוע בשלמות החוט.

הערה:

יש לקשור בצורה רופפת ולהקפיד לא לשבור את הנדייפות.

מועד הטיפול:

טליה על פ"י ניסיון מקומי ובעצת המדריך האזרורי /או אגרונום החברה. התליה תעשה לפני גיחות הבוגרים.

הערות לטיפול:

יש לשלב במשטר ההדבירה ריסויים עם קווטלי חרקים המורשים בגידול. השימוש בקווטלי חרקים לא פוגם בפעולות הבלבול. אין ליחס נדיפיות בחלקות לצרות או צרות. מיניכם גודל חלקה לטיפול הוא 50 דונם כמושך אחד. ככל שהאזור המבלבל יהיה גדול יותר כך האפשרות לנזק בפרי מהגירתו של הנקבות המופרות יהיה קטן יותר חלקות לא מטופלות עלולות להוות מוקור לנקבות מופרות וכטוצאה מכרי גרים נזק לפרי במיוחד לאורך הגבולות ובשכנות חלקיות המטופלות (מרחק של פחות מ- 300 מטר). הפרומון כבד יותר מהאוזיר ועל כן נטייתו לשקו מטה. באזוריים תלולים וכן ליד כבישים מהירים ניתן�� שמיירת ריכוז הפרומון באוויה משך הפעולות של הנדייפות מתתקצר בתנאים של רוח תמידית וטמפרטורות גבוהות. במקרים כאלה ובכל תנאים טוח בעיתים אחרים נא לפנות לנציג החברה ליעוץ.

ניתור: בבדיקה המכווד לטיפול בחוטים יש להציג מלכודות פרומון לניטור לפני תליית הנדייפות. לאורך כל תקופה פעילות הנדייפות, לא יתבצעו לכידות במלכודות הניטור תחילת הלכידה במלכודות הניטור מסמנת את גמר פעילות הנדייפות. יש לבצע פיקוח רציף לניטור נגיעות. במקרה של נגיעה יש להתייעץ עם אגרונום החברה /או המדריך האזרורי.

הgidol	המינון* (חוטים/ד')	הערות
מטעים: רימון, אבוקדו	*80-60	תליה שנייה לאחר 3 חודשים
	60	הדרים

* בהתאם לרמת האוכלאסיה



- מספר הרישויון של השירותים להגנת הצומח ולביבורת: 2012/הגה"צ/4141/4141
• סיווג: פרומון
• דרגת רעליות: IV - מסוכן
• תכולה: 400 נדפויות
• מיוצר ע"י: SHIN ETSU NISHI
• ומשווק ע"י: ADAMA אדן

חוטי פזר +

קשרו את הנדיות בצורה רופפת לגבעול צמחי הכותנה כאשר הם פזרים בצורה אחת על פני השדה המטופל. אפשר לפזר על שיפורדים ולפזר את השיפורדים בשטח.

ניתור

בשדה המכועד לטיפול בחוטי פזר+ יש להציב מלכודות פרומון לניטו במשר כל תקופת פעילות הנדיות צריכה הלכידה במלכודות הניטור להיות אפס. תחילת הלכידה במלכודות הניטור מסמנת גמר פעילות החוטים. לצורך בקרה על פעילות פועלות הנדיות בדיכוי הנגיעה יש לבדוק נוכחות ביצים ו/או זחלים של ההלקט הוורוד ע"ג ההלקטים ובתוכם.

מכיל:

64 mg acetate-1,6-Hexadecadien-(Z,Z)-
61 mg acetate-1,6-Hexadecadien-(E,E)-

כללי:

נדיפויי פרומון הגורם לבבלול הדקרים ומונע הזדווגות. קר מתקבלת הפחתה באוכלוסיית ההלקט הוורוד במשך כ-60-80 ימים.

הgidol	המיןון* (חוטים/ד')	הערות
כותנה	הלקט הוורוד 50 חוטים לדונם	

מועד הטיפול

תלה את החוטים כשבועיים לפני הופעת כפרטור בגודל ראש סיכה.

הערות לטיפול

חלקות סמכות לא מטופלות, החלקות חדשות מודמות שלא נחרשו כהלהה, שאריות כותנה או צמחים מעונה קודמת עלולות להוות מקור לנקבות מופרות וכותזאה מכך יגרם לאילוח בחזקון ולנדק.

אין לטפל בנדיות בחלקות קצורות או צרות. מיניכום גודל חלקה לטיפול - גוש של 100 דונם. משך הפעילות של הנדיות מתלו בהתנאים של רוח תמידית וטמפרטורת גובהה. במקרים כאלה ובכל תנאי שטח בעיתים אחרים, נא לפנות לנציג החברה ליעוץ.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביברות: 3/גה"ץ/1245
מס' הגה"ץ לחקלאות אורגנית: 7054 • דרגת רעלות IV - מסוכן
• מיוצר ע"י חברת ETSU SHIN • ארכ'ז: 500 נדיפיות
• סיווג: פרומון
• משוק ע"י אדמה אגן

TIGER

תרכיז מתחלב

קוטל חרקים מקבוצת מווסטי גידלת חרקים, הפעול כדמות הורמן נוערים על דרגות שונות של כנימות. עש, כנימות רכות וכנימות מגן.

Pyriproxyfen 100 mg/g

למניעת התפתחות תגודות לתקшир יש לרסס חליפות בתכשיר זה ובתכشيرים בעלי מגנון פוליהערה. דאג לכיסוי מלא של עלות הגידול.

המועד האחרון לטיפול (ימים)	נפח התרסיס לייטר/דונם	המיןון		המועד המיטבי להדבירה	המזיק	הגידול
		(סמ"ק/ד')	(%)			
עד לחנתה או לאחר הקטיף	200-150		0.15	טיפול אחד בשנה עם תחילת בקיעת הביצים באביב או לאחר גמר הקטיף***	פרלטoria	נשירים: אגו, אפרסוק, שוזף אירופי ושוזף יפני, תפוח
עד לחנתה או לאחר הקטיף	250-200	-	0.1 0.15	עם תחילת ההשרצה עם הופעת הזחלנים	כנית אדומה פרלטoria	זית
-	100-20 (בנפח תרסיס מעל 100 ל'/די' מרססים בריכוד (0.1%)	75		כנית עש הטבק עם תחילת נגיעות בביצים ובזחלים*	פרחים (1)	
				כנית עש הטבק עם תחילת נגיעות בביצים ובזחלים*	משטלות וכמחוי עצץ (2)	

המועד האחרון לטיפול (ימים)	נפח התרסיס לייטר/דונם	המיןון		המועד המיטבי להדבירה	המזיק	הגידול
		(סמ"ק/ד')	(%)			
30	3-20 ריסוס מהקרקע או מהאוויר	75	-	בגיע הנגיעות בזחלים* לספ הטיפול המומלץ*	כנית עש הטבק	כוונה
14	100-8	75	-	בגיע הנגיעות בזחלים* לספ הטיפול המומלץ*	כנית עש הטבק	ירקות: חציל, מלון, כרוב
30	400-250	-	0.1	עם תחילת ההשרצה עם תחילת הרטלה עם תחילת הרטלה עם הופעת הזחלנים עם הופעת הזחלנים	כנית אדומה כנית האיצריה כנית עש לבנה دونגית פלואידית כנית מוץ	הדרים**
	150		0.07	עם תחילת הרטלה	כנית עש לבנה	אפרסכוין

מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 91/ הגה"צ /1155
 • סיווג IRAC : 7C • דרגת רעלות 7A - מסוכן
 • אריזות: 1ל', 5ל' • מיוצר ומשווק על ידי ADAMA אדמתה אגן



טיגר TIGER המשך

הערות לטבלה:

- (1) רשימת הפרחים: חרצית, ורד, גרבלה, חלבוב הדור, ורונית, ליזיאנטוס, אסתר, פלאקס, אסקלפיואס, סולידיוסה.
(2) התכשיר נבדק ונמצא בטוח לצמח עצי צדלאקן: אבוטילון, גרבלה, טרכליום, לימוניום, פלפל נוי, ליזיאנטוס, חלבוב הדור, גראניום.
לפני השימוש בצמח עצי אחרים מומלץ לבדוק תחילת על מספר מצומצם של צמחים.

* **cotonea, פרחים, משטלות וצמחי עציץ** - טיגר מדבר אתቢ צנימות עש. זחלים נקטלים בהגעים לדרגת גולם. השפעתו על הבוגרים מתבטאת בהטלת ביצים עקרות. כתוצאה מהנה"ל הפחתה באוכלוסיות הזחלים תटבטא רק לאחר כ-3 שבועות. בគונתנה: לא מומלץ לרסתס יותר מטיפול אחד בשנה.

בפרחים, במשטלות ובצמחי עציץ לא ניתן יותר ממש ריסושים במשר עונת הגידול, מרוחז הזמן בין הטיפולים לא יהיה פחות מ-60 ימים.

* **זרדים** - טיגר מדבר את הדרגות הצעירות של צנימות המכמ. ריסוס באביב ימנע התפתחות הדור הבא. למניעת נזקי פחתה המפתחת ע"י הפרשות זחל כנימת עש הלבנה והאציריה טפל מוקדם באביב, עם תחילת ההטלה.

* **נשרים** - טיגר מדבר את הזחלים הצעירים של צנימת הפרלטורייה. למניעת נגיעות הפרי בפרלטורייה רסתס עם תחילת בקיעתቢ צנימה באביב. טיפול לאחר הקטיף ינתן במיידה שנמצאה נגיעה רביה בפרלטורייה בפרי שנקטף.

שילובים: לא מומלץ לשלב יותר ממש תכשירים מחשש לפיהה בגידול.
1. **בគונתנה** - ניתן לשלב עם, אטברון, מוליט.

2. **בפרחים, משטלות וצמחי עציץ** - רצוי לשלב טיגר למינעת התפתחות תנוגדות. אפשר לשלב עם התכשיר קרטה - על פי הגידולים המורשים בתווית. בגרבירה ניתן לשלב טיגר עם ורטימק. לפני ריסוס בשילובים אחרים יש לבדוק בטיחות השילוב תחילת על מספר מצומצם של צמחים.



טרויגו TERVIGO

הרכיז ריח'

קוטל נמטוודות בתואריית צילאט ברזל ייחודית, לשיפור פעילות התכשיר

מכיל: L/g 400 g EDDHA-NaFe + L/g

כללי:

טרויגו הינו תכשיר להדברת נמטוודות עפצים בקרקע. טרוייגו מדבר את זחלי הנמטוודות לפני חדרתם לתוך השורשים, אך אינו פועל על נמטוודות בתוך השורש. לכן יש לטפל בו כמנוע, מהשתילה או מהזרעה של הגידול לפני חדרת זחלי נמטוודות לשורש.

ישום התכשיר בגידולים השונים

בגזר יש לרסס את התכשיר על פני הערגונות לאחר גמר הזרעה ולפני הצצתת הגידול. לאחר גמר הריסוס יש להטפר בכמות מים של 25 מ"ק מים לדונם. ניתן לטפל לאחר חיטוי קרקע בטלוון. מועד הטיפול במקורה זה - חדש לאחר הזרעה.

טבלת השימוש

הערות	טיפול האחורי לפני הקיטוף (ימיים)	טיפול המידק	המינון (סמ"ק/ד')	המזהק	הגידול
רישום אחד לאחר הזרעה, לפני הרצפה.	-	נמטוודות עפצים	800	גזר	
מגמייעים מידי שבועיים משתילה (1).	3	נמטוודות עפצים	(2) 400-800	מלפפון	
מגמייעים מידי שבועיים משתילה (1).	3	נמטוודות עפצים	600	עגבניה, פלפל	

- טיפול ראשון עד 3 ימים לאחר מועד השטילה.
- בחלקות נגעוות ברמה בינונית יש לטפל במינון הגובה.

במלפפון, בפלפל ועגבניה – יש להגייע את התכשיר באמצעות **מערכת טפטוף מנוטקוז**, בכמות מים של 10 מ"ק מים לדונם. החדרת החומר למכלול הטפטוף תבצעה החל מאמצע משלב השקיה. יש להמשיר ולהשקיות עד שכל כמות החומר יצאא בטפטופות. לקבלת תוצאות הדברה מיירבות יש להקפיד שהטפטוף תבוצע קרוב ככל הניתן לבסיס השטיל, ובכל מקרה לא יותר מ-10 ס"מ מכמו. אם לא ניתן לישם את התכשיר דרך מערכת הטפטוף הגמע את התכשיר מתחת לטפטופות.

חשב את כמות התכשיר לשטיל לפי מספר השטילים בשיטה. יש לישם את התכשיר בכמות של 100-50 סמ"ק תמייה לשטיל לפי גודלו (הכמות הקטנה לשטילים קטנים) מתחחת לטפטוף תוך כדי הפעלת מערכת הרשיקה בטפטוף. לאחר מכן יש להשרות בכמות של 5-10 מ"ק מים לפי סוג הקרקע וגיל השטיל. (הכמות הקטנה – לקרקעות קלות ולשטילים קטנים, מ"יד לאחר השטילה). יש לוודא כי הטפטוף איננו כרוכקת למעלה כ- 10 ס"מ מבסיס השטיל. ניתן לישם את התכשיר גם בחלקות שקיובלו חיטוי קרקע.

מועד הטיפול: לפני תום פעילות החיטוי, לפני חדרת הנמטוודות לשורשים.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביבורות: 4219 / הגה'ץ / 2015
סיווג IRAC : 6 **דרגת רעליות III - מסוכן לבリアות**
Syngenta Crop Protection Ag Ltd **מיוצר: 5 ליטר**
משווק אדמה אגן

הוראות שימוש:

הערות	ימי המתנה	הרכז (%) (ליטר/دونם)	נפח תרסיס (ליטר/دونם)	המזיק	הגדיל	כלי:
ישום בזמן הפירות והפני חנטה. 2 ישוכנים בריסוס במרווח של 7 ימים לפחות ללא שילובים	70	0.1%	100-300	כינימת המגנו	מנגו	DC, L/g 124 g/L + acetamiprid 186 g/L
תכשיר המשלב 2 חומרים פעילים בעלי מנגנון פעולה שונים להדרכת חרקים מוצצים. 2 ישוכנים בריסוס במרווח של 7 ימים לפחות, ללא שילובים	7	0.05% או 30 סמ"ק/ד	50-100	כינימת עש הטבק	עגבניות, חציל	chodur דרך מעטפת החרק ומערכות העיכול פועל על מערכת העצבים ומשבש את פעילותן. pyriproxyfen מוויסת גדלות חרקים (מג"ח) אנלוג של הורמון גדילת חרקים המשבש את מעבר החרק בין שלבי הגדילה.

קוטל חרקים - תרכיז תפוזי

acetamiprid 186 g/L + pyriproxyfen 124 g/L

כללי:

תכשיר המשלב 2 חומרים פעילים בעלי מנגנון פעולה שונים להדרכת חרקים מוצצים. תכשיר החרק פועל על מערכת העצבים ומערכות העיכול פועל על מערכת העצבים ומשבש את פעילותן.

pyriproxyfen מוויסת גדלות חרקים (מג"ח) אנלוג של הורמון גדילת חרקים המשבש את מעבר החרק בין שלבי הגדילה. שילוב של שני החומרים מביא לפעולות רבת עצמה על טווח מזיקם רחב ומספק הדבירה מרבית של הפגע.

טריבור TRIVOR

תרכיז תפוזרי

מכיל: L/g 124 g/L + Pyriproxyfen 124 g/L
כללי:

טיריבור תכשיר המשלב 2 חומרים פעילים בעלי מנגנון פעולה שונים להדבורה חרקים מוצצים.

רעילות לדבורים ולדבורי בומבו: אסור לרוסס ישירות על הדבורים והכוורות. מומלץ לסגור את הכוורות לקדחת ערבית לרוסס כאשר הדבורים לא פעילים בשטח. 24 שעות לאחר הריסוס אין פגעה בדברים. 30 שעות לאחר הריסוס אין פגעה בדברים בומבו.

הערות לטיפול: כדי למנוע עכידות דאג להשתמש בתכשיר לטיגון עם תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחרת אין לרוסס בשעות החמות של היום, רצוי לרוסס בשעות הבוקר או הלילה. אין לרוסס צמחים בעקה. אין לרוסס בתנאים קיצוניים (חמסין, קרחה וכדומה).

הוראות השימוש:

הgidol	המזיק	המינון (סמ"ק/ד')	נפח תרסיס (ל'/דונם)	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
הדרים	כニימת אדומה (מגנית אדומה)	0.1%	200-300	30	"ישום בודד בריסוס ללא שילובים."
מנגו	כニימת המנגנו	0.1%	100-300	70	"ישום בזמן הפריחה ולפי חנותה. 2. "ישומים בריסוס במרווח של 7 ימים לפחות. לא שילובים."
עגבניה, חציל	כニימת עש הטבען	0.05% סמ"ק/ד	50-100	7	2. "ישומים בריסוס במרווח של 7 ימים לפחות, לא שילובים"

שילובים: אין מידע על שילובים.

פני השימוש יש לקרוא את ההוראות המופיעות בתווית התכשירים.

מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4528/הגה/צ/2024
• סיווג IRAC 7C+4A • דרגת רעלות IV - מסוכן לבリアות
• מיזר ע"י אדמה מכתשים
• תכולה: 1 ל. • משוק ע"י אדמה אק



אדמה

לורטקט

מתקן למשיכת והדברת זבוב הים תיכון (*ceratitis capitata*)

Ammonium acetate, Trimethylamine hydrochloride 1,4 diaminobutane

כללי:

לורטקט Ceratasis המתקן נועד להפחתת אוכלוסיית זבוב הים תיכון בגדיר הזבוב. רצוי לורטקט אחד לפחות כל 20 דונם וכן בהיקף החלקה ובנקודות 'חמות' ולבסוף הממצאות זבוב אחת לשבוע. אין בניתוח ד"י בכדי ללה נכו את מכשך הדבירה כנגד הזבוב, יש לבצע בנותס בדיקות נגיעות בפרי אחד לשבוע. לאחר תליית המתקנים: חובה פירות העז או עם עלוותיו ומכאן שכן כל בעית שאריות על הפרי ועל העלווה. בשל חזק המכושך והסלקטיביות הרבה של זבוב הים תיכון ובמיוחד לנקבת הזבוב מתאפשר שימוש במספר מועט יחסית של מתקנים לדונם ומצטמצמת הפגיעה באוביים טבעיים. השימוש המתקן קל ומהווה חלק ממכלול האמצעים המשמשים להדברת הזבוב.

פעולות המתקן:

המכושך מכיל שלושה חומרים נדייפים המכקיימים ביניהם סינרגיה ויעיל עד כ- 180 יומם. החומרים מתנדפים אל הסביבה באופן מבוקר דרך חרירים קטנים, דרכם נכנסים הזבובים למתקן ואין מוצאים את דרכם החוצה ולאחר מכן מפסיקו מהם מותם.

הוראות הרכבה:

1. הנח מושכן אחד בתוך החלק הצהוב- (במידה והמושכן עטוף בשקית נילון יש להסירה).
2. לחבר את שני החלקים זה לזה בלוחץ כשהחלק הש Kapoor, העליון, מתיישב על מדרגת החלק הצהוב, התחתון.
3. תלה על ענף מעובי 2 ס"מ ומעלה.

אפקט התליה:

המכושך יעל עד כ- 180 יום אם כי יכולתו עלולה לפחות בתואם לתנאי הסביבה כגון: חשיפה לקרינה, העדר הצלה (חלקות צעריות), חסמים ועוד. יש לטלות את המתקן בחלקו הפנימי המוצל של העז בגובה נוח לתליה (2-1.5 מ'), בפינה הצפוני מערבית (בנקודות סבכות, חשוב בצע גיזום סביב המתקן). יש לפזר את המתקנים בחלקה בצורת סגול (זיג-זג) כל שורה שנייה בהתאם למספר העצים בדונם. מספר העצים בדונם לחילק במינון המתקן הרצוי לדונם לחילק ל- 2 (כל שורה שנייה).

המספר המתקן הוא מספר העז בו תולמים את המתקן.

דוגמה:

70 עצים לדונם. מינון 5 מתקנים לדונם. 7=2.70/5/2. מתקן בעז מס' 1 והבא בעז מס' 8 וכן הלאה. בשורה מס' 3 מתקן בעז מס' 4 והבא בעז מס' 11 וכן הלאה. מועדי התליה נקבעים ע"י ניטור מקדים ומועד הרגישות הפטונציאלי לרוב, כל גידול והគודע שלו ובהתאם להנחיות שירות הדרכה והפיקוח האזרחים. ככל יש לטלות את המתקנים לא יותר מאשר משבעים לפני מועד תחילת הרגישות המשתנה מגידול לגידול ולא מוקדם מחמישה חודשים לפני מועד הקטיף המשוער במידה ובתחלת תhalb'ן הניטור מבחינים באוכלוסייה בינות עד גבואה, אין לטלות את המתקנים לפני ריסוס פרופילקטי מקדים.

ניתור:

בכדי לקבל מושג לגבי הממצאות זבוב בחלוקת לאורך העונה ובראשיתה, ניתן להשתמש בלורטקט לשם ניטור הזבוב. רצוי לורטקט אחד לפחות כל 20 דונם וכן בהיקף החלקה ובנקודות 'חמות' ולבסוף הממצאות זבוב אחת לשבוע. אין בניתוח ד"י בכדי ללה נכו את מכשך הדבירה כנגד הזבוב, יש לבצע בנותס בדיקות נגיעות בפרי אחד לשבוע. לאחר תליית המתקנים: חובה לבצע אחת לשבוע ניטור זבוב לשם בקרה על התפתחות אוכלוסיות הזבוב במטע ובדיקות נגיעות הזבוב בפרי. מומלץ להיעזר בשירותי פיקוח מזיקים מתקעים. במקרה ויש עליה באוכלוסיות הזבוב במטע /או בנגיעות בפרי יש לפעול מידית באמצעות טבעים. שימוש המתקן קל ומהווה חלק ממכלול האמצעים המשמשים להדברת הזבוב.

בגמר השימוש:
לקראת העונה הבאה: במידה והמתקנים תקין ניתן לבצע שימוש חוזר ולהחליף נדייפית בלבד. במידה ולא יש להחליף מתקן ונדייפית.

טבלת השימוש

מספר מתקנים לדונם	הgidol	הדרים
*5	תפוח, אגס, אפרסק, נקטרינה, שזיף, משמש, דובדבן, גפן, רימון, אפרסקון, מנגו, אבוקדו	
*7.5-5		

*בזנים הרגישיים בכל גידול מומלץ לטפל ב 7.5 מתקנים לדונם.

*באזדים היודאים כרגישים- נקודות חמות' באזדים בעלי פוטנציאל מחייב והתרבות של הזבוב הקרובים לו: מטמנות, לולים, רפתות, חורש טבעי, מקור כימ- מומלץ לטפל ב 7.5 מתקנים לדונם.

*שימוש במספר מתקנים גבוה מהמצין בתווית בזנים שאינם רגישיים עלול לגרום לאפקט שלילי ולמשיכת של זבוב לחילה מבחן.

מ"ס הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 2017/ הגה"ץ/ 4391

- סיווג IRAC : פרומון
- דרגת רעלות 7A - מסוכן
- מיזור ע"י רונפאל טכנולוגיות
- אריזות: 100 יח'
- משאקו ע"י אדמה אגן



mustang

תרכיז מתחלב

קוטל חרקים מerbactat הפירטורהידים להדברת מזיקים בגידולי שדה, בירקות, במטעים, בגפן ובפרחים.

Esfenvalerate 50 g/g

ניתן להשתמש במוסטנג בגידולים בשטח הגלוי ובגידולים חסויים. הריסוס במוסטנג עלול לגרום ליריבוי אקרים.

10	0.1%		זרב התסיסה, ציקדות. הריסוס להדברת זרבוב התסיסה ידבר גם את עשי האשכול	גפן
-		100	תריפס, פרודריה, ציקדות פרוחים סיפן עדעד, שרכים, פרוח שעווה	
***10	0.1%	120-180	זרבוב פרי ים תיכוני תפוח עץ	
***10	0.1%	80-180	זרבוב פרי ים תיכוני אפרוסך, נקטרינה	

* משתמשים ברכוז כאשר מרססים עם נפח תרסיס מעל 100 ליטר לדונם.

הערות לטיפול:

במידה צפויים תנאי שרב דחה את הריסוס מחשש לירידה בעילות הדבירה.
מנע רחף לגידולים שכנים.

הגידול	המזיק	סמ"ק/ד'	ריכוז*	לפני קטיף (בימים)	מועד ריסוס אחרון	המיון	
						21	150-100
כותנה	פרודנינה, הליאוטיס, זחל זיפית. הריסוס במוסטנג ידיבר גם בגידולים של כנימת עש הטבק			10	3	150-100	
תפו"א, חצ'יל, פלפל	כנימת עש הטבק, פרודנינה				0.1%	150-100	פרודנינה
עגבניה	פרודנינה					150-100	פרודנינה
כרובית, קרוב, קנווט, גזה, סלק	כנימת עש הטבק, פרודנינה				0.1%	150-100	פרודנינה
מלפפון, מלון, שעועית, דלוריות	תריפס הטבק					150-100	תריפס הטבק
בצל ושום	ציקדות פרודריה				10	0.1%	ציקדות פרודריה
מטיעים	אפרוקן צעיר						

- מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 87/הגה"צ/967
 • סיווג IRAC: A3 • דרגת רעליות III - מסוכן לבリアות
 • אריזות: 1 ל', 5 ל' • מיזכר ע"י SUMITOMO OIL
 • **משווק ע"י ADAMA AGAIN**



מוספילן למരיבה

MOSPILAN FOR TRUNK TREATMENT

**תרcit נוזלי להדברת עץ המנהרות
למריחה על גזע העץ.**

מכיל: 20% Acetamiprid

טיפול אחרון לפני הקטיף	שיטת היישום	מינון* (ס"מ/ק/ ע"ז)	קוטר גזע- מ"מ	המזריק	הגידול
3 ימים	ישם את הנקודות הדורשה של מוספilan לגזע העץ מתחת להסתעפות הענפים הראשיים. בהחלפת זן טיפול בכל דרוע בנפרד. כל שיטת יישום שתביא את הנקודות הדורשה של מוספilan לגזע (כגון התזה, מריחה עם מברשתת), תתאים לשימוש.	0.3-0.1 1.0-0.4 2.0-1.1	20-10 45-21 65-46	עם המנהרות של הדרור	הדררים נתיעות ועצי החלפת זן**

* טיפול גזע בכינויים הנ"ל יספק הגנה כנגד זחלי העש למשך מספר שבועות.

** בהחלפת זן הטיפול ניתן לכל זרעו (הרכבה) בנפרד. אין לטפל בהרכבות צעירות מפני חשש לנזק.

התכשיר מיועד לטיפול ישיר לגזע העצים. התכשיר מכיל צבע קר שנitin יהיה זהה את מקום הטיפול. אין להמלול אותו במכים.

טיפול בשתילים לאחר הנטיעה יעשה עם פריצת הלבלוב השני. טיפול במועד מוקדם יותר עלול לפגוע בהתפתחות השתילים. טוווח המינונים מותיחס בהתאם ל佗וח קוטר הגזע. הטיפול ניתן עם הופעת הזחלים הראשונים בעולם. כדי למנוע עמידות אין לטפל ברכזיות באותה עונה במוספilan אלא לטפל לסירוגין בקטול מזיקים שכונגן פועלתו אחרת.

הוראות השימוש במברשת המסתופקת עם התכשיר:

טבילה המברשת בתכשיר (לא מיהול במכים). "סחט" עדפי הנוזל על פני הכל. המריחה תעשה על הגזע/זרוע – מתחת להסתעפות הענפים הראשיים מלמטה למעלה לאורך כ-20 ס"מ מספק כ-0.15 סמ"ק. המריחה הלויר וחזרו (לא טבילה חוזרת) מספק כ-0.25 סמ"ק. למינון גובה מ-0.25 סמ"ק, ניתן לטבול מחדש את המברשת ולמרוחה בצדדים אחרים של הגזע/זרוע. שימוש במברשת זו מתאים לעצים שגובהם עד 45 ס"מ. לעצים/זרעים שגובהם 45-65 ס"מ אפשר להשתמש במקצת או בפייטה. נזילת התכשיר על הגזע/זרוע תוך כדי ישוכנו אינה פוגעת ביעילותו.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1997/גהה"צ / 1416

- סיווג IRAC: 4A
- דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
- מיזור ומשווק ע"י אדמה אgan
- אריזות: 0.5 ליטר



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2005/גה"צ / 1835
 • סיווג IRAC: 4A • דרגת רעלות III - מסוכן לבריאות
 • מיצירות: 70.5' • מושך ע"י אדמה אgan

מועד אחרון לטיפול לפני קיטיף ביבאים	הערות	נפח טרסיס (ל'/ד')	המינון או % (סמ"ק/ד')	המזיק	הgidול
10		50-30 לפי גודל הצמחים	15	חיפושית פרעושית	כרוב, ברוקלי
120	הריסוס ינתן עם הופעת זחלים העש הראשונים של המזיק בעלים.	הרטבה מלאה 400-300 במילוי	0.025% (25 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	עש המנהרות של הדר	הדרים**
	הריסוס ינתן לאחר החנתה בראשית הקיץ		0.015% (15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כニימת הספירה, כニמת עליה הדלועים (ים)	
	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות באביב - קיץ מוקדם		0.075% (75 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כニמה קמחית כדוריית כニמה קמחית חביה	
	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות			כニמה אדומה כニמת השעווה הפלורידית	
	בכニמת השעווה הפלורידית הריסוס ינתן עם הופעת הזחלים		0.025% (25 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כニמת השעווה הפלורידית, תריפס סורי, ציקידות	
				אפרסמן	

מוספילן לריסוין MOSPILAN FOR SPRAYING

תכשיר סיסטמי להדרכת מזיקים בגידולים שונים

Acetamiprid 200 g/L

כללי:

מוספילן הינו תכשיר סיסטמי מerbactyl chloronicotinyl, מיועד להדרכת מזיקים שונים. התכשיר פועל כרעל קיבת ומגע. לתכשיר רעלות נמכה יחסית לבעל דם חמ.

רעלות לדברים ולדברי בומבו:

אסור לרסס ישירות על הדברים והכוורות. מומלץ לשגר את הקורות לקרה ערבית ולרטס כאשר הדברים לא פעילים בשטח. 24 שעות לאחר הריסוס אין פגעה בדברים. 30 דקות לאחר הריסוס אין פגעה לדברי בומבו.

טבלת השימוש: דרכים למניעת פיותות תנודות - כדי למנוע התפתחות תנודות לתכשייה, יש לרסס חליות בתכשיר זה ובתכشيرים בעלי מנגנון פעולה אחר.

מועד אחרון לטיפול לפני קיטיף ביבאים	הערות	נפח טרסיס (ל'/ד')	המינון או % (סמ"ק/ד')	המזיק	הgidול
30	הריסוס ינתן עם הופעת זחלים ראשונים בעלים.	5-3 ----- 20-7	40 ריסוס אויר ----- 25 ריסוס קרקע	כニמת עש הטבק	כוננה
7	לא כולל הצמחים	50-30	20	כニמה עליה הדלועים	אבלית, מלפפון דלועית
7	לא כולל הצמחים	50-30	30	כニמת עש הטבק	עגבניה, פלפל, חציל, אבטיח, מלפפון, מלון, קישוא, דלעת, דלועית



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2005/גה"צ / 1835
 • סיווג IRAC: 4A • דרגת רעלות III - מסוכן לבריאות
 • מיזר ומשווק ע"י אדמה אגן
 • אריזות: 1ל', 70.5ל'

מועד אחרון לטיפול לפני קטיף ביכים	הערות	נפח תרסיס (ל'./ד')	המינון (סמ"ק/ד') או %	המזיק	הgidול
45		לפי גודל הגפניים 150 – 100 0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)		ציקדות	גוף
20	רישום אחד לעונה	לפי גודל העצים 100 – 200 0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)		דבוב הדית	דית
-	הטיפול יינתן אחת ל- 6 חודשים לכותרת הדקל-ב- 3 נקודות, במרקם שווה ביןיה, קרובה ככל האפשר ללולבים. השתמש במרוסס ללא דיזה. הקפד שלא יהיה נגר של הטרסיס על הגזע.	15 ל'./עץ	0.2% (200 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	חדרקוונית Rhynchophorus (ferrugineus)	דקל קני
-		60-30 ----- 100 ומעלה (הרובה מלאה)	30 ----- 0.03% (30 סמ"ק ל- 100 ליטר כימ.)	כימוטה עלה כולן כימוטה עלה האפרסקן, כימוט עש הטבק	אסטר * גפסנט * הירקון * ורד * ליזאנטואין * סולידגנו * פיטוסופורום* רוסקוין
14	מועד הריסוס- עם תחילת הנגימות	50-30 לפי גודל הצמחים	30	כיממה עלה הדלוועים, כיממה עש הטבק	בזיליקום (ריח), מטטה, מרווה, קוונית, רוזמריין, טרגון, מיורן

מוספilan לרייסין

MOSPILAN FOR SPRAYING המשר

מועד אחרון לטיפול לפני קטיף ביכים	הערות	נפח תרסיס (ל'./ד')	המינון (סמ"ק/ד') או %	המזיק	הgidול
45	מועד הריסוס - עם תחילת הנגימות	לפי גודל העצים 150 – 200 0.05% (50 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)			תפוח
		0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)			עש תפוח, ציקדה ורדנית, שלפוחיות עלה האגס (לאקופטרה), ליטוקוליטיס, פרלטוריה, סס, הנמר
		0.02% (10 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)			עש תפוח אגס
15		לפי גודל העצים 150-100 0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)		כימוטה עלה הדלוועים, ציקדות	ריכמן, שקדים
		לפי גודל העצים 200 – 150 0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)			אגוז
15	מועד הריסוס - עם תחילת הנגימות	לפי גודל העצים 200 – 150 0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)			אגוז
30	מועד הריסוס - עם תחילת הנגימות	לפי גודל העצים 200 – 150 0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)		אגוזה, אנרכיה	שקדים, משמש, שדיים, חיפושית הקליפה, אנרכיה
30	אם קיימת נוכחות אקרים, בטטו, הריסוס במוספilan עלול במקרים מסוימים לעודד אותם.	לפי גודל העצים 200 – 150 0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)		אנרכיה	אנרכיה, אפרסקן/נקטרינה
		לפי גודל העצים 150-100 0.04% (40 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)		ציקדות	

מוספילן לרייסוין

MOSPILAN FOR SPRAYING המשר

שילובים:	
פירוט השימוש הבוטוחים עם מוספילן בגידולים השונים:	
אבטיכון: סיגנום, סטרובי, שמן וירול	
קישוא: סיגנום, שמן וירול.	
מלפפון: ספיידר	
מלון: סיגנום, סטרובי, שמן וירול	
פלפל: סיגנום	
חציל: סיגנום	
עגבניות: ספיידר, סיגנום	
הדרים: חנקת אשלאן, גופרת מנגן, תחמצצת אבץ, אוריאה דלת בירוט. (בריכוזים המומלצים ע"י ש.ה.כ.).	
גפן: סיגנום	
כותנה: סיגנום, טיטאן, אטברון, פיקוס	
בזיליקום, מנתה, מרווה, קורונית, רוזמרין, טרגון, כוסברה, שמייר, פטרוזיליה, רוקולה - סיגנום	
לפni ריסוס בכל שימוש בדוק לבטיחות על מספר מצומצם של צמחים.	

* מוספילן TB. נבדק באסתר בזן "קזבלנקה", בגייסנית בזן "מיליאן סטאר", בהיפוריקום בזן "פינק פלייר", בورد בזנים "ויפיטר" ו"סוויט אקליטו", בליד'אנטוס בזן "קאלול לבן", בסולידגו בזן "טרה", בפיטוסופורום בזן " מגון".
בכל השימוש בדוק בטיחות השימוש בזנים שאינם מצוינים כאן על מספר מצומצם של צמחים לפני הריסוס המשחר.
** מוספילן פוגע בחטיבosit הרוחוליה שטורפת את כנימת האיצריה ועלול להוביל להתקפות מציק זה.

הgidol	המידק	המיון (סמ"ק/ד) או %	נפח תרסיס (ל'/ד')	הערות	לפני קטיף בימים כמועד אחרון לטיפול	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעה
קוסברה, שמייר, פטרוזיליה, סלרי, באל'ירוח, רוקולה, עשבי לימון	כינימה עליה הדלועים, כינימה על הטרבק	30	50-30	7	לפי גודל הצמחים	מכניקה עליה תחלית הנגיעה



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2005/גה"צ / 1835
 • סיווג IRAC: 4A • דרגת רעלות III - מסוכן לבריאות
 • מיזכר ומשווק ע"י אדמה אgan
 • אריזות: 1ל', 70.5ל'

מטריק

תריצ'

קוטלי חרקים בעל מנגןון פועלה agonist ecdysone, הפגע בתהליכי ההתנסלות של זחלי עשי לילה. התכשיר פועל כרעל קיבתני והוא סיסטמי. לתכשיר רעלות נמכה לבני דם חמץ והוא רעיל לדבורים. התכשיר סלקטיבי לזרעים, בעל רעלות נמכה לאויבים טבעיים.

מכיל: L/g Chromafenozide 50

כדי למנוע התפתחות תגודות לתכשיר, יש לרסס חליפות בתכשיר זה ובתכشيرים בעלי מנגןון פועלה אחר. אין לרסס יותר משני ריסוסים בעונה. גשם היורד שעה לאחר הריסוס לא יפגע ביעילות הטיפול. אין לרסס צמחים בעקה. אין לרסס בתנאים קיצוניים (חמסין, קרחה וכדומה).

ציד הריסוס:

התכשיר אינו סיסטמי. דאג לכיסוי מירבי של נוף הצמחים. ניתן להשתמש בכל מרסס המתאים לריסוס קוטלי חרקים בנוף התריסיס הדרוש.

טבלת היישומים

הגדיל	הricsos (%)	נפח התריסיס (ל'./ד')	מועד יישום	ימי המתנה לפני קטיף
גפן בזנים קברנה, קלודון, קרייניאן*, ריזלינג, מרלו	0.05%	100-150	עם הופעת ביצים	7
תפוח בזנים גראניטי, פינק ליידי, סטרוקינג, זהוב	0.05%	100-150	"ישום מ 30 + BIOFIX (עם הטלת ביצים)	7

*ניתן לשלב תילtan

- סיווג IRAC: 18
- מיצר ע"י: Nippon Kayaku
- דרגת רעלות AI - מסוכן
- משוק ע"י: אדמה אגן



מייטוואט MITE-WETT

תרכיז נוזלי

משטח סיליקוני המיעוד להדברת אדמה בגידולים שונים

מכיל: Modified Polyalkyleneoxide Heptamethyltrisiloxane

ריכוז: 840 g/L

הוראות השימוש:

ימי המתנה לפני קטיף	נפח התרסיס	הפגיעה	הגדיל	המינון	נפח התרסיס	ימי המתנה לפני קטיף
3	כיסוי מלא של העלווה	אקרית אדומה מציה 80 סמ"ק ל-100 ליטר מים	פלפל, עגבניה, חציל	0.08%	0.08%	3

* לפני טיפול בקונה מידה משקי יש לבדוק את בטיחות התכשיר לגידול התרבותי בקונה מידה קטנה.

שילובים: אין לשלב מייטוואט עם תכשירים אחרים.

מייטוואט משטח סיליקוני מעולה שמסוגל להחדיר מים לתוך קליפת הגוף של האקרית ולחנק אותה. התכשיר אינו רעיל והשפעתו היא פיזיקלית ומידית, אך חובה לסתות את המזקנים בתמיסת הריסום. אין השפעה שראיתית של החומר מפני מייטוואט הוא משטח, כל שימוש עם תכשיר אחר דורש בדיקה יסודית.

התכשיר אינו רעליל לדברים.

הערות לטיפול:

dag לכיסוי מלא של העלווה בתרסיס. מנע רוחף התרסיס לגידולים שכנים. אין לרטס ברוח.

اذירות בזמן היישום:

850 בשעות הבוקר המוקדמות או לפנות ערב. אין לרטס בזמן עקה ובטמפרטורות הגבהות מעל 30°C. בגידולים חסויים מומלץ לאורר במשך ימים לאחר הריסום לבל תעלת הטמפרטורה מעל 30°C. בשורות חוץ ליד הנிலונים בהם הקרינה גבוהה מומלץ לא לטפל.

הכנת התרסיס:

מלא את המרסס עם חצי מכמות הריםהה, הוסף את התכשיר תוך כדי ערבול והשלם את כמות הרים.

השתמש בתרסיס מיד לאחר הכנתו. פעילות מקסימלית תושג כאשר H₂ הרים בתווות של 6-8.

שימוש במים מתחת ל- 5 H₂ או מעל ל- 9 H₂ עלול לפגוע ביעילות.



מ"מ' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליבקורת: 2014/ הגה"צ/4258

- אריזות: 1 ליטר, 5 ליטר
- מיזר ע"י Momentive
- משוקע ע"י אדמה אגן

AMILBENOK

טרכיז מתחלב

AMILBENOK מופק מותצרי תסיסה של סטרפטומיצין ופועל כרעל מגע וקיבה. לתוכשיר פעילות טרנסלמינארית. לתכשיר רעליות נמוכה לדברים.

Milbemectin 9.3%

הערות לטיפול:

כדי למסס עמידות דאג להשתמש בAMILBENOK חליפות עם תכשירים בעלי מבוגן פולאורה אחר אין למסס צמחים בעקה. אין למסס בתנאים קיצוניים (חמצין, קריה וכדומה). על מנת למנוע פירוק מזריך ע"י אוור יש למסס בשעות הערב עד שעת הבוקר המכוקדות.

ימי המתנה לפני הקטיף	הערות	נפח התרסיס	המינון	המזיק	הגידול
3	יש לשלב שמן אולטרה-פ"ן ברכיב 0.5% (500 סמ"ק - 100 ליטר מים) ברכיב 0.5% (500 סמ"ק - 100 ליטר מים) לפ' הרישוי של התכשיר המשולב.	30-100 ל"ד או מעל 100 ל"ד	100 סמ"ק/ד' או 0.1%	אקרית אדומה מציה	חציל, פלפל מלפפון, מלון אבטיח
3	יש לשלב EOS ברכיב 1% (1ל"י/100 ל' מים) לפ' הרישוי של התכשיר המשולב.	30-100 ל"ד	100 סמ"ק/ד'	אקרית העיוויתים	פלפל
3	יש לשלב EOS ברכיב 1% (1ל"י/100 ל' מים) לפ' הרישוי של התכשיר המשולב.	30-100 ל"ד	100 סמ"ק/ד'	מנהן החमמות	מלון
-	יש לשלב שמן אולטרה-פ"ן ברכיב 0.5% (500 סמ"ק - 100 ליטר מים)	הרטבה מלאה (120 סמ"ק - 100 ליטר מים)	0.12% (0.12%)	אקרית אדומה מציה	ציפורי**

* מחשש לצריבות בעלהו.

**AMILBENOK נבדק בדגנים: סטנדרט, ולגרי. בדגנים אחרים צריך לבדוק בטיחות הריסוס על מספר קטן של צמחים.

שילובים:

בירקנות ניתן לשלב עם ספיידר לפ' הרישוי של התכשיר המשולב.

הגידול	המזיק	המינון	נפח התרסיס	הערות	ימי המתנה לפני הקטיף
הדרים פרט לפומלי ופומילית*	עש מנוראות ההדר	0.06% (60 סמ"ק - 100 ליטר מים)	הרטבה מלאה	7	יש לשלב שמן אולטרה-פ"ן 500 (500 סמ"ק - 100 ל' מים) או לבוללה ברכיב 0.5% (500 סמ"ק - 100 ל' מים)
	אקרית אדומה מזרחתית	0.03% (30 סמ"ק - 100 ל' מים)			
תפוח עץ אגוז אגוז	אקרית אירופית, אקרית צהובה של נשירים	0.1%	לפי גודל העצים	5	
	אקרית אדומה מציה	0.1%	30-100 ל"ד או מעל 100 ל"ד	יש לשלב שמן אולטרה-פ"ן 0.5% (500 סמ"ק - 100 ל' מים) או EOS ברכיב 1% (1ל"י/100 ל' מים) לפ' הרישוי	
עגבניה	טוטה אבסולוטה, מננהן החממות	0.1%	100 סמ"ק/ד' או מעל 100 ל"ד		



מס' הרישוי של השירותים להגה"צ: 2000/ הגה"צ/ 1535

- סיווג IRAC: 6
- דרגת רעליות VII - מסוכן
- אריזות: 0.5 ליטר
- מושך ע"י אדמה אgan

מיןקטו אלפא

תרכיז ריחוף

מכל:L/g Cyantraniliprole 100 g/L + Acibenzolar-S-methyl 12.5

כללי:

מיןקטו אלפא הינו קוטל כנימת עש הטבק סיסטמי לירקות. שמהווים נשאייה לירוסים צמחים. התכשיר מכיל את החומר הפעיל ציאזאפיר (ציאנTRANILIPROLE) מקבוצה 28 המשפיע על מערכת העצבים והשריר של החרק, יחד עם החומר הפעיל אסיבנזולר-S-מתיל הכך את מערכת החיסון הטבעית של הצמח לפעלה נגד וירוסים. בכך למנוע עמידות לתכשיר יש לבצע טיפול אלטרנטיבי עם תכשירים בעלי מנגן פעללה שונה. אין לשימוש מיןקטו אלפא פעמיים ברציפות וכן אין לטפל לפני/אחרי מיןקטו אלפא בתכשירים מקבוצה 28 (כגון, קווגן, אמפיליגו ווירימרכ ועדי).

הכנת התרסיס:

להכנת התרסיס יש להשתמש בימים שפירים ולהכין את תמיית הריסוס לפני היישום. מלא את מכל הריסוס כדי מחציתו במים, הפעל את מערכת הערבול, שפוך את כמות התכשיר הדורשה והוסף את יתרת המים תוך כדי ערבול מתמיד. יש לרסס מיד עם גמר הכנת התמיישה, אין להשאיר תמיית ריסוס למשך הלילה לשימוש ביום שלמחרת.

טבלת היישום:

הgidול	הפגיעה	מינון (סמ"ק/دونם)	נפח תרסיס (ליטר / دونם)	טיפול אחרון לפני אסיף (ימיים)	כニימת עש הטבק
חציר (שדה וחממה)	כニימת עש הטבק	75	30-20	3	כニימת עש הטבק
עגבניות*	כニימת עש הטבק	75	30-20	3	כニימת עש הטבק

* שני ריסוסים בהפרש של 7 ימים. עוקבים החל משבוע אחרי שתילה

שילובים: אין מידע

- דרגת רעלות IV - מסוכן Syngenta Crop Protection Ag
- מיזכר ע"י: 17.5 ל'
- משוק ע"י: אדמה אgan
- סיווג IRAC: 28



מצ' MATCH

騰rciz מתחלב

קוטל מדיקים - מג'ח (IGR) להדברת זחל עשים בגידולי ירקות, פרחים, תבלינים, תפוח וcotנה

Lufenuron 50 g/L

כללי:

מצ' הוא מג'ח (מעכב גידול חרקיים) מנקובצת הבנזואיל-פניל-אוריאה, מונע סינטזה ציטין, ע"י קר מפסיק את תהליך הנשל וגורם למותו של הזחל בשעת המעבר מדרגות התפתחות אחת לשניה. מצ' פועל על הדרגות ההתקפות זחל וביצים בשעות הראשונות לאחר הטלתן ועל זחלים בכל הדרגות ואינו פוגע בבוגרים. פעילותו מהירה יותר בטמפרטורות גבוהות. מצ' הינו תכשיר סלקטיבי, שאינו פוגע בדברים, בצרעות טפיליות ובأוביים טבעיים רבים אחרים.

הערות	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)	המינון (סמ"ק/ד')	הרכיב (%) ברכיסוס 100 בנגירה (ליד' ומעליה)	המדיוק	הגידול
יש להקפיד על כיסוי מיטבי של כל חלקו הצמח, יש לחזור על הריסוס עם הופעת חלק צמח שלא צומח ע"י הריסוס הקודם.	14	40	פודינה, לפגמה	תפוח-אדמה	
	14	60	עש הפקעות		
	14	40	פודינה, לפגמה	קינרס	
			לפגמה	תירס מותוק	
			פודינה, לפגמה	בטטה	
			פרופיל, עגבניות		
			פרודינה	שועונית	
			פרודינה	גזר, חסה	
			פרודינה	תות שדה	
מטפלים עד שלב הפריחה.	14	40	תבלינים: ריחן, עירית, טרגון, מנטה, רוזמרין, שמן, פטרוזיליה, cosa ברברה, סלרי, עלים מייזונה, תרד, הווקט, עלי סלק אדום (וד צ'ארד נבולס בלבד) עליל סלק (צ'ארד ועליל תחת-סוי)	פרודינה	



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 95/גה"צ/1313
 סוג: IRAC:15 • דרגת רעלות VII - מסוכן
 Syngenta Crop Protection Ag • אריזות: 5 ל' • מושוק ע"י אדמה אגן

הערות	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)	המינון (סמ"ק/ד') ברכיסוס 100 ל' (ליד' ומעליה)	הרכיב (%) ברכיסוס 100 ל' (ליד' ומעליה)	המדיוק	הגידול
רישום ראשון להדברת עש התפקיד ינתן עוד לפני הטלת הביצים (במוצע 35 BIOFIX+100 ליטר). ריסום שני עם תחילת בקיעת הביצים (במוצע BIOFIX+100 ליטר ימי מעלה). יש לדאוג לכיסוי מלא של נוף העץ בעיקר בצמחיות העצים. ריסומים נוספים ינתנו כדי 14 ימים ישמשו להדברת שני המדיקים.	14	0.1% (100 ליטר)	100 סמ"ק/100 ליטר	עש התפקיד 55 הנמר	תפוח
בריסוס מהאוויר: 5 ליטר לדונם ומעליה	-	40		פרודינה	cotנה
יש להקפיד על כיסוי מיטבי של כל חלקו הצמח, יש לחזור על הריסוס עם הופעת חלק צמח שלא צומח ע"י הריסוס הקודם.	14	40		פרודינה, לפגמה, לבני הכרוב, שע לב הכרוב	כרובית, כרוב, כרוב סיני

מצ' MATCH המשך



הגדיל	המזיק	לנגירה (ל' 100 ל' /ד' ומעלה)	בריסוס (סמ"ק/ד' - 30-70 ל' /ד')	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)	המינון (סמ"ק/ד')
מרווה, בצל ירק, קורנית, רוקולה עם הרקפת	פרודניה לפגמה,			14	40
פרוחים: אסטר, ארליה, אספרגוס מירקל אדיום, אספרגוס ירגטוס, ג'יפסונית, גרבלה, היפריקום, ליזיאנטוס, לילכונים, סולידגו, פיטוסופרום, פוטיניה, ציפורן	פרודניה, לפגמה	0.04% (40 סמ"ק-ל-100 ליטר מים)	40		
ורד בזנים: גולדן, יגואה למבדה, ספיה, פרינסס וקונפטי	פרודניה	0.1% (100 סמ"ק- ל-100 ליטר מים)	50		
חרצית, פלאק	פרודניה	0.4%	40		

שילובים:
בכottaנה - ניתן לשלב מצ' עם פגסוס ת"ג, אפלורד ת"ג, טיגר ת"מ, סקור ת"מ ועם מוליט ת"ה.
בירוקות - ניתן לשלב מצ' עם אפלורד ת"ג, סקור ת"מ, ביפידאן ת"מ, אופיר ת"ש, מוליט ת"ה, אקוובט א"ה, רידומיל גולד ZM ג'ר וסוויצ' ג'ר.
בפרוחים - ניתן לשלב מצ' עם אפלורד ת"ג, טריגרד א"ה, קרטה ת"מ, ועם מוליט ת"ה.
בתפקיד - ניתן לשלב מצ' עם אופיר ת"ש ועם מסאי א"ה.
 בכל מקרה של שילוב, יש להתחשב גם בהנחיות השימוש ואמצעי ההזרחות המפורטים בתוויות החומר המשולב!

СПІДЕР

תרכיז ריח'

קוטל אקריות המונע התנסלות. התכשיר פועל כרעל מגע על הדרגות הצעירות (ביצים ונימפות) ולן טפל כשמורבית האוכלוסייה בדרגות צעירות. לתכשיר משך פעולה ארוך. כדי למנוע עמידות דאג ל-1000 חילופות בספיידר ובתכشيرים בעלי מנגנוני פועלה אחרים. לתכשיר רעלות נמוכה יחסית לבעל'ם חם ואין רעל לדבורים.

מכיל: 1/g Etoxazole 110 g

הערות לטיפול:

קצב הדברת אקריות ע"י ספיידר איטי בטכשירו נמוכות (סתיו מאוחר, חורף, אביב מוקדם). ב��וי צמיחה מוחכמים פעילות התכשיר מהירה יותר. לתכשיר פעילות טרנסלינירית, למרות זאת דאגליסי מרבי של העלוה בתרסיס.

* ספיידר נבדק באסטרן קזבלנקה-פרפל; בגפסניתן פרפקטה; בוורד זנים - פירסט רד, יוגאר, פרסקו, גבריאלה, מרצדס, פרופיטה, אירופה; בליזיאנטוס בזן אקו; בציפורן בזנים - ברבטואן, צאו ביינקן, באצו, צאו, רד צאו, הוואנה, אימפלול, סקרלט. בזנים אחרים צריך לבדוק לבתיות תחילת על מספר מצומצם של צמחים. השימוש בתכשיר מותר רק בגידולים המופיעים מעלה. אין לרסס בגידולים אחרים גם אם הם שייכים לאוֹתָה משפחה בוטנית וזאת בגלל סכנות גירמות נזקיות (פיטוסוקסיות). אין להשתמש בספיידר בסולידיוגו או בסולידיואטה.

שילובים:
בירוקות ניתן לשלב עם ורטימיכון או צילבונוק לפי הרישוי לתכשיר המשולב. בחציל, פלפל, עגבניה ואבטיח ניתן לשלב עם סיגנון. בעגבניה ובפלפל ניתן לשלב עם כסאי. במלפפון ועגבניה ניתן לשלב עם מוספילן לריסוס.

טבלת השימוש:

הידול	המידק	המינון או הריכוז	נפח התרסיס	ימי המתנה לפני הקטיף
הדרים	אקרית אדומאה מזרחתית	0.0125 % (12.5 סמ"ק ל-100 ל' מים)	הרטה מלאה	21
תפוח	אקרית אירופית, אקרית צהובה	0.025 % (25 סמ"ק ל-100 ל' מים)	לפי גודל העצים	14
חציל, פלפל	אקרית אדומאה מצויה	25 סמ"ק/ד'	30 - 30 סמ"ק/ד'	3
עגבניה	אקרית אדומאה מצויה	25 סמ"ק/ד'	100 - 30 סמ"ק/ד'	3



מס' הרישויון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1469/גה"ץ/97
 • סיווג IRAC: 10B • דרגת רעלות IV - מסוכן
 Sumitomo Chemicals • מיצר ע"י: Sumitomo Chemicals
 • אරזות: 0.5 ל' • משאכק ע"י: אדמה אגן

pegasus פגסוס

רכיז ריח

קוטל חרקים וAKERIOT בפרחים ובירקות

Diafenthhiuron 250 g / ml

כללי:

פוגסוס הינו קוטל חרקים וAKERIOT מהקבוצה הימית תי-אוריאה, הפעיל כרעל קיבת וכרעל מגע. התכשיש קוטל את דרגות הזחל והבוגר של נימנת עש הטבק, AKERIOT קורדים, AKERIOT החלודה של העגבניה וכן AKERIOT עיוותים, ציקדות ונימנות עליה.

הוראות השימוש:

תדריות הריסוסים:

בתנאי צמיחה נוראץ ובגימות מתמשכת, רצוי לחזר ולרסס שנית את התכשיש בחולף 7 ימים.

ריסוסים חלופיים:

בכדי להקטין את הסכנה של התפתחות תנוגות לתוכשי, יש לטפל בריסוסים חלופיים עם קוטלי מזיקים נוספים המואושרים בהתאם לתנוגות תנוגות לתוכשי.

אופן השימוש:

רסס את התכשיש על נוף הצמחים כדי כיסוי מלא של העלווה במפורט בטבלה. המגע מריסס בשעות החמות של היום או כאשר הצמחים נמצאים בעקה.

טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)	נפח תרסיס (ל'/ד')	המינון (%) או ריכוז (סמ"ק/ד')	המודיע	המזהק	נפח גבואה מ-100	בהתאם לרמת הנגימות או 0.15%	כニמת עש הטבק; בוגרים וזרלים, AKERIOT אדומה מציה וAKERIOT צהובה	פרחים* בשטח הגלי והחסווי פולקס, גרבירה, חריצית, סולידאסטה, צפורה, לימוןום, ליזיאנטוס, ורד, אסטה (אין לרסס על פרחי אסטר פתוחים).
7	50-15	150-100	כללי:	כニמת עש הטבק; בוגרים ודרגות צעריות, AKERIOT אדומה מציה, AKERIOT צהובה	פלפל - בשטח הגלי והחסווי	בהתאם לרמת הנגימות או 0.15%	כニמת עש הטבק; בוגרים ודרגות צעריות, AKERIOT אדומה מציה וAKERIOT צהובה	פלקס, גרבירה, חריצית, סולידאסטה, צפורה, לימוןום, ליזיאנטוס, ורד, אסטה (אין לרסס על פרחי אסטר פתוחים).
28			עגבניה - בשטח הגלי	כרוב, קרובייה				
7								
14								

* הפרחים והזרלים המופיעים בתווית נבדקו בשנים 1994 ועד 1996.

ורד: הזרלים מרצצט, יגואר, שטפוני, אודם, גבריאלה, פריסקן, ספייר, קליברה, ברונן, סובניר, אודה.

אסטר: הזרלים זיו, קובלנקה, סנורי, סנסט, סנרווד, סנטופ.

בהתחרש במגוון זני הפרחים הימיים, בתחלופת הזרלים וכן בשינוי בתנאים ובונהו הנידול והרסוס, נגד מזיקים בגידולים אלה.

שילובים: בהעדר מידע אין לשלב בתכשישים נוספים.

בהתחרש במגוון זני הפרחים הימיים, בתחלופת הזרלים וכן בשינוי בתנאים ובונהו הנידול והרסוס, נגד מזיקים בגידולים אלה.



מ"ס הרישון של השירותים להגנת הצומח ולבירקות: 2022/גה"צ/4628
סיווג IARC : 12A · דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
Syngenta Crop Protection Ag · מיצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag · משוק ע"י אדמה אגן

פרוקליים

תרכיז מתחלב

להדברת זחלים עשים, אקרים וטריפסים בירקوت, כותנה, גפן, תבלינים, פרחים ועצים אוורן

מכיל: **L/g 19.2%**
Emamectin benzoate

כללי:

פרוקליים הינו תוצר טבעי של מיקורוארגנידים בקרקה. התכשיר נספג ברקמות הצמח ונקלט ע"י הזחלים בעיקר דרך מערכת העיכול. כל החומר הנוטר מחוץ לרקמת העלה מתפרק תוך מספר שעות. מנגנון הפעולה של אממקטין בנזואט (פרוקליים) להדברת חרקים הינו ייחודי ואניינו דומה לזה של כל קוטל חרקים אחר. אממקטין בנזואט משפיע על מערכת העצבים של החרק, כתוצאה לכך מכיר מאבד החרק את כושר האכילה מייד לאחר חשיפה לוחמה התמוטה מתחרשת 2-5 ימים לאחר האכילה.

החוכר רעל לדבורים ב嚷ע ישיר בלבד. מרגע חדירתו לצמח והטרפיקות השאריות, פרוקליים אינם רעל עוד לדבורים.

מי חרקים אחדים פיתחו עמידות לפרוקליים, ובמקרה זהם לא יודרו.

אין לרסס בתכשיר במזקמות בהם התפתחה עמידות. מומלץ לישם בשעות הבוקר או לפנות ערב.

טבלת השימוש:

הערות	ימי הנמתנה לאחר הריסוס האחרון	נפח התרסיס (ל'/ד')	המינון (סמ"ק/ד')	נפח בנפח קטן (סמ"ק/ד')	רכיב ב-% בריסוס לנגירה	המזיק	הגידול
במידה וקיים חשש להמצאות נuber התירס האירופי לרסס ב-60 סמ"ק/ד'	7	50	60	-	-	נuber התירס האירופי	תירס מותק פלפל
			40	-	-	הליוטיס	
	7	50	40	-	-	עש הכרוב, עש לב הכרוב, תריפס הפטבק	כרוב, קרובי%
	7	60	-	-	-	פרודניה	
	7	60	-	-	-	סלרי, חסה	
	7	60		עש הפקעות, לפיגמה, פלוזיה	תפוח אדמה		
ניתן לריסוס גם במערפל ("פוגר") קרה	-	100-50	60	0.06% 60 (100/100 מ"ל) ליטר מים	פרודניה, פלווזיה, לפיגמה	ורוד בנזים: מושצדים, אמוה, פרוסקו, ג'ז, יגואר, פיירסט-רד, פרופיטה, כרמן, תפורה	
יש להוציא נימגררד בריכוז 1% או שמן סיטואול 0.5%	7	50	60		תריפס הפטבק	בצלירוק, עירית	
	7	50-30	60		אקרים העיowitzים	תבלינים: ריחן (בזיל)	
	7	50-30	60		מנטה, מרווה, רוזמרין, קורנית, טרוגן, חיקט, מיזונה, תרזה, חוקוליה, עליל סלק (צ'ארד), עליל סלק אדום (ורד צ'ארד ובולס בלד) ועליל תה סוי	פיגמה, עש הרקפת	כותנה, פלפל עגבניה

מס' הרישון השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 98 / הגה"צ / 1508

מס' או"מ: 3082-3082

- סיווג IRAC: דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
- מיוצר ע"י Ag 5.1, 1.6'
- אריזות: 1 ליטר, 5 ליטר
- משווק ע"י אדמה אגן



הערות	ימי הנמתנה לאחר הריסוס האחרון	נפח התרסיס (ל'/ד')	המינון (סמ"ק/ד')	רכיב ב-% בריסוס לנגירה	המזיק	הגידול
	-	50	40	-	הליוטיס	
	7	75	40	-	אקרים העיowitzים	פלפל
	7		40	-	עש הפקעות, הליוטיס, אקרים החולודה, פלווזיה, טוטה אגסולוטה	עגבניה

הערות	ימי הנמתנה לאחר הריסוס האחרון	נפח הטרסוס (ל'/'ד')	המינון (סמ"ק/ד')	ריכוז בנפח קטן לנגירה לנגישות	המציק	הגידול
למנועת פגיעה בדברים מרססים בלילה, החל מ-10% פריחה ועד סופה מדי-4-7 ימים בהתאם להתקדמות הפריחה.	14	150-75		0.06% 60 סמ"ק (ל-100 ליטר מים)	תריפס הטבע	נקטרינה

שילובים: ניתן לשילב פרוקליים ת"מ עם אופיר 2000 ת"ש ורידומיל גולד ZM ג"ר בעגבניות, רוד וגיסנטה.

הערות	ימי הנמתנה לאחר הריסוס האחרון	נפח הטרסוס (ל'/'ד')	המינון (סמ"ק/ד')	ריכוז בנפח קטן לנגירה לנגישות	המציק	הגידול
פרחים: אסטר, ארליה, אספרגוס ורגטוס, גרבראה, גודטיה, היפריקום, חרצית, לייזיאנטוס, לימון, סולידגו, פושניה, פטוסופורום, מטראקירה, פלוקס, כלנית, גיפסונית (בדנים: פרפקטה, מיליון סטארטס)		100-50		0.06% 60 ק"ס (ל-100 ליטר מים)	פרודניה לפיגמה פלוזיה	
תות שדה	7	75-50	60		פרודניה	אורן
תהלוכן האורן				הזרקה לגזע (המינון 1-1 ס"מ קיטור גזע: 1 סמ"ק)	-	אפרסק, משמש

מס' הרישון השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 98 / הגה"ץ / 1508

מס' או"ם: 3082

דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות

- סיווג IRAC: 6
- מיוצר ע"י Ag 3082
- ארכיות: 1, 5, 7'
- משווק ע"י אדמה אגן

CHESS צ'ס

גיגרים רחיפים

קוטל כנימות עלה בהדרים, פלפל, אבטיח, מלון, תפוח אדמה, קרוביים, תבלינים ותות שדה

Pymetrozine 50%

כללי:

ימי הנמתנה לאחר הריסוס האחרון (סמ"ק/ד"ב) בנפח קטן	המינון (גרם/ד") או הריכוז (%)	המזיק	הgidol
3	30	כニימת עלה הדלוועים	פלפל
4	30	אfid הכרוב (כニימת הכרוב), אfid הכותנה (כニימת הדלוועים)	קרוביים: קרוב, ברוקולי, קולרבי, קרוב סיינ'
14		אfid הכותנה (כニימת הדלוועים)	מלון
3	30	כニימת עלה הדלוועים	אבטיח
14	30	אfid הכותנה (כニימת הדלוועים)	תבלינים: רוקולה, כוסברה, שמייה, פטרוזיליה, סלרי עליים, מיזונה, תרד, רוקט, עליל סלק (צ'ארד), עליל סלק אדום (רד צ'ארד ובולס לבב) ועליל טט סי
7			מרווה, רוזמרין, קורנית, מיורם, בזיל, מנטה

טבלת השימוש:

1. בתות שדה ניתן לטפל בציגו ייחד עם משטר פיזור אויבים טבעיים וAKERיות טורפות.

שילובים: בפלפל ניתן לשלב צ'ס עם עמיסטה, נימגארד, שביט, הליגופריט, בליס ופראקלים. בכל מקרה של שילוב יש להכניס תחילת תכשירם לפי סוג התואריות (הפורמולציה) בסדר הבא: תכשירם האזרחים בשילוקות נמסות, אבקות רטיבות, גיגרים רחיפים, תרכץ רחיף, תרכץ מתחלב ותרכץ נזול. יש להמתין עד התמססותם המלאה של התכשיר הראשון, ורק אחר כך להוסיף את התכשיר השני.

צ'ס 50 הוא קוטל חרקים מerbוצה 9 הפגע במערכות העצבים והשריר של חרקים מצויים בלבד. צ'ס גורם להפסקה מידית ובLATI חזרת של פעולה המציצה והזהנה של החרק. החרק נשאר בחיים ליום עד ימים אחדים לאחר הריסוס עד שמת מרעב ומהתיבשות. צ'ס הוא בעל מגנון פעולה יחודי על החרק, שהוא מכל קוטלי החרקים עד כה. צ'ס אינו פוגע באוביים טבעיים ומ证实ים לשילוב במỨקות הדבירה משולבת של חרקים, ובמקביל מניעת עמידות של כニימות הגדбраה השונות.

צ'ס אינו רעיל לדבורי בומבו.

ימי הנמתנה לאחר הריסוס האחרון (סמ"ק/ד"ב) בנפח קטן	המינון (גרם/ד") או הריכוז (%)	המזיק	הgidol
-	0.02%	אfid הספרואה (כニימת הספרואה), אfid הכותנה (כニימת הדלוועים), טוקסופורת הדרים (כニימת הדר השחומרה), אfid הקיטניות (כニימת הקטניות)	הדרים (בעצים צעירים בלתי מניבים)
5	30	אfid הכותנה (כニימת הדלוועים)	תות שדה (1)
7	30		תפוח אדמה
3	30		פלפל



מ"ס, הרישון השירותים להגנת הצומח ול ביקורת : 03/ה"צ/1731
 • דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
 • סיווג IRAC: 9B
 • מיוצר ע"י Ag Syngenta Crop Protection
 • ארידזוט: 1 ק"ג
 • משוק ע"י ADAMA אגד

קלאי' CLUTCH

גרגירים רחיפים

מכיל: 50% Clothianidin

כללי:

קוטל חרקים בעל מגוון רחב של מזיקים בירקות, גידול שדה, מטעים, פרדס, כרם ופרחים. התכשיר פועל כרעל קיבבה ומגע.

הערות לטיפול:

מנע רוחף של הטרטיס לגידולים שכנים. כדי למנוע התפתחות תנודות לתכשיר יש לטפל חליות בתכשיר זה ובתכשירים בעלי מגנון פעולה אחר. אין לרוסס בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה, שרב וכאשר הגידול נמצא בתנאי עקלם כגון יובש, חום או סובב מנזרני קרה, מחסור אוורור קרחע, מנזק מקטלי עשבים ועוד. התכשיר רעיל לדבורים. באזרחים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט לישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת התכשיר לעורם. לאחר שבועיים מיום הטיפול, יש להכניס כוורות של דבוריים רק לאחר שבועיים מיום הטיפול.

ימי המנתה לפני קטיף	אופן היישום	נפח הריסוס (ל"ד')	המינון (גרם/דונם או %)	המזיק	הגידול
3	הגעה לבית השורשים באמצעות מנתת ההשקיה.	-	1.0 גרם/גפן	קימוחית הגפן	גפן
30	ריסוס	100-50 בנפח ריסוס מעל 100 ל"ד'	0.1% - 0.05% המינון בהתאם לרמת הנגיעות	פסילת האגס	אגס*
14		40-10	50 גרם/ד'	ציקדה יrokeה	גדר
15	עדיף לרוסס עם מפוח.	里斯וס עם נפח גובה, 150-200 ליטר/ד'	0.05%	צראת השקד**	שקד*
45	里斯וס כל 20 ימים משלב של צימוח צער	50	50 גרם/ד'	מלדרה מטרידה	אדגוזי אדמה
-	里斯וס עם נפח גובה (עד נגירה)	100-50	***0.1-0.05%	כנימה קימוחית ארוכות זנב	פיטוספורום

*שים לב,

הריסוס עם התכשיר עלול לפגוע באוכלוסיות של אוביים טבעים במטע ולהגביר נוכחות של אקרים.

** מועד הריסוס יקבע ע"י הערכת גיחות של בוגרים מפירות נגועים.

*** בהתאם לעוצמת הנגיעות.

שילובים: אין לשלב עם חומרים כל עוד אין מידע אחר.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2011/גהה"צ/4049

• סיווג IRAC: A4 • דרגת רעלות IV - מסוכן

• אריזות: 0.5 ק"ג, 2 ק"ג • מיוצר ע"י Sumitomo Chemicals

• משוק ע"י ADAMA אגן

הגידול	המזיק	המינון או הריכוז	נפח הריסוס (ל"ד')	אופן היישום	ימי המנתה לפני קטיף
APERSK, נקטרינה, משמש*	קפנודיאס (טיפול בבוגרים)	50 גרם/ד'	里斯וס	30	
תפוח, אגו*	ציקדה יrokeה	0.05%	מעל 100	עש תפוח	30
גפן	קימוחית הגפן				30
גפן					-

לפני השימוש יש לקרוא את ההוראות המופיעות בתווית התכשירים.

קרקל

CARAKOL GB

פיטיון גרגרי

הערות	המציק	הגידול
דאג לא לפזר על נוף הגידול. רצוי לפזר בהיקף השטח למינע פליישת חלזונות. בכורוב, כרובית וחסה אין לטפל ישירות על הגידול, יש לפזר את הפיטיון בין השורות.	2 ק"ג/ד'	גידולי ירקות, גד"ש
	2 ק"ג/ד'	תבלינים (רוקולה, מנטה)
	2 ק"ג/ד'	חיטה
	2 ק"ג/ד'	פרחים (אספרגוס, הרדוֹף, מגנית, רוסקוּס, נץ חלב)
אופן היישום: אין לפזר פחות מ-20 ימים לפני האסוף.	50 גרם לעץ	עצ' פרי
	2 ק"ג/ד'	הכנת שטחים לפני זרעה, שלו' שדות חקלאיים ברדיוס 10 מטרים

להדברת חלזונות דרחול השיח (*Monacha haifaensis*) (Theba pisana), נזירת דוגנית (Metaldehyde

מכיל: 5% מכיל פיטיון שימוש חלזונות. לאחר מגע עם התכשיר ובלתיו החלזונות מודברים.

אופן היישום: יש לפזר באמצעות מפזרת דשן בהתאם לסוג הגידול וגודל השטח. (ראה סעיף הערות).
יש לישם את הפיטיון בצורה שיפחתית למינימום האפשרות של אכילה ע"י בעלי חיים אחרים. המנע מהשאבות ערמות. אין
לישם מהאויה



מ"ס, הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת – 2014/הגה"צ/4188
 • אריזות: 1 ק"ג, 5 ק"ג, 20 ק"ג • מייצר ע"י KOLLANT
 • דרגת רעלות V - מסוכן • משוקע ע"י אדמה אגן

ראפקס Rapax AS

רכיצ' ריח' SC

מכל:

Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki strain EG

מיטבי:

ראפקס AS קוטל חרקים ביולוגי להדרכת זחלים

הערות	ימי המתנה	נפח התרסיס	המינון או הריכוז	המזיק	הגידול
ליישום במהלך חודש וחצי משתילה תור הקפדה על כיסוי מיידי	3	100	0.1%	עש האשכול	גפן
2 יישומים עקביים	3	20-30	100	עש לב החרוב	כרוב, קרובייה
	3	100-140	0.1%	כחילן הרימנו	רימון

שילובים: אין מידע על שימושים

התכשיר מכיל רעלנים של Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki אשר מפיזים חלבונים קרייסטליים (Cry) בעלי פעילות קטילת חרקים. חלבונים אלו פועלים באופן סלקטיבי נגד זחלים עשים וגורמים להפרעה במערכת העיכול של הזחל, דבר שਮוביל להפסקת האכילה ולבسوף למוחות.

כדי למנוע עמידות דאג להשתמש בתכשיר לטיוגין עם תכשירים בעלי מנגןן פעולה אחרת

הערות לטיפול:

כשה את עלות הגידול היטב בתמיסת הריסוס. יש לנטר את השדה ולרטס כאשר הזחלים בוקעים או על זחלים צעירים. אין לשימוש את התכשיר אם צפויים תנאים מזג אוויר קיצוניים של חום, קור ויבש וכן כאשר הגידול נמצא בתחום עקלתון.



מס' הרישי של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2025/גה"צ/ 4657

מס' רישי ארגני: 7574 | סיווג: IRAC 11A | דרגת רעלות: IV – מסוכן | אריזות: 1 ליטר |
מייצר ע"י: I.R.I CBC (Europe) | משאvk ע"י: אדמה אגן

תלtan

תרכיז ריח'

מכיל: L/g 80 Bifenthrin 80 g

כללי:

קוטל חרקים מerbacytz היררכורואידים. התכשיר פועל כרעל מגע וכרעל קיבת. אין לרסס יותר מאשר ריסוסים בעונה (על גבי הפרי). בין הריסוסים יש לישם שני טיפולים בתכשירים מerb' כימית שונה להדברת אותו צירוף גידול פגע.

הgidol	hmzik	ao minon (sm"k/d')	tipul acharon lpenoi katif (yamim)	hevrot
זית	(עשנור הייסכין) עש הייסכין	0.065%	30	מודולץ לשלב עם EOS ברכיב 1% לצורך הגברת יעילות הדבירה
פרוסק, נקטרינה, משמש, שקד	ציקדית יוקה (ציקדה יוקה)	0.12% או EOS 1% + 0.12%	14	
שדי'	ציקדית יוקה (ציקדה יוקה), עש פרי האשכול (עש האשכול)	0.12%	14	
גפן	פסילת האגו	0.12%	7	לאחר הבציר ניתן לשלב עם EOS 1% + לצורך הגברת יעילות הדבירה
אגוז	פסילת הגזר	0.1%	5	
גדר		100 סמ"ק/ד'	5	



מ"מ הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת - 2015/הגה"צ/4300
 • סיווג IRAC: A3 • דרגת רעלות III - מסוכן
 • מיזכר ע"י אדמה מכתשים
 • אריזות: 5 ל' • משוק ע"י אדמה אגן

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.



אדיגן סופר EDIGAN SUPER

騰龍農業有限公司 לדריבת פטריות קרקע ונטודות.

Metam Sodium 510 g/w

כלי: אדיגן סופר מתערבב עם המים שבקרקע, והופך תוך מספר שעות לגז מסיס במים הפעיל על הפגעים הבאים: פטריות קרקע שונות, נטודות חופשיות, ומזקי קרקע שונים.

אדיגן סופר מושפע מכך שטח הנביטה ופוגע חלקות בצמחים רב-שנתיים. אדיגן סופר אינו יכול לצרעים בתדרמה. אדיגן סופר מושפע מכך שטח הנביטה הקימיים בשטח בעת הטיפול ועלול לפגוע גם בעצים ששורשיהם מגיעים לאדמה שמצוי בה חומר תוך 10-20 ימים, בהתאם לטמפרטורת הקרקע, גלם החומר בלבד להשאיר כל שרירות בקרקע.

מניעת מפגעים סביבתיים ופגעה בגידולים קיימים:

טיפול באדיגן סופר יבצע רק עם מים מנותק מים מופרדת לחלוtin ממערכת מי השטיה. ראה סעיף "החברה למערכת ההמטרה".

אין להרים אדיגן סופר דרך קוו צנורות ראשית אשר מספק מים לגידולים נוספים בין אם הם לפני השטח המכטוף או לאחריו. קצה האזרור שאליו מגיע אדיגן סופר בזמן הטיפול חייב להיות מרווח לפחות 5 מ' מעצים ו-3 מ' מגידולים קיימים אחרים. בעת ההמטרה מנע רוח גבוהים שכנים כי טיפול המכליות תפגע קשה בצמחים קיימים. אין לטפל באדיגן סופר בחממה שיש בה גידול קיימ. באזורי בוים חשוב לבצע חיטוי בהמטרה כאשר נשבת רוח קלה (<5 Km/s) המרחיקת את הטרטיס מכיוון הבתים.

המරחיק הדרוש מבטי מגורים:
אין לבצע חיטוי בישום מכווק במרחיק קטן מ-100 מטר מגורים ו-20 מטר מכבים ראשיים.
בתחום 100-250 מטר מגורים - חובה חיפוי בפלסטיק חוסם חדש בעל תקן ישראלי.
בתחום 250-1000 מטר מגורים - חובה חיפוי ביריעות פלסטי בעובי 35 מילימטר לכל הפחות.
במרחיק 1000 מטר ומעלה - ללא חובת חיפוי.

חיכוםות שהמראק בינויו לבתי מגורים פחות מ-1000 מ' יש לחטא רק כאשר הוא סגורות ביריעות פלסטי לפיה כתוב למקרה במקרה שהחיטוי 48 שעות לאחר החיטוי. כל מבנה שאינו אטום לחלוtin ביריעות פלסטי נחשב לשטח פתוח לחיטוי באמצעות המטרה, אך יש לשמור בו על כל כל הזרות, מוחק מבטים ובמיוחד כיוון עצמת הרוח. אין לחטא שטח פתוח בהמטרה באדיגן סופר כאשר המראק מבטי מגורים פחות מ-1000 מטר ו-100 מטר מכבים ראשיים.

טילוק ירידות:
בתום החיטוי חובה לסליך את ירידות הפלסטי שבמה נעשה שימוש בדעתן החיטוי ולפנותן לאתר פסולת מאושר או למיחוזה בתרדמתה. אדיגן סופר מושפע מכך שטח הנביטה הקימיים בשטח בעת הטיפול ועלול לפגוע גם בעצים ששורשיהם מגיעים לאדמה שמצוי בה חומר תוך 10-20 ימים, בהתאם לטמפרטורת הקרקע, גלם החומר בלבד להשאיר כל שרירות בקרקע.

שיטת החיטוי:
קיים שתי שיטות לחיטוי בתכשיר דרך מערכת המטרה:
1. החדרת אדיגן סופר ברצף - בשיטה זאת מוחדר התכשיר מראשית החיטוי ועד סיום בקצב אחד. השיטה מתאימה לאדםות קלות ובינוניות בעליות חלחול טوب.

2. החדרת אדיגן סופר בשיטה מרוכצת - בשיטה זאת מוחדר התכשיר בקצב אחד ברבע הראשון של השקאת החיטוי, כשאחריה ממשיכים להשקיota במים רגילים. השיטה מתאימה לאדםות בינוניות וכבדות ולאדםות בעליות חלחול איטי במיוחד ירכות. משך החדרת התכשיר לא יפתח משעת'ם.

הכנת הקרקע
שימוש הקרקע ופירור הרגבים הכרחיים להדבירה עילית. רצוי שבעת הטיפול לא ימצאו בקרקע שאריות לא רקבות של צמחים. החיטוי יעשה על קרקע יבשה או לחאה אך לא רטובה מדי. להבטחת עלילות מרבית של הטיפול רצוי שלפחות 5-6 ימים לאחר החיטוי לא ירד גשם. השטח יחווט לאחר שהוכן סופית לזרעה או שתילה, אך שלא יהיה צורך בכל עיבוד נוסף לאחר החיטוי. חשוב למנוע אילוח מחודש של השטח ע"י חוכר ריבוי גגוע, בל אורגני וכל עיבוד. בcliffe ובכל זאת יש צורך בעיבוד סופי, יש לבצע אותו בכל עיבוד נקיים ואין להעניק כדי לא להעלות שכבות מהעומק.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 2008/גה"ץ/1949
• דרגת רעלות 7 - משרור גזם רעלים • מיוצר ע"י טמינקו
• אריזות: 25 ליטר, 100 ליטר, צובר • משוקע ע"י אדמה אגן

אדיגן סופר (הmesh)

טמפרטורה בזמן הטיפול: פעולת החומר טובה ביותר בטמפרטורת קרח של 10-15°C (עומק של 10-15 ס"מ) נמוכה מ-8°C.

מועד הדרייה או השתייה לאחר החיטוי: החל מ-14 ימים לאחר החיטוי ניתן לד्रוע או לשתול בשטח מחושטת את מרבית הגידולים, למעט אבטיח, לבגוי יש להחות 30 ימים. בהורף, עקב הטמפרטורה הנמוכה בקרח, רצוי להימנע מדרייה עד 20 ימים לאחר החיטוי.

חיטוי הקרח לקראת גידול ירקות, פרחים ומטעים

התcsiיר יוחדר דרך מערכת המטרה ("ראה חיבור למערכת המטרה") כאשר המטירים מרטיבים את כל פני השטח בצדקה אחת. החיטוי יעשה על גבי שטח שהוקן ממפורט בסעיף "הכנת הקרח". את התcsiיר צריך להיחד לרשת מערכת המטרה באמצעות שתי השיטות (ברצף או בשיטה מרוכצת). כמות המים הניתנת לשטח מחושטת לשכבות הקרח אותה רצים לחטא אליו התחלנו ממצב של קרח יבשה. מחשבים את ספיקת המטירים לדונם ואת משך הרשיקה המתוכן. יש להתחשב בתנאים אלה בעת התכנון המפורט של מהלך החיטוי.

הערה: מומלץ לפנות למדריכי המחלקה החקלאית כדי לקבל יעוץ והדרכה.

הציד הדרוש לחיטוי קרח דרך מערכת המטרה-הרכבתו והפעלתו

הציד הדרוש לחיטוי קרח דרך מערכת המטרה-הרכבתו והפעלתו: התcsiיר יוחדר למערכת המטרה בעדרת מרסס מוטורי או משאבה מוטורית כלשהי קיימות אפשרויות שונות לחידור אדיגן סופר למערכת המטרה. לפחות הצינור הגמיש שיוצא מהmarses או מהמשאבה, במקומם שיופיעו בלחץ הגוף לפחות ב-2 אטמוספרות מלוח המים בקר. לפחות הצינור הגמיש שיוציא מהmarses או מהמשאבה, במקומם רובה היריסות, מחברים וסת ספיקה עמיד או ווות דזומה. את הוותת מחברים למתקן שבראש המערכת באכזעות חיבור מהיר הנמצא בין שתומי האל-חרוז ומערכת המטרות. רק הוותת המומלצות מבטיבים פועלות חיטוי תקינה.

החברה ע"י "משאבות דישון" - המפעלות ע"י לחץ מים:

לחץ, כל עוד הלחץ מתאים לפועלה התקינה של המכשורות.

2. משאבת ת.מ.ב. - ספיקת משאבה זו משתנה עם שינוי לחץ המים בקר. המשאבה, לכן צריך לכיל אותה באותו לחץ בו יבוצע הטיפול, ולהקפיד על לחץ אחיד במשך כל זמן החיטוי. משאבה זו פועלת היטב כשהלחץ בקר הוא 2.5 אטמוספרות ומעלה. רצוי לפנות ליצרן המשאבה לקבלת הנקודות הפעלה ממפורטות.

3. ניתן להשתמש גם במשאבות חשמליות מתאימות.
- ג. כיו"ל קצב ההחדרה:

בדוק ספיקת משאבות בתכשיר לפני הטיפול על-ידי שאית מ-יבר זטלי המכיל כ-10 ליטרים. החדר מים אלה למערכת ההשקייה בתנאי העבודה המתוכנים. בדוק אם בפועל יש סטייה מהערך הנוכחי ושנה את הוותת אם דרוש.

החיבור למערכת המטרה

אין להיחד אדיגן סופר לקו הראשי המספק מים לגידולים נוספים בין אם הם לפני השטח המטופל או אחריו. התcsiיר יוחדר שירותות לקו' המטירים שעל פני השטח המיועד לחיטוי או לקו' עזר המספק מים-ל-2-3 קו' המטרה סמכים. צנרת המטירות תחבר אל הקו הראשי באמצעות מתקן מיוחד כולל 2 שתומי אל-חרוז ושתומם אוויר תקינים, אחריהם פתח עם מגוף וחיבור מהו, דרך יוחדר האדיגן סופר מהמשקה. לפני השטותים יותקן ברז נוסף אשר מיועד לאספקת מים ונקיים לשטיפת הגוף במקורה תקלת ולמטרות אחרות.

אזורה - בשום פנים אין להיחד את התcsiיר, דרך נקודת חיבור המצויה לפני שתום האל-חרוז הפעיל את מערכת המטרה ומערכת ההחדרה לפני הטיפול רק בזמנים ובבדיקות אם הן פועלות כראוי ואם לחץ במטירים הוא בתחום המומלץ, את הבדיקה הזאת רצוי לבצע בשעות האור ורק כאשר הכל תקין ניתן להתחיל ביחסו התcsiיר.

שלבי הביצוע

- * טוב החיטוי תלוי באחדות המערכת בזמן הרשיקה החיטוי.
- * אדם מפעיל ועומד ליד המתקן במשך כל שעوت הטיפול.

- * למניעת התנדפות התcsiיר, רצוי לא לבצע את הטיפול בטמפרטורה גבוהה מ-32°C.

- * חשב את ספיקת המטירים לדונם ואת משך הרשיקה המתוכן בהתאם לכמות המים הדרושה לקבלת עומק הרטבה מתוכן.

- * הכן את התcsiיר בתוך מכל המרסס או בכל נפרד. דל אותו בזמנים כדי לקבל כמות של תמיisha שתסתפק להזרמה לכל המטירים למשך כל שעות המשטרה.

- * הפעלת מערכת המטרה ומיד לאחר מכן הפעלת המשאה. במשך שעות הטיפול צריך לבדוק مدى פעעם אם המטירים והעיר הנמצא בין שתומי האל-חרוז ומערכת המטרות. רק הוותת המומלצות מבטיבים פועלות חיטוי תקינה.

- * בגמר התcsiיר בכל יכול יש לסגור את מערכת המטרה ולשטווף בזמנים נקיים את המשאה, ראש המערכת והמטירים כדי.

- * מושג קורזיה של חלקו המתוכנן הרגיסטים לתcsiיר.

- * במכורה תקלת יש להפסיק מיד את החיטוי.

מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 2008/גה"ז/1949

- דרגת רעלות ו-7 - משחרר גידם רעלים • מיזר ע"י טמינקו
- אריזות: 25 ליטר, 100 ליטר, צובר • משוקע ע"י אדמה אגן

מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 2008/גה"צ/1949
 • דרגת רעלות 7 - משחרר גזם רעלים • מיוצר ע"י טכיניקו
 • אריזות: 25 ליטר, 1008 ליטר, צובר • משוקע ע"י אדמה אגן

עומק הרטבה (בס"מ)	המינון (ל"ד')	הפגע	הגידול - לפני זרעה, שתילה או נטיעה
20	72 סמ"ק/מ"ר	מחלות שוכנות קרקע משתלות ציפורן)	משתלות ומונבאות קטנות (לא לפני זרעה, שתילה או נטיעה
0.36%	"חיטוי מצעים מנוטקים"	מחלות שונות חיטוי מצעים מנוטקים	פרטים ראה סעיף "חיטוי מצעים מנוטקים"

* בשטח מוחטא באדיגן סופר צריך להקטין את כמות זרعي הבצל ב-20%.

** הטיפול מיועד להדרכת הקישוינות המצויה בקרקע.

*** באדמות חוליות מאוד נא לפנות לייעוץ - למדריכי המחלקה החקלאית.

אדיגן סופר (המשר)

הגידולים, הפגעים והמינונים:

הגידול - לפני זרעה, שתילה או נטעה	הפגע	המינון (ל"ד')	עומק הרטבה (בס"מ)
אבטיה	دورרת	55	60-50
בצל*	שורש ורוד, ריזוגליפוס	36-43	30
תפוח-אדמה	נמטודות-פרטילנוכיס פרטילנוכיס וקישיוניה** פרטילנוכיס ודורה	18 25 38-43	30 30 50
חציל, עגבניה	دورרת קשיון רולפסי	47 36	50 30
מלפפון, מלון, חסה, פלפל, חציל	מחלות חולן נופל וקישיוניה**	25	20-25
אגוז-אדמה***	פיתיום	20-22	30
ציפורי	פוזריום, נמטודות הטרודרה	210	50-60
ס"יפן	פוזריום	108	50
פרחים שונים (חרציות, עדניים, גפסניות, אקוניטום, נץ הלב, דוביום, גרברה, שושן צחור, כלנית, ליאטריס, נורית)	מחלות חולן נופל دورרת וקישיוניה	25 43	25-30 40-50
אבוקדו	دورרת, פיטופטורה	72	60
שנתוע של הדרים, עצי פרי וצמחי נוי	מחלות שוכנות קרקע	108 סמ"ק/מ"ר	50



ADAMA
אדמה

מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 2008/הגה"ץ/1949
• דרגת רעלות 7 - מושחר גזם רעלים • מיוצר ע"י טמינקה
• אריזות: 25 ליטר, 1008 ליטר, צובר • משווה ע"י אדמה אגו

אדיגן סופר (המשר)

חיטוי הקrkע לkrאת שנטוע של הדרים, עצי פרי וצמחים נוי

1. פותח גזומות שדופנותיהן בגובה 15-20 ס"מ, מכלאים אותן חלקית במקומות, מהל אדיגן סופר במים בכינון של 80 סמ"ק/מ"ר הזולף את התרמייה בפיזור אחד על פני המים ומוציאים מים לידי מלוי הגומה.
2. חיטוי באדיגן סופר דרך מערכת המציגים לפני הנטיעה, בכמות מים לכדי הרטבה של 40-50 סמ"ק עומק, התכשיר יוחדר למערכת על-ידי משאבה מוטורית או משאבתת דיזון כמפורט בסעיף "שלבי הביצוע". מנע הגעת התרמייה לאזור בית השורשים של עצים קיימים.

חיטוי מצעים מנוקקים

החיטוי מיועד למצעים למיניהם בכל גידול שונים. חיטוי מצעים מנוקקים באדיגן סופר מיועד לקטילת פטריות קrkע ונמטודות ייצורות עצמאי.

1. רצוי שמצע הגידול יהיה יבש כמו שניתן. לשם יבש מרבי של המצע השאר את הגידול הקודם לא השקיה עד לקמיה מוחלטת.

2. סילוק שרairoות העל קrkיעיות של הגידול הקודם ובמידת האפשר תליהו וסילוק מערכת השורשים הראשית.
3. חיטוי יעל באדיגן סופר מתקבל ע"י הרטבה טובעה של כל נפח מצע הגידול בתמייה החיטוי. המוליכות ההידראולית של מצעים רבים הנה קטנה (טופ גס נקי ועוד). במצבים כאלה יש חשש שגם בעודף גדול של תמייה, לא לקבל הרטבה מושלמת אפילו אם התחלתה נירתה עודפים.

4. החיטוי בוצע בתמייה אדיגן סופר בריכוז 0.36%
5. את היישום מבצעים באמצעות מערכת המטרה, מותדים או טפטוף. חיטוי ערוגות רחבות עדיף לבצע בהמטרה או במתזים. במצבים קיטנים (דלים, שקיות),noch להשקיות את המצע בתמייה אדיגן סופר ע"י מרסס משקן עם צינור ריסוס שבקצתו מחובר ראש מדול.

6. במצבים בהם השכבה העליונה מתיבשת במהירות (כדוגמא: טופ), רצוי לבצע הרטבה של שכבה העליונה עם תמייה אדיגן סופר ברכיך כנ"ל כדי התחברות עם השכבה הרטובה בעבר-2 ימים. אם ניתן, יש לכסות בפולטיין מיד אחרי החיטוי.
7. ניתן לשתול 14 ימים לאחר החיטוי.

8. מומלץ להתקשר אל מדריכי המחלקה החקלאית לשם ייעוץ פרטני.

אורבג'ו ORVEGO

תרכיז ריחוף.

קוטל פטריות למניעת והדברת מחלות כימישון וכשותית בגידולים שונים.

מכיל: L/g 300 g/L + Dimethomorph 225 g/L

כללי:

התכשיר אורבג'ו הוא תערובת של קוטל פטריות חדש (ametoctradin) וקוטל הפטריות הכלילי דימטומורף. התכשיר בעל תכונות הגנטיות, טרנסלכינגריות וסיסטמיות מקומיות. למניעת פיתוח עמידות לתכשיר אין לרוסס יותר מ-3 ריסומים ברציפות באורבג'ו אלא לרוסס מדי פעם גם בחומרים מקבוצות אחרות. אין לרוסס יותר מ-4 פעמים בעונה.



ADAMA

- מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 2015/הגה"ץ/4268
• סיווג FRAC F5: Ametoctradin C8, Dimethomorph • דרגת רעליות IV - מסוכן
• אריזות: 1 ל"ל, 5 ל"ל
• משווה ע"י אדמבה אגן

הgidol	המחלה	hrixos (ב-%)	נפח תרסיס (ל'/ד')	נפח תרסיס (סמ"ק)	הrixos (ב-%)	מעוד אחורי לריסום (ימים לפני אסף)	הערות
תפוח-אדמה	כימישון	100	50-20	50-20	4	החל לטפל בתחלת הנגיעות. מרוסס מידי 7-10 ימים בהתאם לעוצמת המחלה.	
		100	50-20	50-20	5		
	כשותית הבצל	100-80	50-20	50-20	8		
גפן	כשותית הגפן	0.1% או 100 בקצב תרסיס מעל 100 ל'/ד'	לכיסוי מלא של עלולה	לכיסוי	14	יש לרוסס מידי 10-12 ימים בהתאם לעוצמת המחלה.	
	כשותית הדלועים	100-80	50-20	50-20	8		
קישוא, מלפון, מלון							התחל לטפל בתחלת הנגיעות. רוסס מידי 7-10 ימים בהתאם לעוצמת המחלה.

נפח תרסיס: יש לכסות את כל העלואה בתרסיס.

אטמי אקסטרה

מחיר נזול:

קוטל פטריות סיסטמי להדרכת מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה, מטעים, פרחים ותבלינים.

מכיל: L/g 100 Cyproconazole

כללי:

אטמי אקסטרה קוטל פטריות סיסטמי השיר למשפחת הטריאזולים. התכשיט פועל ע"י עיכוב הבiosisינטזה של הארגוסטROLים בפטריות. התכשיר יעל נגד מגוון גודל של מחלות בגידולים רבים.

מועד אחרון לritisוס לפני אסיף (ימים)	הרכיב (%) בritisוס מעל 100 ל/ד'	המינון (סמ"ק/ד') בונפה קטן עד 100 ל/ד'	המחלה	הגידול
3	0.04	40	קמחונית עגבניות(3), חציל(3) (בשדה פתוח בלבד)	
60	0.02		קמחון מנגו	
45	0.03-0.02		תפוח קמחון	
	0.03		גרב	
21	0.02	חולון, קמחון אפרסק, נקטרינה		
21	0.02	חולון שיזף יפני, שיזף אירופאי		
21	0.02	חולון, מוניליה(7), ニムシון (פוליסטיגמה)	שקי	
21	40	חולון אורגנו		
17	40	חולון אדוב מצוי (דעתה) לענה, דרקונית (טרגון)		
	50	חולון היפריקום, לימוניום מין אמילי		



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביברות: 2000/גה"צ/1604
 • מיוצר ע"י G: FRAC G: Syngenta Crop Protection Ag
 • דרגות רעילות AA - מסוכן • שוק ע"י אדמה אgan
 • אריזות: 7,5 ל'

מועד אחרון לritisוס לפני אסיף (ימים)	המינון (סמ"ק/ד') בונפה קטן עד 100 ל/ד'	המחלה	הגידול
40	(1) 50-40	צראקספורה	างוזי אדמה
14	(2) 50	סטמפליום	שומם
	(2) 50-40	חולון	חמניות
30	50 בritisוס 75 בהגעה (5)	חולון	
	30 בritisוס 75 בהגעה (6)	קמחון	חימצה
60	50-25 75 בהגעה (6)	חולון	חיטה
60	40	מיינ' חלונות, עליה, (צחוב, קנה), ספטוריה	

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיטים.

אטמי אקסטרה

ATEMI EXTRA (המשך)

הערות:
אין לישם אטמי אקסטרה בתנאי עקה, (כדוגמא שינויים קיצוניים בטמף לאורך הימכה) אין להשתמש בתמייסת ריסוס בסיסית בעלתük גובה ו/או לרסס בזמן היישום עם תכשירים מווסטי גידול (PGR).

1. מינון נמוך לטיפול מניעה, מינון גובה לטיפול תגובה.
2. המינון הגובה מתייחס לנגיעותBINONIAT-גבואה בשום.
3. בירוקות אין לרסס יותר מweisוס עוקב אחד. אין לרסס כאשר טמפרטורת לילה יורדת מ-15 מעלות.
4. אין לרסס בראשית העונה כאשר הטמפרטורות נמוכות. בקמחון הריכוז לפ' עצמת הנגיעות.
5. יש להזrik אטמי אקסטרה מהול במיל למערכת הטיפטוף, במערכות השקייה מנוטקאות אוויה, לקראת סוף השקייה רגילה, במשך 30-60 דקות. יש להכשיר ולהשקיות עוד כשעה לאחר סיום ההזרקה לשיטיפת המערכת ולפייזר התכשיר בקרקע. בשימוש בהגעה פעילות התכשיר בצמחי מתחילה כשבוע לאחר היישום, אך יש לישם כ-10 ימים לפני מועד מומלץ לריסוס.
6. יש להזrik אטמי אקסטה מהול בכימם למערכת הטיפטוף, במערכות השקייה מנוטקאות אוויה, לקראת סוף השקייה רגילה, במשך 30-60 דקות. יש להכשיר ולהשקיות עוד כשעה לאחר סיום ההזרקה לשיטיפת המערכת ולפייזר התכשיר בקרקע. בשימוש בהגעה פעילות התכשיר בצמחי מתחילה כשבוע לאחר היישום ונמשכת למשך מחודש. יש להקפיד על שימוש מוקדם כשרמת נגיעות נמוכה וכמינון גובה בנגיעות גובה.
7. למניעת מונליה יש לישם ריסוס ראשוני בשלב פקעים ורודים ולאחר מכן לרסס לפני כל אירוע גשם צפוי.

שילובים:

ניתן לשלב אטמי אקסטרה עם התכשירים הבאים, בהתאם למינונים המופיעים בתוויות הארץ שליהם:
אגוזי אדמה – פליקטרן.
עגבניות – טולסטאה, פליקטרן, מוליט, רטימק, אונונט, אטברון, אפלורד, מוספילן, מנקו-די, קליפקן.
חציל – טולסטאה, רטימק, פליקטרן, אפלורד, טיגר.
תפוח – דורוט, רטימק, פליקטרן.
אפרסק – מאבריק, סנסוה, רגוז.
חימצה (בריסוי) – 6 ננו.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביוקרת: 2000/גה"צ/1604
• מיצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag
• ארכ'ז: 1, 5, ל' G: FRAC
• שוק ע"י אדמה אגן
• דרגת רעלות V - מסוכן

_EMENDAMENT

הערות	ימי המנתנה לפנוי קטיפי	NCY המנתנה (ל'י/ד')	נפח תרסיס (ג'/לדונם)	הכינון (ג'/לדונם)	המחלה	הגידול
מרסיטים כטיפול מניעה מדי-7-10 ימים כאשר תנאי מוג האזורי מעודדים את התפתחות המחלה.		עד 60	250	5	כימישן	תפוח-אדמה'
מתחלים לטפל בתחילת הנגיעה. מרסיטים מדי-10-7 ימים בהתאם לעוצמת המחלה.	5	עד 60	200	5	מלפפון	כשותית הדלוועים

גרגרים רחיפים
להדברת המחלות כימישן וכשותית בגידולים שונים
מכיל: WG 60% + mancozeb 6%

כללי:

תערובת של שני חומרים פעלים mancozeb-I-valifenalate. לשני החומרים מנגן פעולה שונה על הפטריה המבטייח פעילות כירובית וארוכת טווח. למשתמש פיתוח עמידות ל-valifenalate, אין לרסס ברכיפות ב- אמדנו M יש לישם חומרים בעלי מנגן פעולה שונה. אין לרסס יותר מ-3 פעמים בעונה.

- מספר הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2022/הגה"צ/4343
 • סיווג FRAc M3 + F5 :
 • דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
 • מיוצר ע"י BELCHIM, BELGIUM
 • אריזות: 5 ק"ג
 • משוק ע"י אדמה אגן בע"מ



225

- מפט' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביבורות: 2015 / הגה"צ/4320
• סיווג FRAC G1-C3 • מינימליזציה III - מסוכן לבריאות
• אריזות: 1 ליטר, 5 ליטר • מושוק ע"י אדמה אגן
• מושוק ע"י ADAMA GOWAN

Emerald NRG

תרcit ריחוף.
קוטל פטריות משולב בעל פעילות פרוטקטנטית וסיסטמית להדברת מחלות שונות בגפן, מטעים וירקות.

מכיל: L/g 80 g/L + Azoxystrobin 100 g/L

הוראות השימוש:

יש לרסס ריסוס או לרסס עם תחילת נגיעות לפ' פירות הגידולים והמחלות הבאים. כדי למנוע התפתחות עמידות לאמרולד אנרג'י יש לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי מנגן פעללה שונה. דאג לכיסוי מלא של עלות הגידול בתמייסת הריסוס.

הקידול	המחלה	המינון או דונם או (%)	נפח התרסיס (ל"ד)	מרקוזו ריסוס ביום*	ימי המתנה עד לקטיף
קיוחון הדלוועים אבטיכון, מלפפון	קיוחון הדלוועים	60	50-20	רישוס אחד לעונה	7
גפן מắcכל, גפן יין	כשותית הגפן	0.06%	עד נגירה	12-7	7
מנגו	קיוחון המנגנו	0.06%	150-100	12-7	70
שדי'	חולdon הגלעינים	0.06%	עד נגירה	רישוס אחד לעונה	21
נקטרינה	קיוחון הגלעינים, חולdon הגלעינים	0.06%	עד נגירה	רישוס אחד לעונה	21
עגבניה	קיוחון הגלעינים	60	50-20	רישוס אחד לעונה	10
גזר	קיוחון הגזר	60	40-20	רישוס אחד לעונה	21

* בהתאם לרמת הנגיעות.

פני השימוש יש לקרוא את ההוראות המופיעות בתווית התכשירים.

224

BRAVO

תרכיז ריחוף.

קוטל פטריות המיעוד להדבאת מחלות צמחים בירקות, גידולי שדה, מטעים, פרחים ותבלינים.

מכל: L/g Chlorothalonil 720 g

כללי:

בראבו 720 הינו קוטל פטריות, מקבוצת Chloronitriles (Phthalonitriles), קבוצה M. התכשיר מיועד למניעה והדבאה של פטריות הגורמות למחלות לצמחים ותרכובות שונות.

הערות	מועד ריסוס אחרון לפני הקטיפה (ימים)	מינון (סמ"ק/ד')	המחלה	הגידול
-	7	250	ספוטוריה, צרקוספוריה	סלרי (כרפס)
-	14	175	חלפת, קימוחן	גזר
-	21	350	סטמפליום	בצל(3)
-	35	(4)200	ספוטוריה	חיטה
רישוס לפני כל אrou גשם	21	(5)150-200	אוקופיטה	חימצה
		200		אפונה ל תעשייה
למשתלות בלבד.	-	200	רמולריה, מרסונינה	תות-שדה
-	-	200	חלפת	צפורה
יש לטפל מהתחלה הפריחה והלאה, לפני כל אrou גשם צפוי.	30	ריכוז 0.15% בנצח	אנטרכונז	שקד
-	21	250	סטמפליום	עירית
-	21	250	כוובהה, שמייר, מנטה	צרקוספוריה, כשותית
-	21	200	בזיל, מרווה, רוזמרין, רוקולה, ptrozilija, קורנית, טרגון	צרקוספוריה, כשותית
3 יישומים בmirוח 7 ימים לפחות לא שילובים	3	חלפת המצליבים	ברוקולי	מלפפון

מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 2005/גהה"ץ/1838
• סיווג FRAC: M5 • דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
• אריזות: 5 ליטר • מיוצר ע"י Syngenta Crop Production Ag • משווה ע"י אדמה אגו



הערות	מועד ריסוס אחרון לפני הקטיפה (ימים)	מינון (סמ"ק/ד')	המחלה	הגידול
טיפול מניעה בmirוח של 7 – 10 ימים.	3	200	כמשון, חlapת, סטמפליום, אקרית חלווה	עגבניות
	12	200	כמשון, חlapת	תפו"א
	(1)(100 + 200)	200		
200 – ביחסם דרך מערכת השקייה בהמטרה, מנוטקת օיר(6)	3	200	כשותית	מלפפון
	3	350	בוטריטיס(2)	
לא יותר מ-4 טיפולים בעונה.	30	200	צרקוספוריה	אגוז-אדמה

בראבו (המשר) BRAVO

3. בסיום ההזרקה, יש להשיקות בכמות מים נוספת כדי לשלוף את כל התכשיר ממערכת ההשקייה. בכך לדעת את הזמן המדויק הנדרש לשיטיפה מלאה של מערכת ההשקייה יש לבצע בדיקה מוקדמת של משך הזמן הנדרש למיים להגעה מנקודות ההזרקה לפחות מערכת ההשקייה: מלא את המיכל במים עם צבע (ברזול 2 ק"ג/ד'), הפעל את מערכת ההשקייה וכאשר המערכת מות'צבת הזרק את התמיisha הצבעה. מודד את משך הזמן עד הגעת המים הצבעים לפחות מערכת ההשקייה. הנסיוון מלמד כי כאשר ראש המערכת ממוקם עד 1 ק"מ מהשדה, הזמן הנדרש לשיטיפת המערכת הוא כ-15 דקות נוספות.

4. יש לחזור על היישום בכל השקייה שנייה, בהפרש של כ- 7 ימים.

שילובים:

תפוח אדמה: אטברון, טלסטה, טריגראד, ורטימק.
גזר: אטברון.
עגבניה: דומארק, טלסטה, גופריתה, טריגראד.
חימצה: קנון 50, טלסטה, פנטרה, דואל גולד.

הערות לטבלה:

1. לדברת מחלת קניינות.

2. מומלץ לרטס בראבו לסרוגים עם תכשיר בעל עילוות ספציפית נגד בוטרייטיס.

3. בכלל לדברת סטטפיילים – לשם קבלת תוצאות טובות, יש לרטס במרסס מפוח גב מוטורי אשרפתח היציאה נמצא בגובה של כ-50 ס"מ מעל לזרק ומכוון אל המטרה הנמצאת במרחק של כ-1.5 מטר ממנו. הריסוס יבוצע בכיוון הלוך ושוב.

4. אין להעלות בעלי חיים למרעה 5 שבועות ממועד הטיפול האחרון בחיטה.

5. המכון הנזכר כשיין נגיונות בשדה, המכון הגובה עם הופעת נגניות.

6. הנחיות לישום בראבו דרך מערכת ההשקייה:

1. **הוראות כלליות לישום דרך מערכת ההשקייה:**
1. יש לישם בראבו דרך מערכת ההשקייה קבועה של ממתרונים או ממטרות.

2. וודא שמערכת ההשקייה מנוטקת מכליות מי שתיה בנזוק אויה. כדי למנוע הגעת תכשיר לחלקות שאין יעד לטיפול, יש לוודא לפני היישום כי הברז בקצה הצינור המחלק לחלקה המטופלת, סגור.

3. כדי לקבל הדבירה טוביה יש להבטיח פיזור אחד של המים ע"י מערכת ההשקייה. הדבירה לקוייה עלולה להיגרם בגל פיזור מים לא אחד, כתוצאה מהעדר חיפויה, ממתרונים עם ספיקות שונות או ממתרונים סתוימים. בשאלות בנושא אחידות הפיזור צור קשר עם יצורן מערכת ההשקייה או עם מערכת הדריכה.

4. בזמן הרזקה התכשיר חייב להיות נוכח בשטח עובד מיוכן בהפעלת המערכת.

5. יש להתקין ברז שסתום שישגור אוטומטית את הכניסה של בראבו לקו ההשקייה במקרה של ירידת לחץ.

6. אין לישם את התכשיר כאשר מהירות הרוח עולה על 2 מ'/שנה.

II. הוראות לישום בראבו דרך מערכת ההשקייה:

1. יש לישם בראבו במהלך חצי השעה האחרונה של ההשקייה או להפעיל את מערכת ההשקייה, בסיום ההשקייה, לחצי שעה נוספת.

2. יישום – יש להזכיר את התמיisha לישום, בסמוך למועד הישום במיכל עם פתח רחב. מלא חצי כמות מים במיכל והכנס את כמות הבראבו הדורשה, לפי 200 סמ"ק/ד'. השלים את כמות המים במיכל וערबב היטב עד לקבלת תמיisha הומוגנית.

יש להציג את כל התמיisha המכונה במשך 30 דקות לפחות לקו ההטירה באמצעות משאבה, כאשר מערכת ההשקייה בלחץ יציב ובפיזור אחד. (יש לבצע כיל המערכת לפני השימוש הראשוני).



מ"ס הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 2005/גה"צ 1838
• סיווג FRAC: M5 • דרגת רעליות III - מסוכן לבリアות
ובפיזור אחד. (יש לבצע כיל המערכת לפני השימוש הראשוני).
Syngenta Crop Production Ag • מיוצר ע"י ליטר • משוק ע"י אדמה אגן

טאצ'יגאן TACHIGAREN

מועד הטיפול	שיטת השימוש	נפח התרסיס	המינון	המחלה	הגידול
טיפול במשתלה: 3 ימים לפני ההוצאה מהמשתלה. במלפפון – רק לאחר בצבוך העליה השניה.	הגעה	כ- 3 ליטר למטר מרובע עד לנגר מצוע הגידול	0.1% ליטר מים (00 סמ"ק ל- 100)	מקמקת (פיטיום)	מלפפון במשתלה
			0.2% ליטר מים (00 סמ"ק ל- 100)		פלפל במשתלה
		0.2% (00 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	פודרים (ריקבול הכתה)	עגבניות - מייעד לשתלים שיישתלו בשטח מחוטא נגד המחלה	

שילובים:
אין מידע לגבי שימושים.

騰龍 פטריות סיסטמי למניעת מחלות קרחן פיתויים במלפפון ובפלפל וריקבול הכתה בעגבניה

מיכל: 300 g / g Hymexazol

מחיר נזול:

קוטל פטריות סיסטמי למניעת נגיעות פטריות שכנות קרחן פיתויים ופוזרים. טאצ'יגאן ניתן טיפול כונע לפני השתייה ולפני אילוח השטילים בגורמי המחלת. הטיפול בטאצ'יגאן גורם לעיתים לעידוד צימוח הנוף והשורשים.

מצע הגידול:
ניתן להשתמש בטאצ'יגאן בקרחן או במצבים כגון תערובת של כבול או חומרים אורגניים אחרים יחד עם פרלייט, ורמייקוליט או חומרים אינרגטיים אחרים.
אין להשתמש בתכשיר במצע פרלייט נקי עקב עיילות לא מספקת.

הוראות השימוש:
הטיפול בטאצ'יגאן אינו מבטל את הצורך לנוקוט אמצעים אחרים כגון מחזר זרעים, סנטציה, חיטוי קרחן לשמרות ניקיון השטח המיועד לשתייה מכחלות קרחן.
את הטיפול בטאצ'יגאן ברטיסוי או זילוף בשלב המשטלה לפני ההשקייה ולאחר קר משקם קלות לשטיפת החומר מהעלים.



מס' הרשון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2001/גה"ץ/1651

- דרגת רעלות A3 – FRAC
- א麗ות: 1,5 ל'
- מושוק ע"י אדמה אגן
- מיוצר ע"י INC, AGRO, MITSUI CHEMICALS

נחוותן NECHOSHTAN

הערות	ימי המטנה לפני הקיטיף	הרכיב (%) או המינון (ל"ד)	המחלה	הגידול
יש להתחל לטפל לפני הופעת המחללה.	7	0.3%	עין טוויס	זית
אם יורד 150-200 מ"מ גשם, מומלץ לחזור על הטיפול.	7	0.3%	רקבון חום (פיטפטורה)	הדרים
ראיה העורות לטיפול כליליות + בתפוחי אדמה הנוחה לשימוש ובטוחה למשתמש.	7	300 סמ"ק/ד'	כימישון	תפוח אדמה, עגבניה
הערות לטיפול כללי:				
רסס טיפולי מנעה. יש לרסס במרווח של 7-14 ימים. דג לכיסוי מלא של עלות הגידול. כדי למנוע פיתוח עמידות לתכשיה, יש לכלול בלוח ההדבירה תכשירים בעלי מגנן פעללה אחרת. במקרה של נגיעה עם גזעים עמידים לתכשיה, יש לטפל בתכשירים בעלי מגנן פעללה אחרת. אין לרעוט בשטח פחות משלושה שבועות מהרישוט האחרון. אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע או מנזק מקטלי עשבים ועוד. אין לרסס בזמן שיש רוח. מנע למנוע רוח לגודלים שכנים.	0.3%	כשותית הגוף גפן	7	
רסס טיפולי מנעה. יש לרסס במרווח של 7-14 ימים. דג לכיסוי מלא של עלות הגידול. כדי למנוע פיתוח עמידות לתכשיה, יש לכלול בלוח ההדבירה תכשירים בעלי מגנן פעללה אחרת. במקרה של נגיעה עם גזעים עמידים לתכשירה, יש לטפל בתכשירים בעלי מגנן פעללה אחרת. אין לרעוט בשטח פחות משלושה שבועות מהרישוט האחרון. אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע או מנזק מקטלי עשבים ועוד. אין לרסס בזמן שיש רוח. מנع למנוע רוח לגודלים שכנים.	0.3%	סלסול עלים אפרסק / נקטרינה	7	
הרישוט בזמן הפריחה אגס	0.1%	חריכון אגס	ריסוס עד נגירה. ריסוס עד נגירה. התחל לטפל לפני הופעת המחללה.	7
ריסוס עד נגירה.	0.25%	השחרת חידקית מגנו		

שילובים:

שילובים לחקלאות קוגניציונית : באגס ניתן לשלב עם סטרנור, בתפוח אדמה ניתן לשלב עם נימאגרד. קרובות או על ספיקת תפוח אדמה.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2013/גהה"צ/4134

מס' הרישון לחקלאות ארגנטית: 2013/גהה"צ/7462

- סיווג FRAC 1/2 M
- דרגת רעליות - מסוכן NUFARM
- מיזור ע"י MARM
- מושוק ע"י אדמה אגן
- אריזות: 5 ליטר

תרcit ריחוף.
נחוותן הוא קוטל פטריות בעל פעילות פרוטקטנטית למניעת מחלות בגידולים שונים. התכשיר יעל בטיפול מנעה בלבד והוא מדבר מחלת קיימת. התכשיר מופיע בתוארי תרכיז ריחוף מכיל: (Copper 190 g/L, (as 340 g/L tribasic sulfate).

Copper 190 g/L, (as 340 g/L tribasic sulfate).

בתפוחי אדמה:
נפח התרסיס לא פחת מ- 20 ליטר לדונם. מרוחב בין הריסוטים עד 7 ימים. קוצר את מרוחב הריסוט כאשר יש גשם, טל או קרותות שיכולים לעודד את התפתחות המחללה או כאשר מגדלים זנים רגישים למחללה, או כאשר יש מחלת קיימת בחלוקת קרובות או על ספיקת תפוח אדמה.

נפח התרסיס לא פחת מ- 20 ליטר לדונם. מרוחב בין הריסוטים עד 7 ימים. קוצר את מרוחב הריסוט כאשר יש גשם, טל או

FANTIC A

גרגירים רחיפים.

קוטל פטריות בעל פעילות פרוטקטנטית וסיסטמית להדרכת כימשו בתפקיד אדמה ועגבניה וכשותית בגפן.

מכיל:

Metallic Copper 15% (as copper oxychloride)

Metallic Copper 15% (as copper hydroxide)

Benalaxy-M 5%

כלל:

פנטיק A – תערובת של 3 חומרים פעילים בתוארי מתקדמת Benalaxy בעלת תכונות סיסטמיות החודר במהירות לתוך העלווה ומתרפז באחדות ונע עם מערכת ההובלה אל האברים הרגיסטים למחלקה Metallic Copper – שילוב של שני נחותות פעילות (hydroxide | hydroxide) המבטייח פעילות מהירה וארוכת טווח ע"י שחרור מולקולות פעילות ליעילות מרבית.

טיפול האחרון לפני הקטיף (ימין)	נפח תרסיס	המינון (ג'/דונם)	המחלה	הגידול
3	70-100	240	כשותית הגוף	גוף
רישוי עדין לא הושלם		עגבניה		
		תפוא'		
		בצל		



מ"מ' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 2017/גהה"ץ/4478

- סיווג FRAC C2 : מסוכן
- דרגת רעליות IV - מסוכן
- מיוצר ע"י LAINCO
- אריזות: 20 ליטר
- משוק ע"י אדמה אגן

חוליב שמן במים.

קוטל פטריות בעל פעילות טרנסלמינרית להדברת מחלות קימוחן וקימוחנית בגידולים שונים.

Cyflufenamid 50 g/L

מכיל: L/g 50 ריסוסי מנעה או לרסס בהתחלה הנגיעות ולפני התעצמותה לפני הפירות בהמשך. אין לרסס יותר מפעמיים בכל עונת גידול. בימיון אבטיח, מלון, דלעת, דלורית, מלפפון, קישוא

טבלת שימוש:

הערה	ימי המתנה עד הקטיף	מרוחוי ריסוס במים	נפח התרסיס (ל'/ד')	המינון	המחלה	הגידול
למניעה התפתחות תנודות לנץ, לשאיב כל טיפול שבית במיןון המורשה לגידול.	3	7	30-100 בההתאם לגודל הצמחים	20 סמ"ק/ד'	קימוחנית חכילה, עגבניות, פלפל	
	3	7	30-100 בההתאם לגודל הצמחים	20 סמ"ק/ד'	קימוחן הדלועים אבטיח, מלון, דלעת, דלורית, מלפפון, קישוא	
	18	14-10 בהתאם לעוצמת הנגיעות	100-150 בההתאם לגודל הגנים	0.01% (10 סמ"ק - 100 ל' מים)	קימוחן הגפן גפן	
	5	14-10 בהתאם לעוצמת הנגיעות	150-100 בהתאם לגודל העצים	0.02% (20 סמ"ק - 100 ל' מים)	קימוחן התפוח תפוח	

הערות:

גוף שיורד שעה אחת לאחר הריסוס לא יפגום ביעילות הריסוס.

שילובים:

ניתן לשאיב נץ + שביט עם מוספילן לריסוס באבטיח.
לפני ריסוס בכל שילוב אחר בדוק את בטיחותו על מספר מצומצם של צמחים.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 1836/גהה"צ/2005
סיווג FRAC: חדש
דרגת רעלות: IV - מסוכן
מייצר: Nippon Soda
שיווק: ע"י ADAMA אגן

סוויץ'

גרכירים רחביים.
קוטל פטריות - להדרכת מחלות בגידול מטע, ירקות, תבלינים, פרחים, גפן וצמחים נוי.

הערות	טיפול האחורי רון לפני הקטיף (ימים)	ריסוס בנפח נמוך		בריסוס לגירה (%) 70 ל/ד' ומעלה)	המחלה	הגידול
		נפח התרסיס (ל'/ד')	המיןון (ג'/ד')			
יש לרסס עם גילוי כתמי המחלה הראשוניים.	7	50-20	60	-	קיושינה גודלה	גזר
אין לרסס מעל 3 ריסוסים סוויז' הינו יכול פטריות להדרכת פטריות, המכיל שני חומרים מקבוצות כימיות שונות, ובעל מגנון פעולה שונה. Cyprodinil 25% + Fludioxonil 37.5% + Fludioxonil 37.5%	7	70-40 לפי גודל הנוף	60	-	עובש אפור (בוטריטיס) קיושינה גודלה	חצץ
הרטיסום בכרם ימנע התפתחות בוטריטיס לאחר הקטיף באחסון ובמשאות. מועד הריסוס: 3 שבועות לפני הבציר.	14	70	100	0.1% (100 גרם ל-100 ליטר מים)	עובש אפור (בוטריטיס) עובש שחור (אספריגילוס) ריקבון מיימי (ריזופוס)	גפן
יש לרסס 2-3 שבועות לפני מועד הקטיף המשוער.	14	200	-	0.1%	ריקבון מיימי (ריזופוס), ריקבון חום (מוניליה)	אפרסקן, נקטרינה
			-	0.1%	ריקבון מיימי (ריזופוס)	משמש, שדי'



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 2006/ הגה"ץ/1431
 דרגת רעלות V - מסוכן FRAC E2+D1
 ארצות: 5.5 ג"ג, 5 ג"ג
 מושוק ע"י אדמה אגן
 Syngenta Crop Protection Ag

הערות	טיפול האחורי לפני הקטיף (ימים)	ריסוס בנפח נמוך		בריסוס לגירה (%) 70 ל/ד' ומעלה)	המחלה	הגידול
		נפח התרסיס (ל'/ד')	המיןון (ג'/ד')			
אין לרסס מעל 3 ריסוסים לעונה. יש להחליף עם חומרים מקבוצות. ולדאוג לכיסוי טוב של הצמחים.	3	50-20	100	-	עובש אפור (בוטריטיס) ריקבון מיימי (ריזופוס)	תות שדה
אין לרסס מעל 2 ריסוסים בעונה כאשר בין ריסוס לריסוס – 14 ימים לפחות.	4	70-100 לפי גודל הנוף	-	0.06% (60 גרם ל-100 ליטר מים)	עובש אפור (בוטריטיס)	עגבניה פלפל
	7		-	0.06% (60 גרם ל-100 ליטר מים)	עובש אפור (בוטריטיס) קיושינה גודלה	מלפפון, קישוא

סוויץ' (המשר) SWITCH

הערות	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)	ריסוס בנפח נמוך נפח התרסיס (ל'/ד')	המחלה	הגידול	הሪיכוד (%) לנגירה ל-70 ל/ד' ומנלה (ג/ד')		
					הminsו (ל/ד')	הminsו (ג/ד')	
אין לרוסס ברציפות. יש לרוסס לסוגין עם חומרים אחרים.	-	100-70 ---	100 ---	עובש אפור (בוטריטיס) 0.2% גרם 200 (ל-100 ליטר מים)	עובש אפור (בוטריטיס) 0.2% גרם 200 (ל-100 ליטר מים)	וווד (בחמכה) אחר קטיף	
-	-	לנגירה	-	0.1% (100 גרם ל-100 ליטר מים)	עובש אפור (בוטריטיס) 0.1%	צמחי נוי (1)	
יש לרוסס מיד שבוע בתקופת הפריחה, (2 ריסוסים).	-	100	-	0.1% ריקבון עוקץ	ריקבון עוקץ	מנגו	
מועד הריסוס להדברת הנגע הםicia שייא פריחה ושבוע משיא פריחה. לצורך הדברת הנגע רצוי להשתמש במקובבת הטיפולים בתכשירים הפעולים על מנגן הדברה שונה.	רישוס עד לחנטה	70-150	-	0.08% ботриוספירה	ботриוספירה	אבקדו	



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 2006/גה"ץ/1431
 דרגת רעלות V - מסוכן FRAC E1+E2 סיווג:
 Syngenta Crop Protection Ag מיצר ע"י: 5.5 ג"ג א"ג
 מושוק ע"י: אדמה אג

הערות	טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)	ריסוס בנפח נמוך נפח התרסיס (ל'/ד')	הminsו (ל/ד' ומעז לה)	המחלה	הגידול	הሪיכוד (%) לנגירה ל-70 ל/ד' ומנלה (ג/ד')	
						הminsו (ל/ד')	הminsו (ג/ד')
יש לרוסס 2-3 שבועות לפני מועד המשועה.	14	200	-	עובש אפור (בוטריטיס) רקבון מיידי (רידזופין)	דובדבן	0.1%	
יש לרוסס מיד לאחר הגיזום. הריסוס מכונן לגדים.	7	50-30	60	עובש אפור (בוטריטיס) קיונה גדולה	ריחן (בזיל)	-	
הריסוס יעל רק כגד הדבוקות נורף.	-	50-20	60	עובש אפור (בוטריטיס) קיונה גדולה	מגלת הריחן (פוזרינים)	0.1% (100 גרם ל-100 ליטר מים)	
-	14	50-20	60	רקבון, טרגון, קורונית, רוזמרין, כוסברה, פטרוזיליה, שכיר	רקביה, עירית, בצל ירוק		

סוויץ' (המשר) SWITCH

1. אמןן ותמה, בשמת, גזניה, כרוב נוי, פיטונה, סללי כוף, צפרני חתול, חריצית נוי, לוע ארי, עדעד, ינקה, אגרטום, בת חן, סבון מכסיף, אוזן הדב, תורמוס, מנתר, נמזהה, פלאקף, לבליה, רגלה הגינה-NEY, קיסופ, פילאה, פסאדרונטימום, אירטינה, רלקפות, פוקסיה, נמטנטואס, שעונית דזהלת, למיאם, היפודרטה. אין לרוסס בסוויץ' ב班车ת מכלואים, ביגניה מבrikha, פפרומיה דזהלת ופפרומיה שחורה.
2. ודים בזינים: אירופה, אסלאם, איסיאנה, ביאנקה, ברקרול, בריגיט, גבריאלה, דרים, חרדו, קרמן, מרצדט, סוביניה, פקי, פרופיטה, פרסקו, רודהנו.
3. נבדקו בשטח פתוח.

שילובים:

ניתן לשלב סוויץ' עם אופיר ת"ש, ורטימק ת"מ, סקור ת"מ, רידומיל גולד MZ ג"ר עם אקרובוט ג"ה. בגן ניתן לשלב סוויץ' עם דורסן, דור און ת"מ, טיטאן ת"מ ועם רידומיל MZ ג"ה בכל מקרה של שילוב עם חומר נוסף יש להמיס תחילת את סוויץ' ורק אח"כ את החומר הנוסף.

הידול	המחלה	הrixos בריסוס לנגירה 70 ל/די (ומעליה)	הrixos בナンך נמוֹר (ג'י'ד')	טיפול לפני הקטיפ (ימים)	הערות	ריסוס בナンך נמוֹר (ג'י'ד')	
						נפח התרסיס (ל'י/די)	המינון (ג'י'ד')
חסה	קשינה גדולה	עובד אפור (ботריטיס)	50-30	60	-	7	-
גרבירה (בתוכמה)	עובד אפור (ботריטיס)	יש להחליף עם תכשירים מקבוצת אחרות.	50-30	100	-	-	-
גרבירה (רישום אחר קטיף)	רישום אחר	15% (10-15 ליטר מים)	-	-	-	-	-
אסטר, קלנית	קשינה גדולה	מרוססים בעונת העורף (דצמבר-פברואר) מד' 7-10 ימים עם הופעת המחלה. אך לא יותר מד' 3 ריסוסים בעונה.	70-50	60	-	-	-
לייזאנטס, היפריקום	עובד אפור (ботריטיס)	בליזיאנטס, יש להקפיד לכסות בתרסיס גם את צוואר השורש.	50-30	100	0.1% (100-100 ליטר מים)	-	-

- מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 1431/2006/גה"ץ/1431
- סיווג C1+E2:FRAC-D1 • דרגת רעלות IV - מסוכן Syngenta Crop Protection Ag
 - אריזות: 1ק"ג, 5ק"ג • מייצר ע"י אדמתה אגן • משוק ע"י אדמתה אגן



SUPERKOP

טבלת השימוש: הערה: יש לטפל לפני הופעת המחלה.

טיפול האחרון לפני הקטיף (ימין)	הערות ונפח התרסיס	המחללה	הגידול	המינון (ק"ג לדונם או ריכוז)
7	dag לכיסוי מלא של העלווה, להשתמש בנפח תרסיס בין 200-100 ל"ד.	עין טוווס	זית	0.2%
7	אם יורד 200 מ"מ גשם, מומלץ לחזור על הטיפול. יש לרסס את העלווה כויהר��ע ועד מטר מעל פנים הקרקע בנפח תרסיס בין 200-100 ל"ד.	ריקבון חום	הדרים	0.2%
7	רסס טיפול מניעה. יש לרסס במרווח של 7-14 ימים. מכךרים את מרוחת הריסוס כאשר יש גשם, טל או לחות שיכולים לעודד את התפתחות המחללה או כאשר מגדים זנים רגשים למחללה, או כאשר יש מחללה קיימת בחלקות קרובות או על ספיחת תפוח אדמה.	השחורה ח"דית	מנגו	0.1%
7	dag לכיסוי מלא של העלווה בתרסיס. מומלץ לרסס עם מרסס מפוח.	נקיוד ח"ד	עגבניות	0.2 ק"ג/ד'

שילובים:
אין מידע על שימושים.

גיגרים רחיפים. קוטל פטריות וחידקים בעל פעילות פרוטקטנטית למניעת מחלות בגידולים שונים. התכשיר יעל בטיפול מנעה בלבד ואין מדובר מחלת קיימת.

התכשיר הוא תערובת של 2 נחותות להגברת הייעולות והבטיחות. מנגן הפעולה ובאתר: כונע נביטת הפטריה, משבש מגנון הנשימה, מעכב סינטזת חלבונים ומפחית את חידרות ממברנת התא.

הערות לטיפול: Metallic Copper 22.8% + copper hydroxide 23.8% (as copper oxychloride 23.8%)

על הסבירות הנמוכה להתפתחות עמידות לנחותת מומלץ, לכלול בלוח ההדבירה תכשירים בעלי מנגן פעולה שונה. אין לרסס בתנאי מזג אוויר קצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתחום עקה כגון יבש, חום או סובב מנזקי קרה, מחסור אוורור קרקע או מנזק מקוטלי עשבים ועוד. אין לרסס בזמן שיש רוח. יש למנוע רוח לגידולים שכנים.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 4252/גה"צ/2020

מס' הרישון לחקלאות ארגנית: 7505

- דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
- מיצר ע"י חברת GOWAN FRAC M1/2: סיווג
- ארידות: 5 ק"ג
- משוק ע"י אדמה אגן

STARNER

אבקה רטיבה להדבורה מחלת החירICON באגס, תפוח, חbos ושסק.

מכיל: 20% Oxolinic acid

הוראות השימוש:
באגס, תפוח, חbos

היריסותים יבוצעו רק במהלך הפריחה. כוудי הריסותים ייקבעו על פי התאמת תנאי הסביבה
להדבוקה, בהתאם לשנות ההדרכה והמקצוע.

הgidol	המחלה	הרכיב	נפח התרסיס
אגס, תפוח, חbos	חירICON	0.2-0.15%*	100-150 ל"ד/ל' לפי גודל העצים.

בשסק

הgidol	המחלה	הרכיב	נפח התרסיס
שסק**	חירICON	0.2-0.15%*	100-150 ל"ד/ל' לפי גודל העצים.

הערות:

*הכימין הגבואה ישם בנסיבות בהם הייתה נזקע עונת הקודמת.

**טיפול ראשון יש לבצע מתחילה הפריחה ולהמשיך בטיפולים סדריים בהתאם להתקפות הפריחה ותנאי מזג האוויר.

שילובים:

ניתן לשלב את הסטרנר עם רוב התכשירים להדבורה גרב וקימchan. אין לשלב עם תכשיריו גופרית. לא נבדקו שילובים עם קוטלי חרקים. ניתן לשלב עם נחשתן באגס.



אדמה

מ"ר הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 96/הנה"ץ/1383
• סיווג: A4:FRAC
• מיזכר ע"י: חברות FRAC - מסוכן
Sumitomo Chemicals
• אריזות: 1 ק"ג
• משוק ע"י: אדמה אגן

STRUOBY

גריגרים רחיפים.

קוטל פטריות להדברת מחלות הגרב והקימוחן בתפוח ומחלת הקימוחן בנקטרינה, אפרסק, גפן, מנגו, תות שדה, דלוועים ופרחים.

**Kresoxim-methyl 50%
כללי:**

STRUOBY הנו קוטל פטריות מכבצת הסטרובילורינים שמוקרים מחומרם טבעי. התכשיר קוטל את הפטריה ע"י עיכוב תהליכי הנשימה. STRUOBY קוטל את קורי הפטריה ומונע יצירת נבגים וכן מניע נביית הנבגים, התכשיר פועל כמונע וכמרפא.

STRUOBY בעל פעילות טרנסלמיינרית חזקה במחיות עללה. התכשיר אינו רעיל לדבורים. כדי למנוע עמידות הפטריה לSTRUOBY, יש לכלול בלח הדבירה תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה. אין לטפל יותר מפעמים ברציפות בתכשיר STRUOBY. בגידולים בהם מטפלים מספר רב של פעמים בהדבירה קימוחן כמו דלוועים, פרחים, תות שדה –

אין לטפל בתכשיר זה יותר מפעם אחת ולאחר מכן יש לעبور ל- 2 טיפולים בתכשירים שונים עם מנגנון פעולה לפני שחוזרים פעם נוספת לSTRUOBY (וחוזר חלילה). כמו כן מומלץ לשימוש ראשוני ראשון ונגד קימוחן בגדיל לא יעשה בסSTRUOBY אלא בתכשיר עם מנגנון פעולה שונה. במקורה של גליו או חרד לעמידות לתכשיר בחלוקת או בחלקות סמכות אין להשתמש בסSTRUOBY ובSTRUOBY לורינום אחרים להדברת המחלה. אם יורד גשם מיד לאחר הריסוס בכמות ועוצמה העולמים לשטוף את התכשיר, יש לחזור על הטיפול לאחר הפסקת הגוף.

ימי המתנה עד לקטיף	רוחוי ריסוס בימים	נפח התרסיס	המיןון	המחלה	הגידול
21	10 - 20 (בהתאם לעוצמת הנגיעה)	100 - 150 ל"ד/הgodol הפנים	0.02% (20 גר' - 100 ליטר מים)	קימוחן הגוף	גפן
-	14	100 - 150 ל"ד/הgodol העצים	0.015% (15 גר' - 100 ליטר מים)	קימוחן המנגה	מנגו
120	"נתנו 2 ריסוסים, הראשון בגמר נשיר החנותים והשני לאחר כשבועיים"	כיסוי מלא	0.02% (20 גר' - 100 ליטר מים)	תסמיון כתמי- החלפת שחורים (אלטנרייה)	אפרסיכון
3	7	30 - 50 ל"ד/הgodol הצמחים	20 ג"ד'	קימוחן תות- השדה	תות- שדה
14	7-14 (בהתאם לעוצמת הנגיעה)	15-40 ל"ד'	20 ג"ד'	קימוחן הגדר	גדר
3	7	30 - 100 ל"ד/הgodol הצמחים	20 ג"ד'	קימוחן הדלוועים	ابتיח, מלון, מלפפון, קישוא
		בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד'	0.02%		
-	7	100 - 150 ל"ד'	0.02% (20 גר' - 100 ליטר מים)	קימוחן הוורד	ורד (1)
-	7	40 - 100 ל"ד'	20 ג"ד'	קימוחן גפסנית, סולידגו, אסטורה(2)	
		100 ל"ד/הgodol ומעלה	0.02% (20 גר' - 100 ליטר מים)		

מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 96 /גה"ז/ 1406
 • סיווג: C3:FRAC • דרגת רעלות 7A - מסוכן BASF
 • אריזות: 500 גרם • משוקן ע"י אדמה אgan



הגידול	המחלה	המיןון	נפח התרסיס	רוחוי ריסוס בימים	ימי המתנה עד לקטיף
תפוח	גרב התפוח, קימוחן התפוח	150 - 100 ל"ד/הgodol לגודל העצים	10-14 (בהתאם לעוצמת הנגיעה)	35	
נקטרינה, אפרסק	קימוחן האפרסק והמשמש	0.015% (15-100 ליטר מים)		14	
שדי, משמש, שקד	חילdon הגרעינים		14-20 (בהתאם לעוצמת הנגיעה)		

STRUOBY

(המשר)

הערות:

(1) בورد התכשיר נבדק ונמצא בטוח בזנים: גבריאלה, אמביינס, כרמליה, למבדה, פרופיטה, קווקו, יגואר, ספיה, מרצדס, פירוסט-רד, פרסלן.

(2) בסולידגו התכשיר נבדק ונמצא בטוח בזן: טרה. באSTER התכשיר נבדק ונמצא בטוח בזנים: סגול, סאן ריאו, קזבלנקה, סאן גל. בגיפסנית התכשיר נבדק ונמצא בטוח בזן פרפקטה.

לפני השימוש בזנים אחרים מומלץ לבדוק תחיליה על מספר מצומצם של צמחים.


שילובים:

בגפן ניתן לשלב עם דורבן.

במלפפון - ניתן לשלב עם פולירום DF.

באבטיח - ניתן לשלב עם מוליט.

לפני ריסוס בכל שימוש את בטיחותו על מספר מצומצם של צמחים.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביבורת: 96 / הגד"צ / 1406
• סיווג C3:FRAC • דרגת רעלות IV - מסוכן
• אריזות: 500 גרם • מיוצר ע"י BASF
• משוק ע"י אדמה אגן

SIGNUM

גנרים רחיפים.

קווטל פטריות מושלב בעל פעילות פרוטקטנטית וסיסטמית להדברת מחלות שונות בירקות, גידולי שדה, הדרים, כרמ, פרחים ותבלינים.

Pyraclostrobin 6.7% + Boscalid 26.7%

הוראות שימוש:

רסס ריסוסי מנעה או רסס עם תחילת נגיעה לפירות הגידולים והמחלות הבאים. כדי למנוע התפתחות עמידות לSIGNUM צריך לכלול בלוח ההדבירה תכשירים בעלי מגנון פעולה שונה (ראה פירוט בהמשך).

רעילות לדבוריים:

סיגנים אינם רעל לדבוריים.

ימי המנתה עד לקטיף	רוחוי ריסוס בימים	נפח התרסיס (ל'/ד')	המינון (גרם/دونם) או ריכוז (%)	המחלה	הgidol
3	7	70-30	75	קימוחנית, עובש אפור (בוטרייטיס)	פלפל, חצ'יל
3	7	40-10	50	קימוחן הדלוועים, כשותית הדלוועים	מלון
28	אין להתייחס לטיפול כתחליף לחיטוי הקרקע. מועד טיפול ראשון: 3 שבועות לאחר שתילה. טיפול עוקב: 2-3 שבועות לאחר סיכון.	בהתגובה	150	התמוטטות פתאומית (מוניוספוראסקסו)	
3	7	40-10	50	קימוחן הדלוועים, חלפת אבטיח	
3	7	40-10	50	קימוחן הדלוועים כישואו, דלעת, דלורית	
3	7	40-10	75	קשינה גדולה, עובש אפור (בוטרייטיס)	גזר



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביברות: 3/2003/גהה"צ/1723

- סיווג C2+C3: FRAC
- דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
- מיוצר ע"י BASF
- אריזות: 0.5 ק"ג, 5 ק"ג
- שיווק ע"י אדמה אגן

ימי המנתה עד לקטיף	רוחוי ריסוס בימים	נפח התרסיס (ל'/ד')	המינון (גרם/دونם) או ריכוז (%)	המחלה	הgidol
30	14	40-10	40	כתמי חלפת (אלטרנaria)	គותנה
	ניתן לשימוש פעמי שניה, כחודש לאחר ההצחה אחיד בפס הדזינה		300	קיישין הבטטה (מקורופומינה)	
14	7	40-10	40	חלפת הגזר, קימוחן הגזר	תפוח אדמה
24	(1) 14 – 7	40-10	40	חלפת מנקדת	
6	7	100-30	75	קימוחנית, עובש עלים, עובש אפור (בוטרייטיס)	עגבניות

לפני השימוש יש לקרוא את הנחיות המכופיעות בתווית התכשירים.

SIGNUM (המשר) סיגנום

הגידול	המחלה	נפח התרסיס (ל'/'ד')	רוחוי ריסוס בימים	ימי המתנה עד לקטיף
50	כשותית	10-40	14-7	14
	קייחון	70		
0.05%	כתמי חלפת (אלטרנרייה)	400 – 300	14	40
0.05%	קייחון התפוח	200-100	(1)10-14	14
0.075% 0.025% 0.15% 0.1%	כשותית הגוף קייחון הגוף עובש שחור (אספריגלויס) ריבון מימי (ריזופוים)	150 – 100	(1)10-14	6
0.05% לייטרים	עד נגירה	עד נגירה	יונטו 2 רישומים, הראשון בגמר נשירת החנתנים והשטי לאחר - שבועיים	120

(1) בהתאם לרמת הנגיעות (2) מכון הנכוון למניעה (3) בזנים רגילים לא פחות מ-50



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 3/2003/גהה"צ/1723

- סיווג FRAC C2+C3: דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
- מיוצר ע"י BASF חברת
- אריזות: 0.5 ק"ג, 5 ק"ג
- שוק ע"י אדמה אגן

הגידול	המחלה	נפח התרסיס (ל'/'ד')	רוחוי ריסוס בימים	ימי המתנה עד לקטיף
גביעול זב (דיימלה)	גבעול	0.05 גרם/שתייל	7	2
כתמי אסקוכיטה	חמצה,	(3)(2)40-50	40-10	14
קימחו תות-השדה עובדש אפור (בוטריטיס)	תות-שדה	50	70-30	4
מק-שורש (רידוקסונה)	תפוח	100	ריסוס על הפקעות ובתלים הזרעה במהלך הזרעה	-
רקבון מימי (רידזופוים) באחסן	בטטה	0.1%	טבילה מיד לאחר אויף	-
כשותית הבצל, כימישון השקעים (סטמפלויום)	בצל	50	40-10	14-7
כימישון השקעים (סטמפלויום), חוליכון הבצל והשומן	שומן	50 (2) 50-100	40-10	14-7
כתמת (צראקוספורה)	כרפס	50	40-10	14-7
כימישון השקעים (סטמפלויום)	עירית	50	40-10	14

סיגנוּם (המשר) SIGNUM

מונעת עמידות:
כדי למנוע עמידות הפטריה לסיגנוּם, יש לכלול בלוח ההדבירה תכשירים בעלי מגנן פעולה שונה.
משטר ריסויים בסיגנוּם למניעת עמידות, לפי גידול: **כותנה** – עד 3 ריסויים בעונה; **גזר** – עד 3 ריסויים בעונה, אך לא יותר מ- 2 ריסויים רצופים; **עגבניה, פלפל, חציל, דלועיים, תפוח אדמה, תפוח שדה, שום, עירית, שקד, אפרסק/נקטרינה,**

תפוח, בצל – עד 3 ריסויים (לא רצופים) בעונה.
חמצה, הדרים, אפרסקון, גפן, פרחים – לא יותר מ- 2 ריסויים רצופים.
מלון ומילפפון בהגעה – לא יותר מ- 2 טיפולים רצופים.

שילובים:
בכוטנה ניתן לשלב עם מוספילן.
באבטיח ניתן לשלב עם מוספילן, ספידר, שמן וירותה, שמן אולטרפיין ושמן SML.
במלון וקישוא ניתן לשלב עם מוספילן.
בחמצה ניתן לשלב עם דואל גולד, ליופרד, חץ, פוקויס אולטריא.
בעגבניה ופלפל ניתן לשלב עם מוספילן, ספידר, אקרימטראין, פרקלילים, מז'.
בחציל ניתן לשלב עם, מוספילן, אקרימטראין, ספידר.
בתפוא"ד ניתן לשלב עם רטימק, פגסוס, ראנר, מאטברון וטלסטארא.
בכוסברה, שמיר, פטוזיליה, רוקולה, ריחן (בזיל), מנתה, מרווה, קורנית, טרגון ניתן לשלב עם מוספילן לריסוטו.

הgidol	המחלה	המיון (גרם/דונם) או ריכוך (%)	נפח התרסיס (ל'/'ד')	רוחוי ריסוס ביום	ימי המתנה עד לקטיף	הgidol
נקטרינה, אפרסק	ריקבון מימי (רידופוס)	0.1%	200 או עד נגירה	צריך לריסוס שבוע עד 3 שבועות לפני התחלת הקטיף	7	ריקבון חומ (מוניילינה)
	ריקבון חומ (מוניילינה)	0.1%	100-200 לפי גודל העצים בפריחה לפני גשם	לראס 500 גודל העצים בפריחה לפני גשם		
	קייחון האפרסק	0.1%	200 או עד נגירה (10-14)	200 או עד נגירה		
שקד	חילidan הגראניים	0.05% (50 גר' ל-100 מים)	100-200 לפי גודל העצים בפריחה לפני גשם	(1) 14-20	30	ריקבון חומ (מוניילינה)
	ריקבון אפור (בוטריטיס)	0.1%	100-200 לפי גודל העצים בפריחה לפני גשם	לראס 500 גודל העצים בפריחה לפני גשם		
רוסף	ריקבון אפור (בוטריטיס)	75	100-50	7	-	פרח שעווה
	כתמי חלפת	50	100-50	7	-	

(1) בהתאם לרמת הנגיעה. (2) המכינון הנכון למניעה (3) בזנים רגיסטים לא פחות מ- 50 גרם לדונם

- מכ' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 3/2003/גהה"צ/1723
 - סיווג FRAC C2+C3: דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
 - מיצר ע"י CHAMIZON
 - אריזות: 0.5, 5, 7 g
 - שוק ע"י אדמה אגן



סֶרְקָדִיּוֹ SERCADIS

קוטל מחלות תרכיז ריחני
קוטל מחלות חדש מכבוצת ה- carboxamides ושייך למנגנון הפעולה IHD. החומר הפעיל פוגע במטבוליזם של הפטריה, עוצר את התפתחות המחללה וגם מונע הדבקות חדשות. לתכשיר פעילות טנסלמינרית בעלה עם זרם המים. התכשיר עמיד לגוף להשתתט טיפול מניעתי לאורך זמן.

מכיל: L/g 300 fluxapyroxad

טבלת היישומים

הערות	ימי המתנה לפני קטיף	ימי המתנה	נפח תרסיס (ל'/ד')	המינון / הריכוז	הפגיעה	הגידול
ישום בודד בריסוס לא שילובים	14	50-120		0.03%	קייחון האפרסק	אפרסק/נקטרינה
ישום בודד בריסוס לא שילובים	14	50-120		0.03%	קייחון המשמש	משמש
2 יישומים בריסוס במיוחש של 7 ימים פחות	21	80-140		0.03%	קייחון הגוף	גוף
2 יישומים בריסוס בזמן הפריחה בלבד במיוחש של 12 ימים לפחות לא שילובים		60-150	ללא ימי המתנה	0.03%	קייחון המנגנו	מנגו
2 יישומים בריסוס במיוחש של 7 ימים לפחות לא שילובים	14	100-200		0.03%	קייחון התפוח, גרב התפוח	תפוח

מניעת עמידות: למניעת עמידות הפטריה לתוכsie, יש לכלול בלווח הדבירה תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה. אין לישם שני ריסוסים עוקבים עם תכשיר המבוסס על אותו מנגנון הדבירה.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביברות: 2022/גה"צ/4587

- סיווג FRAC C2: BASF
- מיוצר ע"י ADMA-AG
- אריזות: 1 ל', 0.3 ל'

פוליו גולד

טיפול אחרון לפני קטיף (ימיים)	הערות	הערות	נפח התרסיס (ל'/'ד)**	המינון (סמ"ק/ד')	המחלה	הגידול	
12	אין לרוטס יותר מ-3 פעמים בעונה	בריסוס קרכע: 100-100	250	כימישן*	תפוח אדמה עגבניה בצל	כימישן*	12
14 לתעשיה: 5 למאכל: 7	אין לרוטס יותר מ-4 פעמים בעונה	בריסוס אוויר: 5-10		עגבניה			
7	אין לרוטס יותר מ-3 פעמים בעונה	50-20		כשותית			

* מומלץ לשלב פוליו גולד עם קוטל פטריות קורדייט בקינון 60-80 ג'/ד' בהתאם לעוצמת הנגיעות, כדי לחתם מענה לגזעים עמידים למפנקרים.

** בהתאם לגובה הנוף.

שילובים:

בתפוח אדמה ובעגבניה: התכשיר פוליו גולד ניתן לשילוב במיכל המרסס עם קורדייט כمفורת מתחת לטבלה. המרווח בין הריסוסים במקבוקב עם תכשירים אחרים יהיה 7-10 ימים בהתאם לעוצמת הנגיעות ולתנאים המטאורולוגיים המתאימים להתקפות המחללה.

騰龍® קוטל פטריות סיסטמי להדברת כימישן בתפוח אדמה ובעגבניה ולהדברת כשותית בבל.

Mefenoxam 37.5 g/L+ Chlorothalonil 500 g/L

פוליו גולד הינו קוטל פטריות משולב המכיל שני מרכיבים פעילים המשלימים זה את פועלתו של זה. שני המרכיבים שייכים לקבוצות כימיות שונות ומיצגים מנגנון פעולה שונה. קוטל פטריות סיסטמי בעל יכולת מניעתית והדברתית של פטריות הגישות מקבוצת הפיקומיצטים.

Chlorothalonil - קוטל פטריות פרוטקטנטי רחוב טווח הייעיל בין היתר במניעת כימישן וחלפת בתפוח אדמה ובעגבניה וכן כשותית וסטטפיילים בבל.

הוראות שימוש: יש לטפל לפני או מיד עם הופעת סימני נגיעה ראשונים במחללה. הריסוסים ינתנו בכל היחסום המומלצים, בנפח תרסיס שיבטיחו כי סיימי נאות של נוף הצמחים.

גדעים עמידים - נוכחות גזעים עמידים של כימישן למפנקרים עלולה לגרום ביילות הדברת. אך אין להשתמש בפוליו גולד בראציפות אלא כחלק ממושך ריסוסים חלופיים עם קוטלי פטריות אחרים מקבוצות כימיות שונות המומלצים למטרה זו.



מס' הרישון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 22/ הגר"צ / 4629
 • דרגת רעלות 7A - מסוכן לבリアות
 Syngenta Crop Protection Ag • FRAC M+A1 :
 • מיוצר ע"י Ag • אריזות: 5 ליטר
 • משוק ע"י אדמה אגן

POLYRAM DF

גרגירים רחיפים

קוטל פטריות מקובצת הדיטיאוקרבמטים להדברת מחלות בגידולי ירקות, כותנה, פרדס ומטע, ולהדברת אקרית החלודה בפרדס.

Metiram 70%

Zinc ammoniate ethylenebis (dithiocarbamate) -poly(ethylenethiuram disulphide)

הוראות השימוש:

החל בטיפול פולירם טיפולי מנעה לפני הופעת המחלות במרוחקים של 7-10 ימים. לאחר הופעת הנגיעה טיפול במרוחקים של 7 ימים. לשיפור ההרטבה והדבקה ניתן להוסיף דבק. מנע רוחף לגידולים שכנים.

נפח התרסיס: בירקנות 20-50 ל"ד, בגידולים בהדרגה עד 150 ל"ד, במטעים 150-200 ל"ד, בהדרים 150-300 ל"ד בהתאם לגודל העצים.

שילובים: פולירם ניתן לשילוב עם מרבית קוטלי החרקים, קוטלי האקריות וקוטלי המחלות, אין לשלב פולירם עם מركן ברדו או מרכן קליפורני. בשילוב עם תכשירי תרכיז מתחלב ערבב מכל המוצרים תחיליה את תרחיף הפולירם ולאחר מכן יש להוסיף את התרכיז המתחבל.

בחדרים: אין לשלב פולירם עם תכשירי הזנה או שמן. בפומליות ופומלו אין לשלב פולירם עם שום תכשיר אחר. לפני ריסוס בכל שימוש יש לבדוק בטיחות השילוב תחיליה על מספר מצומצם של צמחים.

טיפול אחרון לפני האסיף בימיים	המינון		המחלה	הגידול
	הריכוז בריסוס בונפח מעל 100 ל"ד/ד'	גרם/ד'		
5	0.25%	250	כשותית הדלועיים	מלפפון, מלון
		250	כשותית	טבק
10		250	כשותית הבצל	בצל ***
10		250	חילוץ הבצל והשום	שום ***
5		250	כימשו, חלפת	תפוח אדמה
10		250	כתמי שוקולד (בוטריטיס), חילוץ השועונית	פול
5		250	כתמי חלפת	כותנה, קרוביים, גזר, עגבניה
10	0.15%		חילוץ הגלעינים	משמש, אפרסק, שזיף
10	0.25%		* חלפת (אלטנරיה)	הדרים *** (ראה סעיף שילובים)
		1000	**אקרית החלודה	

*רישום ראשון עם התחלה החנתה, ריסומים נוספים כל שבועיים עד סוף יוני. למניעת עמידות עדיף לריסוס במשטר ריסומים שכולל גם קוטלי פטריות אחרים. ** לריסוס על נגיעות נמוכה או טיפול מוגן. *** רצוי להוסיף חומר מדבקן כגן דבקן.

**** בין מיניאולה מותר לריסוס בסתיו בלבד.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 87/הגה"צ/496

- דרגת רעלות IV - מסוכן
- סיווג FRAC: M3
- ארידזות: 10 ק"ג
- מייצר/ע"י: BASF
- משוק ע"י אדמה אגן

FANTICA פנטיק

גרגרים רחיפים

התכשיר הוא קוטל פטריות בעל פעילות פרוטקטנטית וסיסטמית להדברת כימישן בתפקיד אדמה וגבניה וכשותית בגפן ובצל.

Metallic Copper 15% (as copper oxychloride) + Metallic Copper 15% (as copper hydroxide) + Benalaxyd 5%.

הערות לטיפול:

יש לסתס טיפול מינעה. קצץ את מרוח הריסוס כאשר צפוי גשם, טל או לחות שיכולים לעודד את התפתחות המחללה או כאשר מגדים זנים רגשיים למחללה, או כאשר יש מחללה קיימת בחלוקת סמכות. כדי למנוע פיטוח עמידות לתקשי, יש לכלול במעקבות הריסוסים תכשירם בעלי מנגן פועלה שונה. אין לרשות בשיטה פחות משולשה שבאותה מהריסוס האחרון. אין לרסטס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובב מנזקי קרה,

מחוסר אוורור קרקע או מנזק מזוקטלי' עשבים ועוד. אין לרסטס ברוח ויש למנוע רוח לגידולים שכנים.

טבלת השימוש:

טיפול האחרון לפני הקטיף (ימים)	נוף התרסיס	המינון (ק"ג לדונם או ריכוז)	המחללה	הגידול
בבדיקה	הרטבה מלאה	0.2-0.24 ק"ג/ד'	כימישן	תפוח אדמה, עגבניה
בבדיקה	הרטבה מלאה	0.2-0.24 ק"ג/ד'	כישותית	בצל
בבדיקה	70-100 ליטר/دونם	0.2-0.24 ק"ג/ד'	כישותית	גפן

שילובים:
אין מידע על שימושים.



מוס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביברות:
סיווג FRAC : M1/2 + A1 • דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
 • מיוצר ע"י GOWAN
 • איזוט: 5 ק"ג
 • משוק ע"י אדמה אגן

PROJECTUS

גריגרים רחיפים.

קוטל פטריות להדרכת מחלות הבוטרייטיס (עושש אפור) בגידולים שונים.

Fenpyrazamine 50%

כללי:

פרולקטוא הוא קוטל פטריות חדש בעל תכונות מניעה, טרנסלמינאריות ויסטמיות מקומיות. התכשיר פוגע ביצור ארגוסטרול באטר פועלה שונה משל תכשירים מכוקצת הטריאזולים ולא תנגדת משולבת. למניעת התפתחות עמידות לתכשיר, אין לרסס יותר מ-2 ריסוסים לעונה - **פרולקטוא**.

הערות לטיפול:

רסס טיפול מנעה. יש לרסס במרווח של 8-12 ימים. מקזרים את מרוחה הריסוס כאשר יש גשם, טל או לחות שיכולים לעודד את התפתחות המחלה או כאשר מגדים זנים רגשים למחלה, או כאשר יש מחלת קיימת בחלקות קrhoבות.

כדי למנוע התפתחות עמידות לתכשיר, יש לכלול בלוח ההדרכה תכשירים בעלי מנגן פועלה אחרת במקורה של נגיעות עם גזעים עמידים לתכשיר, יש לטפל בתכשירים בעלי מנגן פועלה אחרת.

אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יבש, חום או סובל מנזקי קרה,

מחסור אוורור קרחן או מנזק מכוטלי עשבים ועוד. אין לרסס בזמן שיש רוח. מנע למנוע רוח לגידולים שכנים.

טבלת השימוש:

הערות	מועד אחרון לרוי (ימים)	סוד לפני אסף (ימים)	נפח התרסיס (ל'./ד')	המינון (גרם/ד')	המחלה	הgidol
מתחלים לטפל בתחילת הנגיעה. מססים מ-8-12 ימים בהתאם לעוצמת המחלה. אין לרסס יותר מ-2 ריסוסים לעונה.	6		50-20	100	עובש אפור (בוטרייטיס)	תות שדה,
2 יישומים בריסוס במרווח של 5 ימים לפחות ללא שילובים	3		50-30	100		עגבניה
2 יישומים בריסוס במרווח של 7 ימים לפחות ללא שילובים	3		50-30	100		חציל
2 יישומים בריסוס במרווח של 5 ימים לפחות ללא שילובים	3		50-30	100		פלפל

שילובים:
אין מידע.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 4317/2019/גה"ץ
Sumitomo Chemicals
 • סיווג FRAC : G3
 • מיצר ע"י Sumitomo Chemicals
 • דרגת רעלות IV - מסוכן
 • משוק ע"י ADAMA אן
 • אריזות: 1 ק"ג

תרכיז ריחן להדברת קימוחן וקימוחונית בגידולים שונים ולהדברת אקרית החולודה בהדרים.

מיכל: גופרית 800 גרם בליטר

כלי: קואלה קופטל במכען ומכוב התפתחות של פטריות הגורמות למחלות הקימוחן והקימוחונית בגידולים שונים. לקבלת הדברת מחלות עילית צריך למת רטסוי מנעה או לרסס בתחלת הנגוזות. נתן לרסס על מחלה קיימת. קואלה כדברו את אקרית החולודה של ההדר. הריסוס יעשה בהתאם להמלצות ולתוכנית ההדבירה.

הערות השימוש:

לפני השימוש נרחבת של התכשיר או יישום בזנים ייחודיים או חדשניים, לרבות במקרים של שימושים, יש לבצע בדיקה מדכנית או להתייעץ עם אגרונום החברה. יש לרסס במרקוז של 7-14 ימים. דאג לכיסוי מלא של עלות הגידול. אין לרסס בתנאי מג אויר קיצוניים, לרבות אם צפויים תנאים כאלו, כגון קרה או רב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקלתון. אין יבש, חום או סובל מנדקי קרה, מחוסר אוורור קרחן או כנדק מקוטלי עשבים ועוד. אין לרסס בטמפרטורת מעל 30°. אין לרסס בזמן שיש רוח, ויש למנוע ריחן לגידולים שכנים. קואלה עלול להוותיר כתמי לכלוך חיצוניים על העלווה ועל הפרי.

הערות	ימי המתנה לפני הקטיפה	נפח התרסיס (ל'./ד')	המינון (סמ"ק/ד') או הריכוז (%)	הפגיעה	הגדיל
מיכל: גופרת 800 גרם בליטר	3	50-100	0.75%	קימוחנית	פלפל, חצ'יל
כלי: המינון בהתאם לרמת הנגוזות.	3	40-15	175-120 סמ"ק/ד'	קימוחן הגדר	גדר
נפח התרסיס בהתאם לגודל הגפינים. אין לרסס בזמן הפריה	3	150-100	0.5%	קימוחן הגפן	גפן
יש לדאגן לכיסוי מירבי של עלות הגידול והפרה. יש לשמר על מרווה של אין לרסס בתנאי מג אויר קיצוניים, כגון קרה או רב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקלתון. אין יבש, חום או סובל מנדקי קרה, מחוסר אוורור קרחן או כנדק מקוטלי עשבים ועוד. אין לרסס בטמפרטורת מעל 30°. אין לרסס בזמן שיש רוח, ויש למנוע ריחן לגידולים שכנים. קואלה עלול להוותיר כתמי לכלוך חיצוניים על העלווה ועל הפרי. קואלה.	3	500-300	0.75%	אקרית החולודה של ההדר (למעט קומוקואט ולמיון ננסי)	
נפח התרסיס בהתאם לגודל העצים. דאג לכיסוי מרבי של הפרחים.	3	כיסוי מלא של העלווה	0.5%	המנגו	מנגו

שילובים:

אין לשלב את התכשיר עם שמן או עם תואריות המכילות שמן. יש לשמר על מרווה של חדש ימים בין ריסוס התכשיר לריסוס שמן, ולהיפך.

מ' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 2015/גה"צ 4301
מ' הרישיון לחקלאות ארגנטינה: 7503

- סיווג FRAC M 1/2: דרגת רעלות IV - מסוכן Sulphur Mills Limited Ltd
- מיזכר ע"י ארגנטינה: 57
- משוק ע"י אדמה אגן

קומודור COMODOR SC

תרכיז ריחוף.

קוטל פטריות סיסטמי - להדרכת מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה ומטען.

מכיל: L/g 400 g/L + Chlorothalonil 80 g/L Azoxystrobin

כללי:

קומודור הינו קוטל פטריות המכיל כלורותולוניל שהוא מרכיב בעל פעילות מנעה ובת אטרים, עובדה האחראית להעדך עמידות למרכיב זה, ומרכיב טרנסלמיןיר, אזוקסיסטרובין, בעל פעילות קורטיפית מקבצת הסטרובילינום. לשני המרכיבים בתכשיט טוווח פעילות רחבה ביותר נגד מגוון מחלות, שילובם מבטיח פועלות משופרת של מנעה והדבאה ומפחית את הסכנה לפיתוח עמידות.


הגדל	המחלה	המיןון של 20-75 ל"ד/ סמ"ק/ד' בನפח	בריסוס נגירה או בנפח מעל 100 ל"ד/ ס' (ימ"	הרכיב (%) או בנפח עד אחרון לפני אסיף (ימ')	מועד אחרון לרישוי לפני אסיף (ימים)
חימצה, אפונה	כתמי אסוכיטה	150	-	16	
סלרי	כתמת (צראקופורה)	150	-	14	
אטיטיך	קייחון הדלוועים	100	-	15	
מלפפון, מלון	כשותית הדלוועים	200	-	3	
	קייחון הדלוועים	100	-		
מלון	התמותטות פתאומית (מונוספוראסקואט)	בנפח 400(4)	-	3	
עגבניות	קייחונית, קייחון העגבניה, כימישון	150	0.15%	3	
אגוזי אדמה	כתמת (צראקופורה)	150	-	30	
זית	עין הסוווט	-	(5) 0.15%	90	
תפוח	רקבון חיצוני (אלטרנירה אלטרנטנה)	-	(7) 0.15%	14	
ברוקולי	חלפת מצליבים	200 בנפח תרסיס 60-30 ל"ד/ (8)	-	3	

הגדל	המחלה	המיןון של 20-75 ל"ד/ סמ"ק/ד' בನפח	הרכיב (%) בריסוס נגירה או בנפח מעל 100 ל"ד/ ס'	מועד אחרון לרישוי לפני אסיף (ימים)
אפרסכוון	כתמי עליים	-	(1) 0.15%	90
תפוח אדמה	חלפת, כימישון	(2) 150-200	-	15
ריזוקטוניה (מק-שורש)	ישום בסיס הזרעה (6) ל-1000 מטר שורה	250 סמ"ק - (3) 100-200	60	
גזר	חלפת הגזר, קייחון הגזר	200	-	15
שומם	סטמפליום, חילזון	200	-	15
בצל	סטמפליום, כשותית	200	-	15

מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 2007/2007/גה"ץ/1918

- דרגת רעלות IV - מסוכן
- FRAC: 3C+M
- מיזוג: 1 ליטר 5 ליטר
- ארכזות: 1 ליטר 5 ליטר
- מושוק ע"י אדמה אגן Syngenta Crop Protection Ag





מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 2007/גהה"צ/1918
• סיווג FRAC: M 3C+ • דרגת רעלות IV - מסוכן
• אריזות: 1 ליטר, 5 ליטר • מיוצר ע"י Ag Crop Protection Syngenta
• משוק ע"י אדמה אגן

קומודור SC (המשך)

הערות לטבלה:

(1) יש לרוטס במהלך החנתה לפחות שני ריסוסים באינטראול של שבועיים.

(2) המינון בהתאם לגודל נוף הצמחים ולביצמת המחלקה.

(3) המינון הנכון לטיפולי מנעה, מינון גבוה לטיפול תגובה על מחללה קיימת.

(4) טיפול ראשון 10-20 ים משטילה, טיפול עוקב לאחר 3-2 שבועות. טיפול קומודור אינו תחליף קרכען. אין לישם במאצע מנוקח או בעט שהגדול בעקה. יש להזדק את התכשיר מהול למערכת טפסוף מנוקת אויה. יש לישם בשאבתה דישון במהלך השקית 2-4 קוב/דונם ובסוף היישום להזרים קוב מים נוספת לשטיפת המכערכת.

(5) ריסוס ראשון באוקטובר, ריסוס שני בדצמבר, ריסוסים נוספים נוספים ב开端ת החורף ביןואר ובמרץ.

(6) יש לישם בכחול הזרעה באמצעות 4 (או 2) פומיות הכוורבות על גבי הזרעה כאשר 2 (או 1) מכונות לחץ הזרעה לפני ניפוי הפקעות ו-2 (או 1) מכונות לריסוס על גבי הפקעות לפני כסוי ובניית הגודית מחדש. נבדק ונמצא בטוח בזמנים: ולווה, אלף, רוזנה, רודהו, קוליברי, דיפלה, ולדי, סנטה.

(7) לשימוש בדן פינק ליידי בלבד. להדרה מושלמת של המחללה יש לישם תכשירים מתאימים מקבוצות כימיות שונות כל 14 ימים החל מאירוע חדש אוגוסט. התכשיר מוגבל לישום אחד בעונה.

(8) 3 יישומים במרווח 7 ימים לפחות ללא שילובים.

שילובים:

ניתן לשילב קומודור עם התכשירים הבאים, בהתאם למינונים וההנחיות המופיעות בתוויות הארץ שליהם:

תפוא' - טלסטה.

גדר - אטברון.

חימצאה - קנוון, טלסטה, פנטרה, דואל גולד.

אבטיכון - וורטיכון.

מלון - דומארק (ביסוס בלבד)

מלפפון - סוויז'אי.

אדגוז אדמה - טלסטה.

רבו SC REVUS

הערות	מועד אחרון لרישום לפני אסיף (ימים)	המינו	המחלה	הגידול
מרססים מיידי 7-9 ימים בהתאם לעוצמת המחלה.	3	60 סמ"ק/ד'	כשותית הדלועים	מלון, קישוא
	14	60 סמ"ק/ד'	כשותית מרווה, רוזמין	בזיל (ריחן), מנטה,
	14	60 סמ"ק/ד'	כשותית פטרוזיליה, רוקולה	פטרוזיליה, רוקולה

שילובים:

ניתן לשלב רבוס עם התכשירים הבאים, בהתאם למינונים והנחיות המופיעות בתווית אריזתם: תפוא'א - מץ', מוליט, סקוור מלון וקישוא - קולין, אופיה.

לגביו שילובים נוספים ראה בטבלת הוראות השימוש

נפח תרסיס:

בירקות ובתפוח-אדמה רסס בনפח של 20-50 ליטר לדונם לפני גידול נוף הצמחים.

騰龍草除草劑 - להדברת כמשון בתפוח-אדמה ועגבניה וכשותית בدلועים ובטבלינים.

**Mandipropamid 250 g/g
כללי:**

קוטל פטריות נגד כמשון בתפוח-אדמה ועגבניה, וכשותית בכלון קישוא ובטבלינים שונים. התכשיר מניעתי (פרוטקטנטי) ומצ庭ן במניעת נביטת הנבגים. החומר הפעיל מנדיפרופאמיד (Mandipropamid) שיר לקובוצה כימית H. התכשיר מספג במחירות הרבה בשכבות השעווה (קוטיקולה) של העלה וקר שרידות התכשיר בתנאי גשם או השקיה גדרלה, אירוח גשם/השקייה אחרי התיבשות התכשיר לא פוגעות בעילותו. בנוסף לתכשיר יכולת תנועה טרנס-למינארית וביכולתו למנוע צימוח תפיטר בתוך העלווה ביכים הראשונים שלאחר הדבקה. בריסוסים נגד כמשון, אם הריסוסים מותבצעים לאחר שיש כתמי מחלה בחילקה אז רצוי להוסיף לרבעו תכשיר סיסטמי מכझן בטבלת הוראות השימוש ובשילובים מקומלארים.

הערות	מועד אחרון לרישום לפני אסיף (ימים)	המינו	המחלה	הגידול
מרססים מיידי 7-9 ימים בהתאם לעוצמת המחלה.	10	רבוס 60 סמ"ק/ד' בלבד או בשילוב עם רידומיל גולד ZM במינון 250 ג'./ד' או עם ייטן במינון 70 ג'./ד' או עם קורדייט במינון 60 ג'./ד' או עם סיני במינון 50 ג'./ד'	כמשון	תפוח-אדמה
בכל מקרה של ריסוס על גענות קיימת יש לרסס בשילוב.	3	רבוס 60 סמ"ק/ד' בלבד או בשילוב עם רידומיל גולד ZM במינון 250 ג'./ד' או עם ייטן במינון 80 ג'./ד' או עם קורדייט במינון 60 ג'./ד' או עם סיני במינון 50 ג'./ד'	כמשון	עגבניה (בחממה) ובשדה הפתוח



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 2010/גה"צ/4046
• דרגת רעלות VII - מסוכן
• FRAC: H5
• מיזוג ע"י Ag
• אורייזות 1,5%
• משוק ע"י אדמה אגן

RIDOMIL GOLD MZ גולד מז

גנריים רחיפים.

קוטל פטריות להדברת מחלות צמחים.

Metalaxy 4% + Mancozeb 4%

כללי:

רידומיל גולד MZ מכיל את האיזומר הפעיל של מטלקסיל שטכו, M-Metalexyl מכובצה 4 (PhenylAmides). כמו כן התכשיר מכיל כונקוזב מכובצה 3 M הפעיל סנג'ר אטרים במחלה. RIDOMIL GOLD MZ עשוי להדברת הכתוביות והכטשון ולמנעת מחלת הכתמים השקוויים ("כתמי בית שאן") בגדה. יש לזכור כי עלולים להתפתח גזעים עמידים למטלקסיל-M, אשר גורמו לפתחה בעילות התכשיר. לפיכך אין להשתמש בו ברציפות ויש להחלף עם קוטלי פטריות מקובצות אחרות.

הערות	מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)	הרכיב (%) בריסוס נגירה או בנצח מעלה 100 ל/ל'ד'	המינון (גרם/ד') בנפח קטן עד 60 ל/ל'ד'	המחלה	הגידול
אין לתת יותר מ-2-3 ריסוסים לעונה. רצוי לתת אותם בתחלת הופעת המחלתה.	למאכל- 5 לתשתייה- 14	0.3%	300	כמשון	עגבניה
אין לריסס מעלה 2-3 טיפולים בעונה.	3	0.3%	300	כשותית קלישוא	מלפפון, מלון,
	7	-	300	כשותית	בצל
	14	-	300	כשותית	כרובאים
	14	-	300	חילודן לבן	כרוב סיני
	25	-	300	כשותית	צנוןיות
רסס עם גילוי הכתמים הראשונים של הכתוביות.	14	-	300	כשותית חhana	חמצה, אפונה
	14	-	300	כשותית	חסה
	14	-	300	כשותית	פטרוזיליה



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביבורת: 2002/ הגה"ץ/1698
 סיווג FRAC: A1+M3
 מיזר ע"י Ag, 5 ק"ג
 משוק ע"י אדמה אגן

הערות	מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)	הרכיב (%) בריסוס נגירה או בנצח מעלה 100 ל/ל'ד'	המינון (גרם/ד') בנפח קטן עד 60 ל/ל'ד'	המחלה	הגידול
מועד הריסוס: 35-30 יום לאחר הצצת הגזזה (כאשר האשROSS בעובי עירון, עם תחילת הופעת צבע כתום). מיד לאחר הריסוס המטר 40-30 מ"ק לדונם.	21	-	1600	כתמים שוקעים ("כתמי בית שאן")	גזר
אין לתת יותר מ-2-3 ריסוסים לעונה. רצוי לתת אותם בתחלת הופעת המחלתה.	7	-	300	כמשון	תפוח-אדמה



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 2002/גהה"צ/1698
 סיווג: FRAC A1+M3 · דרגת רעלות IV - מסוכן
 Syngenta Crop Protection Ag · מיזר ע"י ק"ג, 5 ק"ג
 · משוק ע"י אדמה אגן

שילובים:
 ניתן לשלב RIDOMIL GOLD MZ עם ורטימק ת"מ, מץ' ת"מ, אופיר 2000 ת"ש, אקרובט 69 ג"ר ופרוקל"ים ת"מ.

נפח התרסיסים:
 בירקנות – 50-30 ליטר לדונם. ניתן לרסס מהאוויר בנפח 5-10 ליטר לדונם.
 בוורדים ובירקנות חמכה – 50-100 ליטר לדונם, לכיסוי מלא.

RIDOMIL GOLD MZ גולד מז (המשר)

הגידול	המחלה	המינון (גרם/ד') בנפח קטן עד 60 ל'./ד'	המיון (גרם/ד')	הרכוז (%) בריסוס נגירה או בנפח מעלה 100 ל'./ד'	מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)	הערות
פרחים: ורד (בזנים) פרסקו, גבריאלה, כרמן, פרופיטה, אסקימו, דרים, סוביינה, אוסיאנה, ברקרול, רודאו, בריגט, פקנו, ביאנקה, מרצדס) לייזיאנטוס, נורית	כשותית	-	300	0.3%		התcsiיר עלול לכלול: להקטנת הלכלוך ניתן לשלב עם סקוואסטון בריכוז 0.05% אין לרפס מעלה 2-3 ריסוסים בעונה.
תבלינים: בצל ירקון, cosaברה, שמייה, רוקולה, עירית, מליסה, מנטה, ריחן (בזיל), רוזמורי, מרווה, רוקט, מייזונה, תדר, עלי סלק (צ'ארד), עלי סלק אדום (רד צ'ארד ובולס בלוד) ועלית תה סוי	כשותית	300	300	0.3%	14	

ריזולקס

אבקה רטיבה.

קוטל פטריות להדברת ריזוקטוניה.

מכיל: 50% Tolclofos Methyl

כללי:

rizolex מדבר ריזוקטוניה במשתלות ובגידולי פרחים, במשתלות ובגידולי צמחי בית וגן, במשתלות כרפס לפני או אחרי השטילה.

הידול	שיטה ומועד הטיפול	המינון או הריכוז	שיטת היישום	הערות
במשתלה פרחים: ציפורן, גיפסנית, אסטר, גרבלה, טרכליום, ארליה, שושן, פלוקס, נורית, אדמנונית, סולידגו	לפני ניצת היחסורים	1 גרם/מ"ר או בריכוז 0.1%-0.2%	מרססים או מגמעים לפי 1 ליטר תמיisha למ"ר	
	1-2 ימים לפני הוצאה השתלים (הטענה)	2-5 גרם למ"ר	הגמעה ב-3 ליטר מים למ"ר	
	לפני או אחרי שטילה	2 ק"ג/ד'	רישוי ב-20-50 ל/ד'	
פרחים: ציפורן, גיפסנית, אסטר, גרבלה, טרכליום, ארליה, שושן, פלוקס, נורית, אדמנונית, סולידגו	לאחר השטילה ואחת לחודש ימים, סה"כ 2-4 טיפולים	2 ק"ג/ד' או בריכוז 0.2%	רישוי נגירה ברובה, רישוי בל' פומית או במזרף ממטירים	
צמחי עציץ ונווי: גפנית, פילורנדנרים, קורדיאן, דרצנה, פיטוניה, אגלוונמה ספטיפילום, פיקוס, פומילה	לאחר הנביעה או שבוע ופעם בחודש	1-2 גרם/מ"ר או 0.1%-0.2%	רישוי נגירה ב-1 ל'/מ"ר	
משתלת כרפס	לאחר הנביעה או שבוע	2 ק"ג/ד'	רישוי ב-20-50 ל/ד'	



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 83/גהה"צ/66
 • סיווג FRAC: F3 • דרגת רעלות IV - מסוכן
 Sumitomo Chemical Company Ltd. • מייצר ע"י: RIZOLEX
 • מחיר ע"י אדמה אגן

SHAMIR

הערות	טיפול אחרון לפני אסיף (ימים)	נפח התרסיס (ל'./ד')	לפניהם גידול	הרכיז (%)	המחלה	גrob התפסות	תפקיד*
תריצ' רחיף - להדברת מחלות הגרב בתפסות ובאגס. תערובת המורכבת מ-2 חומרים פעילים בעלי מנגנון פעולה שונה, במטרה להגבר את הייעילות, ומאפשר השתלבת במשטר מניעת התפשחות עמידות מחלות.	30	120-150	גrob האגס	0.3	ריבקון קליפה (אלטרנרייה אלטרנטה)	תפסות	גrob התפסות
					רכזם מיטבי של טיפול התרסיס ללא נגירה.	דובדבן דזנים: ריאיל דון, רנייר	רכזם מיטבי של טיפול התרסיס ללא נגירה.
הוראות השימוש: יתן להתחילה לשוטם בתכשיך עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף בין היישומים, יש לוודא שמתפלים בתכשיך אחר, שאינו מכך את אותם החומרים הפעילים. זאת על מנת להימנע ממקרים של שרירות חריגות בקטיפ. אין ליחס את התכשיך EOS במשך 6 שבועות לפני או אחרי הטיפול בתכשיך.	30	120-150	0.3	0.3	כתמת (צראקיספורה)	דובדבן	תערובת של שני חומרים פעילים: Captan + Tebuconazole מקבוצות שונות, להדברת מחלות הגרב בתפסות ובאגס. מותר להשתמש בתכשיך עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף בין היישומים, יש לוודא שמתפלים בתכשיך אחר, שאינו מכך את אותם החומרים הפעילים. זאת על מנת להימנע ממקרים של שרירות חריגות בקטיפ.
					כתמי עליים קטנים בדובדבן (בלומרילה)	דזנים: ריאיל דון, רנייר	תערובת של שני חומרים פעילים: Captan + Tebuconazole מקבוצות שונות, להדברת מחלות הגרב בתפסות ובאגס. מותר להשתמש בתכשיך עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף בין היישומים, יש לוודא שמתפלים בתכשיך אחר, שאינו מכך את אותם החומרים הפעילים. זאת על מנת להימנע ממקרים של שרירות חריגות בקטיפ.

* בזנים: סטראקינגן, זהוב, פינק ליידי, גולדסמייט, גאללה, גראני סמית, ענה.

שילובים כוותרים:

בתפסות - ניתן לשולב עם נמרוד, שביט, סייסטאן וטאקוומי.

באגס - ניתן לשולב עם קוורמוכר, רימון פאסט, אצתאטסטאר וטאקוומי.



מספר הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 4573/2019/גה"ץ
סיווג FRAC: M4+3 • דרגת רעליות 7-1 - מסוכן
אריזות: 5 ל" • מיוצר ע"י אדמה-מכתשים
王先生 אדמה אגן



ADAMA
אדמה

אָדָם, אֲדָמָה, אַדְמָה, אַדְמָה



www.adama.com/israel-agan/he [f](#) [o](#) ADAMA Agan- אדמה אגן-

טריטון X-100

רכץ נוזלי

חומר משטח והדבקה לחומרי הדבירה שונים, למוסטי צמיחה, לחומרי דילול וلتכשירים מתקני מחסום.

מכיל: L/g 900 Octyl-phenyl polyether alcohol

כללי:

משטח טריטון X-100 הננו תכשיר נוזלי המשפר את ההרטבה והכיסוי של תכשירי הדבירה, מוסטי צמיחה ותכשירים מתקני מהסורים. משתמשים בתכשירים אלה בהתאם להוראות השימוש והמלצות.

הכנת התרסיס:

תוספת המשטח טריטון X-100 תעשה בכל מקרה לאחר הכנת התרסיס. כאשר מוסיף את המשטח לאבקה רטיבה, צריך להכין את התרחיף לפני הכנסת המשטח מכל. ריכוז המשטח יהיה בהתאם המציניות לעיל או בהתאם להמלצות.

ריכוז טריטון X-100	המטרה	הגידולים	תוספת לתכשיר	רכץ נוזלי
0.030%-0.025% (30-25 סמ"ק-100 ליטר כימיקם)	הגברת חנטה	אגס, קלמנטיניות	ג'ירלן	חומר משטח והדבקה לחומרי הדבירה שונים, למוסטי צמיחה, לחומרי דילול וلتכשירים מתקני מחסום.
	דילול ענבים, הארכת האשכול והגדלת הפרי	גפן		
0.025%	מניעת נשירה	תפוח	טיפימון	מכיל: L/g 900 Octyl-phenyl polyether alcohol
	מניעת נשירה	שדי אירופי		
0.025%	דילול כימי	תפוח	אמיד-תין	כללי: משטח טריטון X-100 הננו תכשיר נוזלי המשפר את ההרטבה והכיסוי של תכשירי הדבירה, מוסטי צמיחה ותכשירים מתקני מהסורים. משתמשים בתכשירים אלה בהתאם להוראות השימוש והמלצות.
	תיקון מחסורים	תפוח	חנקן סיידן	
0.025%	תיקון מחסורים	תפוח	תיקוני מנגן	הכנת התרסיס: תוספת המשטח טריטון X-100 תעשה בכל מקרה לאחר הכנת התרסיס. כאשר מוסיף את המשטח לאבקה רטיבה, צריך להכין את התרחיף לפני הכנסת המשטח מכל. ריכוז המשטח יהיה בהתאם המציניות לעיל או בהתאם להמלצות.
	ויסות צימוח	דית, גפן	אטREL	
0.025%	שבירת תרדמה	עצבי פרי נשירים	חנקת אשלגן	הכנת התרסיס: תוספת המשטח טריטון X-100 תעשה בכל מקרה לאחר הכנת התרסיס. כאשר מוסיף את המשטח לאבקה רטיבה, צריך להכין את התרחיף לפני הכנסת המשטח מכל. ריכוז המשטח יהיה בהתאם המציניות לעיל או בהתאם להמלצות.
	תיקון מחסורים	פקן	גררת אבץ	
0.025%	שבירת תרדמה	גפן, קיוקי, אגס, תפוח	דורמקס	



מ"מ הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 76/גה"צ/431
 • אריזות: 1 ל' • דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
 • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן

משטח DX SPREADER

תרכיז נזלי להגברת המגע של קוטלי עשבים וחומר שילוח.

הרכב: L/g 800 Alkylaryl polyether alcohol

כללי:

משטח DX מ��ר תכונות ההרטבה והכיסוי של קוטלי עשבים שונים ואת פעילותם לקטילת מגע של עשבים חד-שנתיים. כמו כן מוגבר משטח DX את פעילות המג בשילוק העלים בគותנה.

הוראות שימוש:

1. תוספת משטח DX לדיאורקס

(עונת סתיו-חורף בלבד) - מוגבירה את קטילת המגע של דיאורקס על עשבים ח"ש ק"מיים עד גובה של 5 ס"מ. טיפול זה מתאים לכל ריסוס בדיאורקס הנitin בקרקע ביןונית ובבדה. אין להשתמש בתוספת DX בקרקע קלה.

הרכיב:

0.5 %

2. תוספת משטח DX לאטרנקס

להדרבת עשבים עד גובה 5 ס"מ.

הרכיב:

0.5 %

3. תוספת משטח DX למוניטור

להדרבת עשבים ק"מיים.

הרכיב:

0.25 %

4. תוספת משטח DX למג

לשיול השילוך של עלי הគותנה.

הרכיב:

0.5 %

ריסוס מהקרקע 1.0%.

ריסוס מהאוויר 0.5%.

מ"ס הרישון של שירותים להגנת הצומח ולביטחון: 72/הגה"צ/541
אריזות: 1 ליטר, 5 ליטר • דרגת רעלות: V-A - מסוכן
מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן



משטח L-77 SPREADER

מחיר נזלי:

משטח סיליקון אורגני להגברת פעילות של תכשiri בברzel ו'ג'רלן

Polyalkyleneoxide Modified Heptamethyltrisiloxane

כללי:

משטח L-77-7 מורייד בצורה משומעתית את מתח הפנים של טיפות התרטיסים ומסייע בכך להדבקה ולהדריה עילית של תכשiri בברzel ו'ג'רלן לרקמות העלים.

L-77-7 בשילוב עם תכשiri בברzel מסייע לתיקון כלורזה בגידולים שונים. L-77-7 בשילוב עם 'ג'רלן גורם להארכת עונת הקטיפה בהדרים.

הוראות שימוש:

1. שילוב גפרת ברzel CP עם משטח L-77 שימוש בגפרת ברzel CP+L-77-7 מיועד רק לעצים הסובלים מלולוזה.

חטיב שהרטיסוי יבוצע בשעות המוקדמות של הבוקר עד לשעה 08.00 או לפני ערב.

בздירים (למעט לימון) - בעצים צעירים לפני גל נבה בלבד. בשאר הגידולים בעצים מכל הגלים כמפורט בטבלה.

נפח התרטיסו: בהדרים כולל לימון 100-200 ל'/ד', בשאר הגידולים 80-150 ל'/ד' לפני גודל העצים.


הערות	מס' הטיפולים ומוגדים בעצים נושא פרי*	המינון (%)		הגידול
		משטח L-77	גפרת CP ברzel	
	לאחר פריצת הצימוח, לפני החנתה, ריסוס אחד או שניים. ריסוסים נוספים לפי הצורך, מהתחלת אוגוסט ואילך.	0.1	0.2	אפרסמן
	רישום ראשוני כאשר הצימוח יגיע לאורך של 10-15 ס"מ ומעלה. ריסוסים נוספים במסך העונה מדי-20-30-30 יום בהתאם לצורן. לפחות 3 ימים לפחות וראה הערכה**.	0.025	0.25	אפרסן (חוץ מנקיינינה)
	2-1 ריסוסים. טיפול ראשוני כשבועיים לאחר החנתה, טיפול שני בORITY הצורן כעבור כ-30 יום.	0.025	0.25	שזף אירופי יפני
	רישום אחד או שניים לאחר החנתה.	0.1	0.2	אגו
רישום ראשוני יבוצע בשעות המוקדמות של הבוקר, ריסוס שני כעבור 30 יום.			0.3	גפן
ביפוי/ואה הפרזה בהנפה התטיסים עלולה לגרום האדמה דמיית של העלים.	לאחר פריצת הצימוח האביבי ועד לפירחה ולפי הצורןשוב לאחר החנתה.	0.05 0.025	0.2 0.3	פיג'ואה גואיבה
רק בעצים צעירים שאינם נושאים פרי.		0.1	0.3	הדרים למעט לימון
	רישום מדי-4-3 שבועות בהתאם לצורן.	0.1	0.3	לימון



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 81/הגה"ץ/439
 • אריזות: 1 ל' • דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
 • מיוצר ע"י EPOXY MOMENTIVE
 • משוקע ע"י אדמה אגן

הערות	מס' הטיפולים ומוגדים בעצים נושא פרי*	המינון (%)		הגידול
		משטח L-77	גפרת CP ברzel	
החל מפריצת הצימוח באביב	מטפלים מדי-30-45 יום	0.025	0.3	מנגו
לא יותר מ-4 ריסוסים בשנה	באביב עם הופעת הצימוח הצער (אין לרוסס בזמן פריחה, חנתה ושלבי התפתחות הראשוניים של הפרר). טיפולים נוספים מילוי ואילך.	0.1	0.2	אבוקדו

לפני השימוש יש לחקור את הנהניות המופיעות בתווית התכשירים.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 81/הגה"צ/439
• אריזות: 1 ל' • דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
• מיוצר ע"י MOMENTIVE
• משוקע ע"י אדמה אן

משטח L-77 SPREADER (המשר)

הערות לטבלה ראשונה:

- *בעצים צעירים אין מוגבלת למועד הריסוס, מרוססים מדי 3-4 שבועות לפי הצורך.
- *בזנים אפילים רצוי להימנע מריסוס קרוב להבשלה הפרי כי גפרת הברזל יכולה לגרום לכתמים כהים על שערות הפרי. בזנים אפילים מוצע לא יותר מריסוס אחד במשך הקיץ מחחש לנשיית עלים.

2. שילוב ג'ברליין עם משטח 77-L להארמת הקטיף בהדרים.

הגדלול	הדרים	הכינון	הערות
		ריכוז ג'ברליין ריכוז חומר פועל בח"מ (PPM) 0.05-0.025	תכךיר ג'ברליין ריכוז כל שריכוזי הג'ברליין והמשטח יהיו גבוהים יותר, תהיה ההשפעה חזקה יותר.

ארמובריין

הרכץ נוזלי

משטח לשימוש בשילוב עם ארמו N לשיפור התעוורות בעצי פרי שונים בתרדמה.

Alkoxylated fatty alkylamine polymer 980 g/L

הערות:

ארםובריין פועל כמושת צמיחה. חברת אדמה אגן אינה אחראית לפעולות התכשיר ותוכזאותו בתנאים אלילניים קיצוניים והשפעתם על המצב הפיזיולוגי של הצמח, או בריסוס כוקדם או מאוחר מהמועד.

טבלת שימוש:

הגדול	הריכז (%)	נפח התרסוס (ל'/'ד')	מועד הריסוס
אגס בזנים ספdone, קוווטיה אפרסק בזנים: סאמר סנו משמש בזן רעננה תפוח בזן זהוב, סטראקיניג דובדבן בזן בורלא	1.0	100 - 150 בהתאם לגודל העצים	חדש לפני התעוורות הטבעית. ריסוס במועד קרוב כדי להתעוורות הטבעית עלול לגרום לפגיעה בפקיעי הפרי*.

*יש להתייעץ עם מדריך שדה לפני השימוש.

1. כאשר התכשיר מrosso למטרת הפגחת פריחה עם המפרים, יש להקפיד שימצא דבורים בשטח מתחילה הפריחה.
2. ריסוס במועד קרוב כדי להתעוורות הטבעית (פחות מחודש לפני התעוורות הטבעית) עלול לגרום לפגיעה בפקיעי הפרי.
3. ריסוס בשעות הבוקר או לקראת הערב. אין לריסס את התכשיר בשעות החמות או בימים חמים ובהירים.
4. DAG לכיסוי מלא של ענפי העץ.
5. אין לריסס מטע או קרם שנמצא בעקבות ייבש או בעודפי טיפולות.
6. מומלץ לשמור על עלווה ביראה במטע ובכרם בסוף העונה שיאפשר הצטברות של מוטמעים בצמח שיגרום להתעוורות חזקה בארץ.
7. יש להתייעץ עם מדריך שדה לפני השימוש.

אוף הכננת התרסוס:

מלא את המrosso עד כדי מחציתו בכימ. הוסיף את הכמות הדרישה של האرمובריין למיכל המrosso והפעיל את המערבל. לאחר פיזור של האرمובריין בכימ, הוסיף את הכמות של ארמו N הדרישה למיכל המrosso, תוך כדי ערבות. הפעיל את המערבל עד תום הריסוס.



מ"מ' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביברות: 4267/2017/גן"צ
 • אריזות: 5 ליטר • דרגת רעלות III - מסוכן לביריאות
 • מיוצר ע"י Akzo Nobel Specialities Elementis בע"מ
 • משוק ע"י אדמה אגן

ארמו N

דשן חנקתי לשימוש בשילוב עם ארמונובייק לשיפור התעוורות עצי פרי שונים בתרדים.

מכיל: 9.0% חנקן ניטראט (3O-N-N) + 9.0% חנקן אמוניאקל (4NH-N)

אופן הכנה התרסיס:

מלא את המרסס עד כדי מחציתו בكمים. הוסיף את הכמות הדורשה של הארמונובייק למיכל המרסס והפעל את המכערבל. לאחר פיזור של הארמונובייק בكمים, הוסיף את הכמות של ארמו N הדורשה למיכל המרסס, תוך כדי ערובה. הפעל את המכערבל עד תום הריסוס.

טבלת שימוש:

הגידול	הרכיב* (%)	נפח התרסיס (ל' / ד')	מועד הריסוס
אגס בזנים ספוגונה, קוווטניה אפרסק בזנים: סאמר סנו משמש בזן רעננה תפוח בזן זהוב, סטרלינג דובדבן בזן בורלא	8.0%-6.0%	בהתאם לגודל העצים 150 - 100	כחדש לפני התעוורות הטבעית. רישוס במועד קרוב מדי לתעוורות הטבעית עלול לגרום לפגיעה בפקיעת הפרי*. אחרי הכננת התרסיס.

*יש להתייעץ עם מדריך שדה לפני היישום.



- אריזות: 10 ל"ק (12.3 ג"ג)
- מיוצר ע"י: ICL Group, חיפה
- משוקע ע"י: אדמה אגן, אשדוד

ברוייס BREVIS

גרירים מסיסים.

מוסות צמיחה המיעוד לדילול חנטים בתפוח.

Metamitron 15%

כללי:

ברוייס הינו תכשיר ייחודי המכיל מטאמיטרון ופורמאת הסידן. ברוייס מועשת דמנית את תהליך הפוטוינציה בעצים שיגרום לנשירת חנטים קטנים וכך יתרום לשיפור הגודל ואיכות היבול. התכשיר מיושם לאחר חנטה. ניתן לתת ריסוס עוקב לפיה כבלת השימוש.

הערות לטיפול:

לפני השימוש יש להתייעץ עם איש החברא או עם המדריך האזרחי. הימנע מרוחף של התרסיס לגדלים שכנים. אין לרוטס ברוח. עננות כבדה / או טמפרטורות גבוהות בלילה בתקופת היישום יגבירו את השפעת הטיפול. קרינת שמש חזקה / אוليلות קרימים יקטינו את השפעת הטיפול. יש לבדוק את תחזית מג האויר לשבע שלאחר הריסוס המתכוון כחלהק מתכוון מועד הריסוס והמיןן של הברוייס. ריסוס תחת רשת צל או רשת ברד יגביר את השפעת הטיפול. אין לרוטס ברוחיס בטמפרטורות שנמוכות מ- 25°C. מומלץ לרוטס בטמפרטורות שנמוכות מ- 10°C. גשם לאחר שעתיים מכועד הריסוס לא ישפיע על ייעילות הטיפול. אין לרוטס על עלוות העצים ע"י תמיית הריסוס. אסור לרוטס קוטלי עשבים במתע שבוע לפני או אחרי הריסוס ישפיע רק על עלוות העצים ע"י תמיית הריסוס. אין לרוטס בתנאי מג אויר קיצוניים כגון קרה, או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עלה כגון יובש, חום, או סובל מנזקי קרה, מחסור אווור או רוחע, או מנזק מקטולי עשבים ועוד. אין לרוטס יותר מפעםים באוותה עונה.

ציד הריסוס:

ניתן לרוטס עם כל מרסס המתאים לריסוס מטעים בתנאי שייתן את נפח התרסיס הרצוי. הימנע משימוש בכמות עודפת של תרסיס ונגירתו לקרח.

טבלת שימוש:

הקידול	הרכיב (%)***	המינון	תפוח בזנים: זהוב, גאלה 170-120 גרם/ד'	10-12 cm ³ מ"מ	תפוח בזן: סטרקינג 200-150 גרם/ד'	10-12 cm ³ מ"מ	מכלול: 15% Metamitron
תפוח בזנים: זהוב, גאלה 170-120 גרם/ד'	0.12	0.12	תפוח בזן: סטרקינג 200-150 גרם/ד'	0.14	0.14	תפוח בזן: סטרקינג 200-150 גרם/ד'	0.14
תפוח בזן: סטרקינג 200-150 גרם/ד'	0.14	0.14	תפוח בזן: סטרקינג 200-150 גרם/ד'	0.14	0.14	תפוח בזן: סטרקינג 200-150 גרם/ד'	0.14

* המינון הגבוה כאשר יש ציפוי ליבולים גבוהים.

**השימוש השני יבוצע לאחר התיעוצות עם איש החברא או עם המדריך האזרחי.

***בריסוס לפי הרכיב, אין לעורר את הכמות המקסימלית של החומר בграмм/דונם לכל דין של תפוח, כפי שמצוין בעמודת "המינון" של אותו דין.

נפח התרסיס:

110-140 ל"ד בהתאם לגודל העצים.

שילובים:

אין לשלב ברוייס עם משכחים או כל תכשיר אחר יש להתייעץ עם המדריך או חברת אגדה אגן לפני שימושם כל תכשיר הריסוס והמיןן של הברוייס. ריסוס תחת רשת צל או רשת ברד יגביר את השפעת הטיפול. אין לרוטס ברוח שנקודות מ- 10°C. מומלץ לרוטס בטמפרטורות שנמוכות מ- 25°C. גשם לאחר שעתיים מכועד הריסוס לא ישפיע על ייעילות הטיפול. אין לרוטס על עלוות העצים ע"י תמיית הריסוס. אסור לרוטס קוטלי עשבים במתע שבוע לפני או אחרי הריסוס עם ברוייס. אין לרוטס בתנאי מג אויר קיצוניים כגון קרה, או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עלה כגון יובש, חום, או סובל מנזקי קרה, מחסור אווור או רוחע, או מנזק מקטולי עשבים ועוד. אין לרוטס יותר מפעםים באוותה עונה.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 4233/גגה"צ/2014
 • אריזות: 1 ק"ג • דרגת רעלות V - מסוכן
 • מיוצר ומשווק ע"י אגדה אגן

DORMEX דורמקס

תרכיז נוזלי.

לשבירת תרדמה, לשיפור התעוורות ולהפחת הפריחה עם זנים בעצי פרי נשירים וגפן.

מכיל: $\text{L/g} \text{CN} 500 - \text{NH}_2\text{-CN}$

הוראות שימוש:

הטיפול בדורמקס (אלזודף) עשו תכיד בעונת התרדמתה של העצים (פרטו למנגנו). המועד האחרון ליריסום בתכשיט יהו 30 ימים לפני הופתיחה הטבעית של הפקעים. הריסום יססה היטב את הפקעים. התכשיט צובר צמחים ירקניים, لكن בעת הטיפול יש למנוע התזת התמיisha לגידולים שכנים.

כאשר דורמקס מירוסס למטרת הפחתה פריחה עם המפרים, יש להקפיד שיימצא דבורים בשטח מתחילה הפריחה.

הגידול	הזמן	הרכיב (%)	נפח התרסיס (ל'/ד')	מועד הטיפול
גפן בגיל ניבת	פרלט, קרדינל, סופריוו דז-בן חנה, סולטנית דנים אחרים	5-4	80-50	ראשית ינואר סוף ינואר-ראשית פברואר 30 ימים לפני התעוורות טבעי
ברוננו, היברד	ברוננו, היברד	4	80-100 ל' גודל העץ	קיוי בגיל הניבת
תחלית מרכז אפסוף פברואר עד שים לב! הריסום המשולב ינתן לפחות 30 ימים לפני התעוורות הטבעית. לקביעת המועד, רצוי להתייעץ עם המדריך.	זהוב, גרגנו סמיוטי, גרנד, יונטן, אורליאנס, דליישס 0.5	0.5	00-100 ל' גודל העץ	תפוח בגול הניבת (ב) הפרחים תפוח בגול הניבת (א) עננה והזרנים המפרים 2

מטרת הטיפול והעROTות: לשיפור התעוורות, רצוי לטפל לאחר הזרירה. בכרכים שוזרים מאוחר אפשר לטפל גם לפני הזרירה. המועד המיטב של הטיפול עשוי להשתנות משנה לשנה. רצוי לקבוע אותו עם איש מקצוע ולפי ניסיון מעוקם. באזרחים רגשיים לקרה ולברד צריך להימנע מטיפול מוקדם.

מועד הטיפול	נפח התרסיס (ל'/ד')	הרכיב (%)	הזמן	הגידול
מחיצית ראשונה של פברואר	100-150 ל' גודל העץ	4	קוצוטיה, ספdoneה	אגס בגיל ניבת
מטרת הטיפול והעROTות: להפחתת הפריחה. אם ניתן לקבוע את מועד התעוורות הטבעית של הספdoneה, אפשר לרטסס את הקוצוטיה בלבד 30 יום לפני כן. ריסוס שני הזרנים ביחד עשוי לסייע להגדלת פרי הספdoneה.	00-100 ל' גודל העץ	2	עננה והזרנים המפרים	תפוח בגול הניבת (א)
הטיפול בדורמקס (אלזודף) עשו תכיד בעונת התרדמתה של העצים (פרטו למנגנו). הריסום יססה היטב את הפקעים. התכשיט צובר צמחים ירקניים, لكن בעת הטיפול יש למנוע התזת התמיisha לגידולים שכנים.	00-100 ל' גודל העץ	2	סוף דצמבר	תפוח בגול הניבת (א)
כasher Dormekos Mirossos لمטרת הפחתה פריחה עם המפרים, יש להקפיד שיימצא דבורים בשטח מתחילה הפריחה.	00-200 ל' גודל העץ	0.5	זהוב, גרגנו סמיוטי, גרנד, יונטן, אורליאנס, דליישס 0.5	תפוח בגול הניבת (ב) הפרחים תפוח בגול הניבת (א) עננה והזרנים המפרים 2



מפט' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 82/הגה"צ/613
 • אריזות: 5, 20 ל' • דרגת רעלות II - רעל
 • מיוצר ע"י AlzChem Trostberg GmbH
 • משוק ע"י אדמה אגן

דורמקס DORMEX (המשר)



מפט' הרישון של השירותים להגנת הצומח וליביקורת: 82/גה"ץ/613
 • אריזות: 5, 7, 20 ל' • מוגרת רעלות II - רעליל
 AlzChem Trostberg GmbH • מס' שוק ע"י אדמה אגן

הgidול	הזמן	הריכוז*	נפח התרסיס (ל'/ד')	מועד הטיפול
גודגן בגיל ניבת	זמן שונים	4-3	100-150 לפי גודל העץ	אמצע - סוף פברואר ובהתקפת לטמפרטורות החורף
הערות: מיועד להפגשת הפריחה של זנים שונים ולשיפור התעוררות				
אפרסק בגיל הניבת	סמרקט	2	100-150 לפי גודל העץ	סוף פברואר
תאנים בגיל הניבת	זמן בכורות	3	לפי גודל העץ עד הרטבה טוביה	אמצע עד סוף ינואר
תפוח, אגס, אפרסק, נקטרינה, שזיף, משמש, גודגן - בשנתיים הראשונות לאחר נטיעת גודגן - בשתיים הראשונות לאחר נטיעת גודגן				
מטרת הטיפול והערות: מיועד לקבלת התעוררות אחידה				
מנגו (לפי ניסיון מקומי)	זמן שונים	0.4	100-250 לפי גודל העץ	בפריחה מלאה של גל הפריחה הראשונה לפני חננת הפרי
מטרת הטיפול והערות: מיועד להשמדת תפוחות ראשונות				

* לכל הטיפולים בדורמקס (אלזודף) יש להוסיף משטח טרייטון X-100 בריכוז 0.025%

פני השיכוך יש לקרוא את הנהניות המופיעות בתווית התכשיטים.

דילווט

תרכיז נזול.

משטח סילוקוני המיועד להורדת פרחים לצורכי עורלה באפרסק / נקטרינה ושקד.

מכל: L/g 840 Modified Polyalkyleneoxide Heptamethyltrisiloxane

כללי:

דילווט פועל על פרחים פתוחים וצובר אותם זמן קצר לאחר הריסוס. חנטים רבים, שנוצרו מפרחים שנפגעו מהריסוס בדילווט אינם מתפתחים כראוי ונושרים לאחר מספר שבועות. מומלץ לבדוק אם יש צורך בתיקון יدني 5-6 שבועות לאחר הריסוס.


הערות לטיפול:

dag לכיסוי מלא של הפרחים בתרסיס. עלום קיימים בזמן הריסוס נצרבים חלקית ע"י דילווט אבל נזק זה חולף ללא השפעה על המשך הצימוח. מנע רוח התרסיס לגדיולים שכנים. אין לרסס ברוח.

הגידול	מטרת הטיפול	מועד הטיפול	הרכוץ ב-%	נפח התרסיס
אפרסק / נקטרינה, שקד	הורדת פרי עורלה עד נגירה	שיא פריחה	1.0	עד נגירה

שילובים:
אין לשלב דילווט עם תכשירים אחרים.

ציד הריסוס:
לריסוס עצים צעירים (להורדת פרי עורלה) ניתן לרסס עם מרסס גב או מרסס רובים או מרסס מפוח עד נגירה.



MAGIC

טרכיז ריחוף.

מוסות צמיחה בגידולים שונים.

מכל: L/g 50 P - UNICONAZOLE

כללי:

מיועד לעכירות הצימוח במשתלות צמח עץ ובוגנויליה; לעכירת הצימוח ולויסות היבול בשזיף יפני ולהגברת היבול באבוקדו. מג'יק הינו מוסף צמיחה המכובד יצירת הרכמן הגדייה ג'יברליין. התכשיר מועבר בצמח בתוך העצה, פועל על נקודות הצמיחה וגורם לציפוי פרקים של הצימוח הנוטף. מג'יק נקלט הן ע"י ריסוס הנוף והן ע"י מערכת השורשים.

הערות לטיפול:

אחר שמכג'יק נקלט גם במערכות השורשים, אין לטפל במעט העלול להיעקר תוך 3 שנים כדי למנוע עיכוב צמיחה בגידול הבא. גידולים דגניים פחותים לגשים לתכשיך, لكن לאחר עקירה עדיף לזרע דגניים ולהימנע מזרעת גידולים רחבי עלים לפחות בשנתיים הראשונות לאחר העקירה. אין לטפל במכג'יק בעצים חלשים או בעצים הנמצאים בתנאי עקה. אין לרסס בזמן שרב או כצפוי הרבה. עדיף לרסס בלילה. מנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים.

נער היטב לפני השימוש. הקפד על בחישה מתמדת בזמן התרסיס ובמשך הטיפול. השתמש בתרסיס מיד לאחר הכנתו.

הוראות השימוש:

הgidol	מועד הטיפול	צורת היישום	הרכיב	נפח תרסיס (ל'/ד')	הערות
צמח עץ במשתלות בעיבולות, פוקסיה, בושמת, חלבLOB, חרציות ועוד.	ריסוס	0.04%-0.01%	ריסוס	100	הכינון יקבע בכל מין לפי הניסיון המקומי.

מטרות הטיפול: לויסות צימוח והגברת פריחה בצמח עץ, לפי הניסיון שנרכש.
להריטה טובה של נוף הצמחים דרוש 1 ליטר תרסיס ל-10 מ"ר (100 ל'/ד').

הערות	נפח תרסיס (ל'/ד')	הרכיב	צורת היישום	מועד הטיפול	הgidol
זית בעציים	100	0.2%-0.1%	רישום		
בוגנויליאה הנמרצת	100	0.3%	רישום	בזמן הצמיחה הנמרצת	
מטרת הטיפול: לויסות צימוח.					
ראה סעיף שילובים	100	1.0%	רישום	מהתארכות התפרחות באורך של 10 ס"מ ועד שיא פריחה.	אבוקדו מבוגר
מטרת הטיפול: בין פוארטה להגברת יבול במטעים עם יבול נמוך. (ליתר פרטים והוראות השימוש בדנים אחרים - ראה המלצות שה"מ).					
אין לטפל בעצים חלשים וללא עלים. אין לטפל יותר מספרם בשנה.	2-3 ס"מ"ק לעץ לטפטפות בזמן ההשקייה	טיפול קרקע מתחת לשנה ראשונה. 2-1 ס"מ"ק לעץ בשנים הבאות לחנטה. לפי הצימוח.	באביב בפריחה מלאה עד תחילת חנתה.	שזוף יפני מבוגר	
מטרת הטיפול: להקדמה קטיב, לקבלת פרי גודל ולויסות צימוח.					



מטרות הטיפול: לויסות צימוח והגברת פריחה בצמח עץ, לפי הניסיון שנרכש.
אריזות: 1 ליטר, 5 ליטר • דרגת רעלות 7 • מסוכן
מיוצר ומשווק ע"י ADAMA אגן

C.C.C. O.O.O.

תרכיז נזול:

למניעת רביצה בחיטה, למניעת פרי גס בהדרים ולעצירת צימוח באגסים.

Chlormequat chloride 400 g/400 mL

הערות לטיפול:

אין לסתס בעט רוח - מנע רוחף התרסיס לגידולים שכנים. אין לרסס בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתחום עקה יבש, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע או מנזק מקטלי שעבים ועוד.

חיטה:

למניעת רביצה

הדרים:

רישום ב-ס. ס!. מקטין את תופעת הקילפה הגסה בפרי שמותי ועשוי להגבר את היבול.

תרכיז נזול	מועד הריסוס	נפח התרסיס (ל'/ד')	הרכיב
מכל: 400 g/g 400 mL	מחדש מייא עד מחצית יוני ולא מאוחר יותר	ב一丝 (0.625%) 625 סמ"ק ס. ס. ס!	ב一丝 (0.625%) 625 סמ"ק ס. ס. ס!

אגסום:

רישום ב-ס. ס!. ס. ס!. מסייע בעכירת הצימוח בעצי אגס.

מועד הריסוס	נפח התרסיס (ל'/ד')	הרכיב	אחסון:
במשך חודש אפריל-מייא כאשר הצימוח נمرץ מעל 20 ס"מ	עד נגירה.	%-2 לפ"י חזוק העצים*	רישום ב-ס. ס!. ס. ס!. ס. ס!. מסייע בעכירת הצימוח בעצי אגס.

* מכונים את התרסיס למוקדי הצימוח.

המיןון	נפח התרסיס (ל'/ד')	מועד הריסוס	השלבים:
5-750 סמ"ק/ד'	10-1000 סמ"ק/ד'	מהאוויר-3 מהקרקע-8	בתקופת התארכות הפרק השני של החיטה. התקופה המתאימה לריסוס נמשכת 10-14 ימים.

ס. ס!. ס. נתן במקורה הצורך לערוב עם תכשירים שונים השימושים בחיטה, עם דשנים כגון אוריאה וחנקת אסון נזול ועם קווטלי שעבים שונים כגון אלבר-ם, אלבר סופה, ברומטוריל. בשילוב עם דשנים וקווטלי שעבים יש להקפיד על העיתוי המתאים: קר למשל אפשר לשילב עם ברומטוריל סמור להתקינות, אך עם אלבר-ם, אלבר סופה אפשר לשילב רק בשילב הפרקה.

משר הפעולה:
ס. ס!. ס!. מותפרק בקרקע תוך זמן קצר יחסית וכן בשימוש במועדים המומליצים אין חשש משאריות קרקע לגידול הבא אחרי החיטה.

שטייפה ע"י גשם:
ס. ס!. ס!. נקלט מהר בעלים. אין חשש לשטייפה ע"י הגשם החל מ-4 שעות לאחר הריסוס.

בהתנאי עקרה עלולים להופיע כתמים בהירים בעלה, בעיקר בעלה הדגל.

פני השימוש יש לחקור את הנהניות המופיעות בתוויות התכשירים.



- מ"ר הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 67/גה"ץ/32
- אריזות: 10 ליטר, 20 ליטר
- דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
- מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן

סיפיון (CPPU)

הוראות שימוש:

نפח התרטס	הרכיב (%)	מועד הטיפול	שיטת השימוש	מטרת השימוש	הגידול
100-100 ל"ד, עד הרטבה טובה של החניטים	0.05 (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	3-4 שבועות אחריchia שיא פריחה	רישוט	הגדלת הפרי קיוי מזני היורד וברוננו	
טבילה של 1-2 שניות	0.075-0.05 (7.5-5 סמ"ק/10 ל' מים)	לאחר גמר פריחה וגמר נשירות חניטים כארט שרל כ-6 מ"מ	טבילה	הגדלת הפרי ושיפור התאמתו גפן מזני סופירור ותומפסון	
הרטבה טובה מאד של האשכולות עד נגירה	0.1 (100 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	רישוט			
בעצם בגובה 3.5 מ"-100 ל"ד. הרטבה טובה ללא נגירה.	0.1 (100 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	14 ימים לאחר שיא הפריחה	רישוט	agation בזנים במטע בעבול חויזי של 2.5 ט'/ד' ומעלה	ספdoneה וקוויציה

הוראות לטיפול גפן:

- בגן מZN סופירור בטיפולי טבילה בלבד, ניתן להוסף ג'יברליין ברכוץ 5-10 ח'מ'.
- בגן הטיפולים עם סיפיון הוסף משטח טריטון-x-100 ברכוץ של 0.025%.
- בגן טיפול בסיפיון גורם לאירוע בהבשלה הפרי של שבוע עד שבועיים. היורד 6 שעות לאחר הטיפול לא פוגם בפעולות התכשיש. מנע רוחף התרטס לגידולים שכנים.
- בגן חיבים להקפיד על טיפולים מודויקים על מנת שהאשכול יהיה מדויל היטב. במקורה של ציפויות יתר חיבים לדלן בדור האשכול כדי לאפשר גידילה תקינה של הגנרים. צירר לטיים את הדילול הידני עד הבוחל.

שילובים:

בגן ניתן לשלב עם ג'יברליין ומשטח טריטון-x-100 כמפורט לעילו. אין לפ' שעיה מידע לגבי שימושים אחרים.

ציוויליזו:

במטעים ניתן לרוטס עם כל מרטס המתאים לרישוט נס' בפח התרטס מספיק להרטבה טובה של החניטים. רצוי לכון את הריסוט לאזורי החניטים.

תרכיב מתחולב. מוסות צמיחה המסייע להגדלת הפרי בקיוי, באגס ובגפן ולשיפור השתמרות הפרי בgefן.

כללי: כל: L/g 10 ppm (CPPU) Forchlorfenuron (CPPU)

סיפיון הנה תכשיר הרכומוני סיסטמי נזלי בעל פעילות ציטוקינית. עם חידורתו לרקמות החניט, הוא מזרד את חלוקת התאים וכתוצאתה מכך מסייע להגדלת הפרי. בגין הסיפיון מחדן שדרת האשכול ועוקציו הגנרים ומפחית נשירתם בהבשלה. בתנאי בקנה מידה מצומצם בלבד. שימ לב לתנאי המכירה הרשומים בתווית.

אין לטפל בסיפיון בזמן שרב או כאשר הצמחים סובלים מעקה. סיפיון פועל כמוסות צמיחה, חברות אגן אינה אחראית לפעולות התכשיש ותוצאתו בתנאים אלקלים קיצוניים והשפעתם על המצב הפיזיולוגי של הצמח, או בנסיבות מוקדם או כאוחר מההמולץ לכל הטיפולים עם סיפיון הוסף משטח טריטון-x-100 ברכוץ של 0.025%. רסס בשעות הבוקר המוקדמות או בלילה. גשם הירד 6 שעות לאחר הטיפול לא פוגם בפעולות התכשיש. מנע רוחף התרטס לגידולים שכנים.



מ' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2000/גה"צ/1600

- אריזות: 1 ל'
- מיצר ע"י Alzchem Trostberg GmbH - מסוכן
- שיווק ע"י ADAMA אגן

פִּיקָּוְןִי

תרכיז נוזלי.

לויסות צמוח בכותנה.

מכיל: L/g 50 Mepiquat chloride 50

כלל:

פִּיקָּוְןִי הננו תכשיר המיעד לעצירת צמוח של כותנה ע"י ריסוס נוף הצמחים בחלקות עם נטייה לצמוח מופרץ. התכשיר מէצר את המפרקיים באכרי הצמח ופותח את נוף הצמחים לחדרה עיליה של ריסוס בקוטלי חרקים ומפחית ריקבונות הלקליטים.

הוראות שימוש:

lezzerת צמוח בכותנה מדני אקלה ופירמה ינתן ריסוס אחד כאשר הצמחים הגיעו לגובה ממוצע של 100-110 ס"מ. גשם או הכטורה תוך 8 שעות מהרישום עלול לפגום בייעילות הטיפול.

פִּיקָּוְןִי נתן תוצאות טובות גם בריסום מפוצל (בשתי ריסויים), ובכותנה גבוהה להפסקת צמוח. בטיפולים אלה צריך להיעזר בניסיון המקום.

הgidol	המינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל"ד')
כותנהZN אקלה	200-150	5-3 - מהאויר 20-10 - מהקרקע
	250-200	

שילובים:

פִּיקָּוְןִי ניתן לשילוב עם מוסופיל, טיגר, פולירם DF או סיגנות. לפני ריסוס בכל שימוש אחר בדוק לבתיחות על מספר מצומצם של צמחים.



מ"ס הרישון של השירותים להגנת הצמח וליביקורת: 81/הגה"צ/438
• אריזות: 5 ליטר
• דרגת רעלות: IV - מסוכן
• מיוצר ע"י BASF
• משוק ע"י ADAMA אגן

פריגן אקסטרה PRIGAN EXTRA

מחיר נזול:

מוסות צמיחה לדילול חניטים ולהגדלת ממד הפרי בזני הדרים שונים.

כללי:
מכיל: L/g 60 k-prop dichloro בצורה של מלח אשלגנו.

פריגן תכשיר הורכונלי נזול מקובצת הפנוקסיבעל פעילות אוקסינית. עם חידורתו לרחמות החניטים, הפריגן מזרץ את גידילת התאים ותוצואה מכך מסיע להגדלת הפרי.

פריגן אקסטרה פועל כמוסות צמיחה. חברת און אינה אחראית לפעולות התכשיר ותוצאותיו בתנאים אקלימיים קיצוניים והשפעתם על המצב הפיזיולוגי של הצמח או בישום מוקדם או מאוחר מהمولא. שים לב לתנאי המכירה בסוף התווית.

הערות לטיפול:

אין לרוסס ברוחה. מנע רוחף התרטס לגידולים שכנים. בהיות החומר הורכונלי, עלותות כמותות זעירות ביותר של רוחף לגרום לנזקים קשים לגידולים רגשיים כמו כותנה, גפן, עגבניות, קק'ו ואחרים. רצוי לרוסס בטיפות גדולות. אין לרוסס על עצים צפאים או בcasts עלה. אין לרוסס בטיפורות גבוהות או בתנאי שרב ו/או כאשר צפואה טמפרטורה גבוהה ביחיד או שב 24 שעות ממוקד הריסות.

טבלת שימוש:

נפח התרטס	הרכיב (%)	מועד הטיפול	מטרת השימוש	הגידול
250-350 ל"ד ל-פ' גודל העצים	0.1% (100 סמ"ק 7-100 ליטר מים)	כasher קוטר החניטים הממוצע הוא 20 מ"מ	דילול חניטים והגדלת ממד הפרי	הדרים: שמות, ולנסיה, סטר רוב'
		כasher קוטר החניטים הממוצע הוא 10-20 מ"מ		קליפים: מיכל, נובה, אורה, נקטר, אור*

*** קליפים:**

רישום על חניטים קטנים בטוווח ההמלצה בדרך כלל גם מדיל פרי.

לכל הטיפולים עם פריגן כומלץ להוסיף חומר הדנה המשפרים את יעילות הטיפול כדלהלן:

שילוב א' - "בונוס" בריכוז של 4%-5%.

שילוב ב' - חנקת אשלגן בריכוז 4%-5% + משטח (טריטון B-1956 או טיבולין בריכוז של 0.025% + חוכזה זרחתית בריכוז 0.075%). (אין לפ' שעה מידע על שילובים אחרים)



מ' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 07/הגה"ץ/1891

- אריזות: 5 ליטר
- דרגת רעלות: 7A - מסוכן
- מיוצר ע"י Nufarm
- משוקע ע"י אדמה אגן

איירוגן IROGAN

כלאט ברזל בצורת גרגירים מסיסים במים לתיקון מחסור ברזל (כלורוזה) באגוזי אדמה ומנגנו.

מכיל: 6% ברזל בצורת כלאט Fe EDDHA

* 4.0% בצורת AHA Ortho-Ortho-Ortho שיטת בדיקה-2 EN13368 EN של ה-EU

כלי:


התואריית הגוגנירית מתומססת במחירות במים, אינה מתקיפה ואני גורמת אבק.
מתאים לישום בריסוס ואמצעות מערכת ההשקה.

הערות לטיפול:

החומר מתפרק בחשיפה ישירה לקרני המשמש; על כן רצוי להחדרו לתוך הקרקע מיד לאחר השימוש הקפץ שהשימוש יעשה באזרע בו מפותחת מערכת השורשים של הגידול.
בכל מקרה יש להמיס את החומר בכימ ולישם אותו בצורה תכисה.

הgidol	המינון (gram/d')	הערות
אגוזי אדמה	400-250	בפס הדרישה, בריסוס או לקראת סיום ההשקה בהמטרה. מספר היישומים בהתאם לצורכי*.
מנגו	100 גרם/עץ/עונה	לקראת סיום ההשקה בטפטוף.

*טיפולים חוזרים ינתנו בהתאם למצב הכלורוזה.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 2008/הגה"צ/1959

• אריזות: 5 ק"ג 1 ק"ג • דרגת רעליות AI - מסוכן

• משוק ע"י אדמה אגן

• מיוצר ע"י Nouryon

בוליקל XP

הערות	המינון לישום	הגידול
"ישומים חוזרים ינתנו בהתאם לרמת הכלורוזה"	400 גרם\דונם	מטעים: אבוקדו, אגס, אפרסמן, אפרסק, בננה, גויאבה, גפן, הדרים, חbos, מנגו, נקטרינה, קיווי, שקד, תפוח אגוזי אדמה ירקות: מלפפון, עגבניה, פלפל
	0.4 גרם\מ"ר	פרוחים: עצובונית (רוסקוין), שושן צחור
	1.6-0.4 גרם\שתיל	משתלות עצי פרי

כלאט ברזל בצורת גרגירים מסיסים במים לתיקון מחסור ברזל (כלורוזה) בגידולים שונים.

מכיל: מכיל 6% ברזל בצורה כלאט של HBED-Fe. 100% מהברזל בצורה Ortho-Ortho-EU לפי שיטת בדיקה-2 EN13368 EN של האיחוד האירופי.

התוארייה הגגרית של החומר אינה גורמת לאבק וכתוצאה מכך במים

הערות לטיפול:

החומר מתפרק בחשיפה ישירה לקרני השמש, על כן רצוי להחדרו לתוכה הקרקע מיד לאחר השימוש. יש להקפיד שהשימוש יעשה באזורי בו מפותחת מערכת השורשים של הגידול. במקומות מושקים בטפטוף מטפלים מתחחת לטפטפות, במקומות מושקים במרתפים - באזורי ההרטבה. בכל מקרה נדרש להזכיר את החומר בשליש האחרון של השקיה. ניתן לישם את התכשיר גם דרך דוד הדישון או משאבת דשן באמצעות מערכת ההשקה. בכל מקרה יש להפעיל את מערכת ההשקה מיד לאחר השימוש.

שילובים עם דשנים:

התכשיר ציב בתחום 3.5-12 H.p.



- מ' הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2015/גהה"צ/4302
- אריזות: 5 ק"ג, 25 ק"ג
 - דרגת רעלות IV - מסוכן
 - מיוצר ע"י Nouryon
 - משוקע ע"י אדמה אגן

לפני השימוש יש לחקור את הנהניות המופיעות בתווית התכשירים.



מס' הרישון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 85/ הג"ץ/886
• אריזות: 25 ק"ג • דרגת רעליות IV - מסוכן
Prince Erachem Mexico
• מיוצר ע"י: Prince Erachem Mexico
• משוקן ע"י: אדמה אגן

גופרת מנגן

אבקה מסיסה לתקן חוסר מנגן בהדרים.

מכיל: $\text{O}_2\text{H}_4\text{MNSO}_4$ בריכוז 32.2% מנגן מתחתי.

הוראות השימוש:

הטיפול בגופרת מנגן מיועד לריסוס בעצים המראים סימני מחוסה.

הכנת התרכז:

ערביב את הנקודות הדורשיה של גופרת המangan בכל קטן עם כים, הפעל את המערבל, אחר כך שפוך את התרכז לתוך מכל המרסס המלא חצי במים והוסיף את שארית כמות הימיים ובסוף את המשטח.

הכינון:

גופרת מנגן בריכוז 0.2% בתוספת משטח טרייטון B-1956 בריכוז 0.025%. לריסוס זה ניתן להוסיף אבץ לפי הצורך.

נפח תרסיס:

400-300 ליטר/ד'.

SELFIE STREAM

גיגרים מסיסים

חומר הזנה המכיל 6% ביחס נוטן תగובה מהירה ולאורך זמן.

גיגרים מסיסים בכימס 100% לטיפול בכלוחזה.

הערות לטיפול:

רצוי להחדיר את החומר בתורן הקורקע מיד לאחר ישוכנו. ציריך להקפיד שהיישום יעשה באזור בו מפותחת מערכת השורשים של הגידול. במטיעים מושקים בטפטוף מטפלים מתחת לטפטופת, במטיעים מושקים במתזים - באזור ההרטבה. ככל מקורה צריך להכניס את החומר במקומות ולישם אותו בצורה תמיונה. בישום באמצעות מערכת ההשקייה, עדיף להחדיר את החומר בשליש האחרון של ההשקייה. ניתן לישם את התכשיר גם דרך הדישון או משאבת דשן באמצעות מערכת ההשקייה. בכל מקורה יש להפעיל את מערכת ההשקייה מיד לאחר היישום.

המינון (גרם לדונם)	המינון (גרם לעץ/גפו)	הגידול
	5 לכל שנת גיל	מטעים וגפן צעירים
1500-800	50-25	מטעים וגפן בגיגרים
500- 250		ירקות
500-250	1 גרם למטר רבוע	צמחוני
1000-500	2-5 גרם למטר רבוע	פרחים

שילובים עם דשנים:


התכשיר יציב בתחום 3.5-11 H.c.



- דרגת רעלות IV - מסוכן
- מיוצר ע"י Deretil, Spain
- משוקע ע"י אדמה אן
- אריזות: 1 ק"ג, 5 ק"ג

perlka

תיאור פירוק הפלקה בקרקע וסיכון ההשפעות של החומר בקרקע באירופה



Incompatible for weeds

The first PERLKA® conversion's incompatible for weeds in the germination phase up to the small rosette stage (two to four leaves). This can significantly reduce the need for weed control measures later on (e.g. hoeing).

Existing plantings are not damaged by the correct fertilisation with PERLKA®. If weeds, that are difficult to control occur, it is advisable to combine calcium cyanamide fertilisation with chemical control measures.

Weeds sensitised to calcium cyanamide allow greater flexibility in the choice of herbicide application rates.

Pathogenic fungi are sensitive

Intensive research over decades has shown that numerous fungi are sensitive to the effects of calcium cyanamide and can be kept below the economic damage threshold. Scientific trials and practical observations have shown that fallen leaves are decomposed more rapidly and thus the pressure of infestation by apple scab is reduced. Reductions in infestation have also been observed with collar rot, raspberry cane blight, leaf spot in currants and American mildew in gooseberries. Soil-borne pathogens such as Phytophthora spec. and Verticillium spec. can be significantly reduced by using PERLKA®. Tests have shown that calcium cyanamide also counters soil exhaustion by stimulating the natural biota.

Insect pests are sensitive

Slugs, Snails and their eggs are very sensitive to calcium cyanamide and rarely become a problem in crops. Cockchafer grubs and wireworms can be reduced in numbers with calcium cyanamide if they are in the upper soil layers. The development of young plants is not impaired by root feeding. The pupae of the cherry fruit fly are also sensitive to calcium cyanamide. The spring fertilisation with PERLKA® leads to a reduction of this pest.



- דרגת רעלות 7- א- מסוכן
- מיוצר ע"י Alzchem Trostberg GmbH
- משוק ע"י אדמה און
- אריזות: 25 ק"ג

דשן חנקני המכיל 40% calcium cyanamid (N - 19.8%)

מאפיין התוארי גורמים לכך שהחנקן המשחרר מתרcobת הציאנאמיד, נשאר זמין לצמח ואינו נשטרע עמוק בקרקע. לאחר תקופת (בהתאם לכמות שיושמה) הציאנאמיד מתפרק לאוראה ואחר כך לאטמו וניטרט, המביא לזרימות חנקן יציב ו אחיד לאורך זמן. מרכיב הסידן מונע התפתחות תנאים חומציים ומשפרים את מבנה הקרקע.

כללי:

הנוחות ליישום:

"שם PERLKA" יעשה תכיך לפני זרעה או שטילה. יש לישם את הפלקה בכינון המכמלץ על גבי קרקע לחיה ומונקוזת. יש להציגו/להרחך את התכשיר מיד לאחר היישום לעומק הקרקע - עד המפורט בטבלת היישומים. קצב פירוק הפלקה מחיבר תקופת המתנה בין הזרעה/שטילה של 3 ימים על כל 10 ק"ג תכשיר שיישם. אין לישם הפלקה על צמחים קיימים.

טבלת גידולים והמלצות יישום

הgidol	מינון (ק"ג/דונם)	מועד יישום	ימי המתנה לפני זרעה
תפו"א	50	קדם זרעה	15
תות שדה (משתלות)	50	קדם זרעה	15
שומ	50	קדם נזיצת שננות	15
גזר	50	קדם זרעה	15
חסה	50	קדם שטילה	15
מלון	50	קדם שטילה	15



ADAMA
אֲדָמָה

דִּינֵּרְבִּיךְ



www.adama.com/israel-agan/he ADAMA Agan - אדמה אגן

אקטליק ACTELLIC

תרכיז מתחלב להדברת מזיקים.

מכיל: L/g 500 Pirimiphos-Methyl (זרchan אורגני, מעכב פעילות האנדים כולין אסטראז)
כללי:

אקטליק מיועד להדברת מזקי מחסן במחסנים ריקים, אסמים, מכגורות, מחסני אוניות וכו'. כמו כן להדברת מזקי גרעיני חיטה וشعורה, תירס וכו' באחסון.

התכשיר מותר לשימוש רק על ידי מודברים מוסמכים מטעם המשרד להגנת הסביבה.

אופן היישום:
הדברת מזקי מחסן:

א. גרעיני דגניים במכגורות: (חיטה, שעורה, תירס וכו') לכל טונה של גרעינים מורססים 16 סמ"ק אקטליק מדויל בLİטר כימם.
הרישום על שכבות גרעינים בעת מעברים על סרט נע.

ב. מחסנים ריקים לפני הטיפול יש לנחות את המחסן משאריות מזון או מספוא מאוחסן. הריסום יבוצע על הקירות והרצפה תוך תשומת לב לחריצים וודקים בהם מסתתרים המזיקים. המינון: מרססים אקטליק בריכוז 1% (10 סמ"ק ללייטר כימם), 5-10 ליטר כימם ל-100 מ"ר קירות / רצפה.

אפרון APRON XL

תחליב ריחוף.

קוטל פטריות סיסטמי לעיטוי זרעי כותנה, מיועד לשימוש במכוני זרעים ליישום בשיטת הבליל (Slurry).

Mefenoxam 350 g

אופן הכננת התמיסה:

נער היבט את אריזות התכשיר לפני השימוש. הפעל את המערבל. הוסף את הכמות הדרישה של אפרון למיל המכיל כמות מתאימה של כימם וערב עד לקבלת תרחיף אחיד. יש להקפיד על פעולות הערבול במשך כל זמן הטיפול. אין להלין תרחיף מוקן ליום המכחדת. אם מבצעים הפסקה קצרה בפעולות העיטוי, יש להפעיל את הבוחש מספר דקות לפני התחלת הטיפול מחדש.

טבלת היישום:

הgidol	המחלה	המינון (ליטר/טון זרעים)	צורת היישום
זרעי כותנה	מקמקת (פיטיון)	1.0	יש לדלול 1 ליטר תכשיר ב-11 ליטר מים לנפח סופי של 12 ליטר. כמות זו מיועדת ל-1000 ק"ג זרעים.



- מס' רישיון השירותים להגנת הצומח ולביטחון: 99/הגה"ץ/539
• סיווג FRAC: 1 • דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
• אריזות: 5 ליטר • מיוצר ע"י Ag Syngenta Crop Protection
• משוק ע"י אדמה אגן

- מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח 2022/הגה"ץ/4625
• דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
• סיווג FRAC: 4 • מיוצר ע"י חברת Ag Syngenta Crop Protection
• אריזות: 5 ליטר • משוק ע"י אדמה אגן

בוסן BUSAN

תרכיז רחיף.

קוטל פטריות נזלי לחיטוי זרעי אגדוי אדמה, כותנה, פקעות וbzלי פרחים.

מכיל: 30% TCMTB (Benzothiazole) (Thiocyanomethylthio) 2-

הערות לטיפול:

אין לחטא פקעות ובצלים לאחר שהחלה הופעת שורשים. את הפקעות והבצלים יש לאחסן לאחר שהתייבשו מהחיטוי.

הוראות השימוש:

א. לחיטוי זרעי אגדוי אדמה וכותנה במקוני זרעים בלבד

1. חיטוי זרעי אגדוי אדמה

החיטוי יעשה במתוךן של חיטוי בונפה מוקטן בתروسיס של 1:2, בכמות של 200 סמ"ק תרסיס ל-100 ק"ג זרעים.

2. חיטוי זרען כותנה

להדברת ריזופואו ופטריות אחרות בחיטוי סולאר.

הכינון: 800 סמ"ק תכשיר לכל טונה זרעים בתוספת מים לפי יכול כל החיטוי.

ב. לחיטוי בצלים ופקעות של איריס, נרקיס וסיפן לפריחה ולריבוי להדברת פוזריום ופניציליום.

החיטוי יעשה בטבילה באחד המודדים הבאים:

1. מיד לאחר הוצאת הבצלים או הפקעות מההקרקע.

2. לפני האחסון.

3. לפני השטילה.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח: 77/הגה"צ/628
• דרגת רעללות III - מסוכן לבリアות
• סיווג FRAC: P2
• מיזוג ע"י Buckman Laboratories
• אריזות: 5 ליטר
• משוקע ע"י ADAMA אגן

DIVIDEND

תרחיף זרים.

קוטל פטריות סיסטמי לעיטוי זרעי חיטה, מיועד לשימוש במכוני זרעים לישום בשיטת הבליל (Slurry).

מכיל: L/g 30 Difenoconazole

הגידול	המחלה	המינון (ליטר/טון זרעים)	אופן הכנה התמיisha
זרעי חיטה	פחמן פורה, כתמי שרש חומיים (המינטוספורים), רבון צוואר השורש (פוזרים), מקן שורש (רייזוקטוניה)	1.0	נער היבט את אריזת התכשיר לפני השימוש. הפעל את המערבבל. הוסיף את הכמות הדרישה של DIVIDEND למיכל המיכל כמות מתאימה של מים, עד לקבלת תרחיף אחיד. יש להקפיד על פעולות הערבול במשך כל זמן הטיפול. אין להלין תרחיף מוקן ליום המחרת. אם מבצעים הפסקה קצרה בפעולות העיטוי, יש להפעיל את הבוחש מספר דקות לפני התחלת הטיפול מחדש.

שילובים:

ניתן לשלב בחיטה DIVIDEND עם קרוזה.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח: 4626/הגה"צ/4626

- סיווג FRAC G1: דרגת רעלות IV - מסוכן
- מיעור ע"י Syngenta Crop Protection Ag
- ארייזות: 5 ליטר
- משוק ע"י ADAMA אגד

לפני השימוש יש לקרוא את הנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

CENTRINO O

תרחיף זרים.

הטכשיר מיועד לטיפול זרים במקון זרים.

Tebuconazole 6.66 g/L + Fludioxonil 33.3 g/L + Imidacloprid 321 mg/L

כללי:

הטכשיר מושלב של שני קוטלי פטריות וקוטל חרקים, כולם בעלי פעילות סיסטמית לעיטוי זרים בשיטת הבליל. שני קוטלי הפטירות בעלי כונגננו פעולות שונות. השימוש בתכשיר מוגן מפני כוחות נוף וקרקע שונות שנמצאות הן על פניו קיליפת הזרע והן בתוכו. בנוסף, התכשיר מדבר כנימות על השלבים הראשונים של הגידול. התכשיר מוקן לשימוש לאחר מיחול במים.

הנתת התריסיס: נער היבט את הארייה. הנק את תמייסת הריסוס לפיה העורות בטבלת השימוש. אין להלן תמייסה מוכנה ליום המחרת. אם מבצעים הפסקה קצרה בפועלות העיטוי יש להפעיל את הבוחש מספר דקות לפני התחלת הטיפול מחדש.

הערות לטיפול:

טיפול בזרים לזרעה בלבד. אין לרסס על זרים לאכילה, להאבסה או לכל שימוש תמייסה אחרת. אין לשמר תמייסה מוכנה. סמן את אריותות הזרים המטופלים כ-אסורים למأكل אדם או בעלי חיים. אין להאביס או לרעות בעלי חיים בשטח שבネット מזרעים מטופלים. אין להשאיר זרים מעוטרים חשופים על פני הקrkע בשולי השורות הזרועות. להגנה על ציפורים ויונקים, יש לזרע את הזרים לעומק הזרעה המותאים ולדאג לכיסוי הזרים ולהידוק הקrkע.

טבלת השימוש:

הערות	המינון (ליטר תכשיר/1 טון זרים)	הפגיעה	הגידול
יש לדל 2 ליטר תכשיר בכמות של 13 ליטר מים לנפח סופי של 15 ליטר תמייסה לטון זרים. מכיל: L/g 321 mg 321 mg/L + Imidacloprid 321 mg/L + Fludioxonil 33.3 mg/L	2	כニמת על הדגן, חולdon צחוב, חולdon העלה, חולdon הקנה	חיטה
		כニמת על הדגן, קימוחן השועורה, הלמינטותופוריום	שעורה

שילובים:
אין מידע על שימושים.



מספר הרישון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2015/הגה"ץ/4253
סיווג FRAC E2+G1 : 4A
סיווג IRAC 4A : 4A
משוק ע"י אדמה אגן
אריזות: 5 ליטר

סלסט טופ CELEST TOP

טבלת הייעום:

הערות	המינון (ליטר/טון זרעים)	הפגיעה	הגידול
דיל 1.3 ליטר תכשיר ב-8.7 ליטר מים לנפח סופי של 10 ליטר. כמות זו מיועדת ל-1000 ק"ג זרעים. מכיל: L/g 25.0 g/L + Difenoconazole 25.0 g/L + Fludioxonil 25.0 g/L	1.3	פחסן פורח, כתמי שרש חוכמים (הלומיינטוספורויום), מק-שורש (ריזוקוטוניה), כנימת על הדגן, חיופשית פרעושית (<i>Cuprea psylloides</i>), חיופשית רחבות בטן (<i>Marseulia dilativentris</i>)	חיטה

שילובים:
אין לשלב סלסט טופ עם תואריות המכילות ממסים אורגניים.

תרחיף זרים:
קוטל פטריות וחרקים המיועד לעיתוי זרעי חיטה.
מיועד לשימוש במוכני זרעים בשיטת הבליל.

Thiamethoxam 262.5 g/L + Difenoconazole 25.0 g/L + Fludioxonil 25.0 g/L

כללי:
קוטל פטריות וחרקים סיסטי משלב, המיועד לעיתוי זרעים בשיטת הבליל (Slurry). סלסט טופ מכיל 3 רכיבים פעילים:
Difenoconazole - מעכב התפתחות פטריות ע"ז התערבות בביוסינטזה של סטרולים במمبرנת התא.
Fludioxonil - קוטל פטריות המעכב את האנזים פרוטאין קינאז, המעורב בתהליכי העברת חומרים במمبرנת התא של פטריות רגניות.
Thiamethoxam - קוטל חרקים סיסטי פועל במעג וביבליה, הנמנה על קבוצת הניאו-ニיקוטינואידים ונועד להגן על הזרע הנובט מפני מזיקי קרקע רגשים וכן מפני חרקים מוצצים בשלבי הנביעה וההצעה.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח: 2022/הגה"צ/4627
 • סיווג FRAC E2+G1: • דרגת רעלות III - מסוכן לבリアות
 Syngenta Crop Protection Ag 4A: • מיוצר ע"י IRAC 4A: • מסוכן לבリアות
 • אוריוזות: 5 ליטר • מסוקן ע"י אדמה אגן

קרוזר CRUISER

תרחיף זרים.

קווטל חרקים המיעוד לעיטוי זרעים חיטה, חימצה, אבטיח וכותנה. מיועד לשימוש במכוני זרעים בשיטת הבליל.

Thiamethoxam 350 g/L

כללי:

קווטל חרקים סיסטמי המיעוד לעיטוי זרעים בשיטת הבליל (Slurry). התכשיר פועל על המזיקים במגע ובליה ונמנה על קבוצת הנאוניקוטינואידים. קרוזר שנמצא על הזרע המועטה "קלט בaczח הנובט ויגן עליי מפניהם קרקע רגשיים וכן חרקים מוצצים בשלבי הנביטה וההצחה. כאשר קליפת הזרע העטוייה בקרוזר נשארת בצדדים לשורשון ואשר הקרקע רטובה, משך הפעולה נגד מוצאי עלווה עשוי להתארך.

טבלת היישום:

הערות	המינון (ליטר/טון זרעים)	המזיק	הגידול
دلל 1 ליטר תכשיר-ב-9 ליטר מים לנפה סופי של 10 ליטר. כמות זו מיועדת 7-1000 ק"ג זרעים.	1.0	חיפושית פרעושית (<i>Cuprea psylloides</i>), חיפושית רחבת בטן (<i>Marseulia dilativentris</i>)	חיטה מהזנים: גליל, נירית, גדרה ויובל
دلל 1 ליטר תכשיר-ב-7 ליטר מים לנפה סופי של 8 ליטר. כמות זו מיועדת 7-1000 ק"ג זרעים.	1.0	רימת הדזוב מיקרופזה (Micropoza negra)	חימצה מהזן ירדן
دلל 5 ליטר תכשיר-ב-5 ליטר מים לנפה סופי של 10 ליטר. כמות זו מיועדת 7-1000 ק"ג זרעים. עיטוי זרעים בקרוזר ימנע נגיעות בכנימות עליה על נוף האבטיח בתקופת ההצחה ובשלבי התפתחות המקדמים.	5.0	כנימת עלה הדלוועים	אבטיח מהזן מללי
دلל 4 ליטר תכשיר-ב-8 ליטר מים לנפה סופי של 12 ליטר. כמות זו מיועדת 7-1000 ק"ג זרעים. עיטוי זרעים בקרוזר יפחית את הנגיעות בכנימות עליה על כוותנה בתקופת הרחצתה וההתבססות ועד חדש מזרעה.	4.0	כנימת עלה הדלוועים	כוותנה

שילובים:

בחיטה: ניתן לשלב עם דיזידנד.

אין לשלב קרוזר עם תכשירים שבתואריותיהם ממסים אורגניים.



מס' הרישון של השירותים להגנת הצומח: 4631/הגה"צ/2022

- סיווג IRAC: 4A
- מיוצר ע"י Agro Syngenta Crop Protection
- משוק ע"י ADAMA אדמתה אגן
- אריזות: 5 ליטר

