

בויסטין BAVISTIN

קוטל פטריות סיסטמי להדברת מחלות בגידולים חקלאיים - גרגירים רחפים.
מכיל: carbendazim 50%

הוראות השימוש

ניתן להשתמש בבויסטין בגידולים בשטח הפתוח ובגידולים חסויים.

הדברת קשיוניה גדולה: הפטרייה פעילה במשך חודשי החורף, פוגעת בגבעולים, בעלים, בפרחים ובפירות. לחות גבוהה וצפיפות רבה בגידול מסייעים להתפתחות המחלה, כמו כן יש חשיבות רבה לרמת הנגיעות שהייתה בגידול הקודם. שטח שהיה נגוע בעבר במחלה רצוי לחטא כדי לקטול את הקישיוניות בקרקע. במשך עונת הגידול ניתן למנוע את הנגיעות ע"י ריסוסים בבויסטין מהתחלת הפריחה ואילך. ניתן למנוע במידה מסוימת את חדירת הפטרייה לגבעולים ע"י הגמעת תרסיס בויסטין בקרקע ליד הצמחים.

הערה: במקומות בהם התפתחה עמידות הפטריות לבויסטין, אין להשתמש בתכשיר.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 73/הגה"צ/120

FRAC סיווג: B1

דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס

אריזות: 1 ק"ג

מיוצר ע"י חברת BASF, גרמניה

משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת השימוש

הגידול	המחלה	מינון לדונם או ריכוז	מרווחי הריסוס	נפח התרסיס	טיפול אחרון לפני האסיף (ימים)
עגבנייה, פלפל, חציל	קימחונית, קשיוניה גדולה	40 גרם	אחת ל-7 ימים	20-50 ל"ד'. בעגבניות בהדליה עד 100 ל"ד'.	7
		80 גרם	אחת ל-14 ימים		
סלרי	כתמת (צרקוספורה), קשיוניה גדולה	40 גרם	אחת ל-7 ימים	20-50 ל"ד'.	7
		80 גרם	אחת ל-14 ימים		
מלפפון, קישוא, מלון	קשיוניה גדולה	40 גרם	אחת ל-7 ימים	20-50 ל"ד'. במלפפונים בהדליה עד 100 ל"ד'.	7
		80 גרם	אחת ל-14 ימים		
מלפפון	ריקבון-הכתר (פוזריום) בדלועיים	0.2 גרם לשתיל	שבוע לאחר שתילה, אחר כך כל שבועיים	הגמעה (בנפח של 0.25 ל"ש/שתיל)	7
חסה	קשיוניה גדולה	80 גרם	אחת ל-7-14 ימים	30-50 ל"ד'.	7
תות-שדה	קימחון תות-השדה, קשיוניה גדולה	80 גרם	אחת ל-7 ימים	30-50 ל"ד'.	7

בויסטין (המשך) BAVISTIN

הגידול	המחלה	מינון לדונם או ריכוז	מרווחי הריסוס	נפח התרסיס	טיפול אחרון לפני האסיף (ימים)
אגס	גרב האגס, במטעים בהם לא התפתחה עמידות	0.05%-0.03% הריכוז הגבוה יינתן עם הופעת הנגיעות	בתחילת העונה - מהלבלוב עד סוף אפריל כל 7-10 ימים. בהמשך העונה - מסוף אפריל עד סמוך לקטיף כל 10-14 ימים	100-200 ל"ד' לפי גודל ונפח העצים	7
תפוחי עץ	גרב התפוח, במטעים בהם לא התפתחה עמידות	0.05%-0.03%	אחת ל- 7-14 ימים מראשית הלבלוב	100-200 ל"ד' לפי גודל ונפח העצים	7
שזיף, משמש, שקד	ריקבון חום (מוניליה)	0.05%	טיפול ראשון עם ראשית הפריחה והלבלוב. ריסוס שני לפי הצורך כעבור 10 ימים.	100-150 ל"ד'	
פרחים כללי	קשיוניה גדולה	40 גרם	אחת ל- 7 ימים	20-50 ל"ד'	
		80 גרם	אחת ל- 14 ימים		
		0.06%	אחת ל- 10 ימים	מעל ל- 100 ל"ד'	
סייפן	מגלת (פוזריום)	60 גרם	אחת ל- 7 ימים	20-30 ל"ד'	