

ברוויס BREVIS

מווסת צמיחה המיועד לדילול חנטים בתפוח - גרגירים מסיסים
מכיל 15% Metamitron השאר חומרי דילול והרטבה

ברוויס הינו תכשיר ייחודי המכיל מטאמיטרון ופורמאט הסידן. ברוויס מווסת זמנית את תהליך הפוטוסינתזה בעצים שיגורם לנשירת חנטים קטנים ותורם לשיפור הגודל ואיכות היבול.

הוראות השימוש

התכשיר מיושם לאחר חנטה. ניתן לתת ריסוס עוקב לפי טבלת השימוש. לפני היישום יש להתייעץ עם איש החברה או עם המדריך האזורי.

הערות לטיפול: לפני היישום יש להתייעץ עם איש החברה או עם המדריך האזורי.

עננות כבדה ו/או טמפרטורות גבוהות. בלילה בתקופת היישום יגבירו את השפעת הטיפול. קרינת שמש חזקה ו/או לילות קרים יקטינו את השפעת הטיפול. יש לבדוק את תחזית מזג האוויר לשבוע שלאחר הריסוס המתוכנן כחלק מתכנון מועד הריסוס והמינון של הברוויס. ריסוס תחת רשת צל או רשת ברד יגביר את השפעת הטיפול. אין לרסס ברוויס בטמפרטורות שנמוכות מ-10°C. מומלץ לרסס בטמפרטורות שנמוכות מ-25°C. גשם לאחר שעתיים ממועד הריסוס לא ישפיע על יעילות הטיפול. אין לרסס על עלווה רטובה. לא מומלץ לרסס ברוויס בעצים צעירים, שגילם פחות מ-3 שנים. ברוויס אינו סיסטמי. הריסוס ישפיע רק על עלוות העצים שכוסו ע"י תמיסת הריסוס. אסור לרסס קוטלי עשבים במטע שבוע לפני או אחרי הריסוס עם ברוויס. אין לרסס יותר מפעמיים באותה עונה.

אופן הכנת התרחיץ: מלא את מיכל המרסס עד מחציתו במים והוסף את הכמות הדרושה של התכשיר למיכל תוך כדי בחישה. השלם את כמות המים החסרה והפעל את הבוחש עד תום הריסוס.

שים לב: אין להפסיק את פעולת המערבל משך כל תקופת המילוי ועד להתרוקנות המכל.

אם המרסס עמד עם התרסיס במשך זמן ניכר ללא ערבול צריך לערבב את התרסיס היטב לפני התחלת הריסוס.

ציוד הריסוס: ניתן לרסס עם כל מרסס המתאים לריסוס מטעים בתנאי שיספק את נפח התרסיס הרצוי.

נפח התרסיס: 110-140 ל"ד' בהתאם לגודל העצים. צריך לכסות את כל נפח העלווה בתמיסת הריסוס. הימנע משימוש בכמות עודפת של תרסיס ונגירתו לקרקע.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4233/צ/הגה/2014

אריזות: 1 ק"ג

דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרסס - לאחר התייבשות התרסיס

מיוצר ומשווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת השימוש

מועדי היישום לפי גודל החנטים**		המינון	הריכוז (%)***	הגידול
12-10 מ"מ	8-6 מ"מ	170-120 *גרם/ד'	0.12	תפוח בזנים: זהוב, גאלה
12-10 מ"מ	8-6 מ"מ	200-150 *גרם/ד'	0.14	תפוח בזן: סטרקינג

* המינון הגבוה כאשר יש ציפייה ליבולים גבוהים.

** היישום השני יבוצע לאחר התייעצות עם איש החברה או עם המדריך האזורי. הריסוס השני ינתן לא פחות מ-5 ימים ממועד הריסוס הראשון.

*** בריסוס לפי ריכוז, אין לעבור את הכמות המקסימלית של החומר בגרם/דונם לכל זן של תפוח, כפי שמופיע בעמודת "המינון" של אותו זן.

שילובים: אין לשלב ברוויס עם משטחים או כל תכשיר אחר. צריך להתייעץ עם המדריך או חברת אדמה אגן לפני שמרססים כל תכשיר שבוע לפני הריסוס עם ברוויס או לאחריו.