

דורמקס DORMEX

תרכיז שבירת תרדמה לשיפור התעוררות ולהפגשת פריחה עם זנים בעצי פרי נשירים וגפן - תרכיז נוזלי
מכיל 500 גרם בליטר (NH₂-CN) - cyanamide

הוראות שימוש

הטיפול בדורמקס (אלזודף) יעשה תמיד בעונת התרדמה של העצים (פרט למנגו). המועד האחרון לריסוס בתכשיר יהיה 30 יום לפני הפתיחה הטבעית של הפקעים. הריסוס צריך לכסות היטב את הפקעים. התכשיר צורב צמחים ירוקים, לכן בעת הטיפול צריך למנוע התזת התמיסה לגידולים שכנים.
כאשר דורמקס מרוסס למטרת הפגשת פריחה עם המפרים, יש להקפיד שיימצאו דבורים בשטח מתחילת הפריחה.

מספר הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 82/הגה"צ/613
דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות; כניסה לשטח המרוסס - לאחר 72 שעות
אריזות: 5 ל", 20 ל"
מיוצר ע"י חברת AlzChem Trostberg GmbH, גרמניה
משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת שימוש

הגידול	הזן	הריכוז* (%)	נפח התרסיס (ל"/ד')	מועד הטיפול
גפן בגיל ניבה	פרלט, קרדינל, סופריוור	5-4	80-50	ראשית ינואר
	דן-בן חנה, סולטנינה	5-4	בהתאם לאורך הזמורות, כנדרש	סוף ינואר-ראשית פברואר
	זנים אחרים	5-4	לכיסוי טוב של הפקעים בתרסיס	30 ימים לפני התעוררות טבעית
מטרת הטיפול והערות: לשיפור ההתעוררות, רצוי לטפל לאחר הזמירה. בכרמים שזומרים מאוחר אפשר לטפל גם לפני הזמירה. המועד המיטבי של הטיפול עשוי להשתנות משנה לשנה. רצוי לקבוע אותו עם איש מקצוע ולפי ניסיון מקומי. באזורים רגישים לקרה ולברד צריך להימנע מטיפול מוקדם.				
אגס בגיל ניבה	קוסטיה, ספדונה	4	150-100 לפי גודל העץ	מחצית ראשונה של פברואר
מטרת הטיפול והערות: להפגשת הפריחה. אם ניתן לקבוע את מועד ההתעוררות הטבעית של הספדונה, אפשר לרסס את הקוסטיה בלבד 30 יום לפני כן. ריסוס שני הזנים ביחד עשוי לסייע להגדלת פרי הספדונה.				
תפוח בגיל הניבה (א)	ענה והזנים המפרים	2	150-100 לפי גודל העץ	סוף דצמבר
מטרת הטיפול והערות: מיועד בעיקר להפגשת הפריחה. אם ניתן לקבוע את מועד ההתעוררות הטבעית של הענה, אפשר לרסס את המפרים בלבד 30 יום לפני כן. הריסוס בענה משפר את נשירת העלים ומסייע בכך להשמדת העלים הנגועים בגרב.				
תפוח בגיל הניבה (ב)	זהוב, גרני סמיט, גרנד, יונתן, אורליאנס, דלישס	0.5	200-100 לפי גודל העץ	סוף פברואר-תחילת מרץ
הערות: מיועד לשיפור התעוררות במשולב עם שמן נרופז 80 או שמן נרותר בריכוז 3%-5% שים לב! הריסוס המשולב יינתן לפחות 30 יום לפני התעוררות הטבעית. לקביעת המועד רצוי להתייעץ עם המדריך.				

דורמקס (המשך) DORMEX

הגידול	הזן	הריכוז* (%)	נפח התרסיס (לי/ד')	מועד הטיפול
קיווי בגיל הניבה	ברונו, הייברד	4	80-100 לפי גודל העץ	אמצע פברואר עד תחילת מרץ
גודגן בגיל ניבה	זנים שונים	3-4	100-150 לפי גודל העץ	אמצע - סוף פברואר ובהתאם לטמפרטורות החורף
הערות: מיועד להפגשת הפריחה של זנים שונים ולשיפור ההתעוררות				
אפרסק בגיל הניבה	סמרסט	2	100-150 לפי גודל העץ	סוף פברואר
תאנים בגיל הניבה	זני בכורות	3	לפי גודל העץ עד הרטבה טובה	אמצע עד סוף ינואר
תפוח, אגס, אפרסק, נקטרינה, שיזף, משמש, גודגן - בשנתיים הראשונות לאחר נטיעה		2	לפי גודל העץ עד הרטבה טובה	כ-30 יום לפני התעוררות
מטרת הטיפול והערות: מיועד לקבלת התעוררות אחידה				
מנגו (לפי ניסיון מקומי)	זנים שונים	0.4	100-250 לפי גודל העץ	בפריחה מלאה של גל הפריחה הראשון לפני חנטת הפרי
מטרת הטיפול והערות: מיועד להשמדת תפוחות ראשונות				

* לכל הטיפולים בדורמקס (אלזודף) צריך להוסיף משטח טריטון x-100 בריכוז 0.025%