

חוט' סס הנמר LEOPARD MOTH ROPES

נדיפיות לבלבול זכרי עש סס הנמר

כל נדיפית מכילה לפחות 70 מ"ג (E,Z)-2,13-Octadecadienyl and (E,Z)-3,13-Octadecadienyl acetates

החוט'ים מנדפ'ים פרומון הגורם לבלבול הזכרים ומונע הזדווגות, ע"י כך מתקבלת פחיתה באוכלוסיית עש סס הנמר במשך כ-80 יום.

הוראות השימוש

שיטות התלייה: תלה בגובה 1 מטר מתחת לצמרת מחוץ לקרינה ישירה של השמש. מציבים את החוט'ים באופן אחיד ע"פ כל המטע, להוציא עצי שוליים, בהם מציבים חוט'ים בכמות כפולה.
הערה: יש לקשור בצורה רופפת ולהקפיד לא לשבור את החוט.
מועד הטיפול: צריך לתלות לפני גיחת הבוגרים מתרדמת החורף. באקלים לא קיצוני צפוי לקבל פיזור אחיד של הפרומון למשך כ-80 ימים.

הערות לטיפול: בשנה הראשונה צריך לשלב במשטר ההדברה ריסוסים עם קוטלי חרקים מתאימים או טיפול ידני עם השימוש בחוט'י פרומון, בהתאם לרמת הנגיעות. השימוש בקוטלי חרקים אחרים לא פוגם בפעילות הבלבול, לכן מותר לרסס בהתאם לצורך. קוטר הנדידה של הנקבה כ-6 מ', לכן יש סכנה של אילוח רק מחלקות לא מטופלות צמודות או מכיוון הרוח. מכיוון שהפרומון יותר כבד מהאוויר יש לו נטייה לשקוע לכיוון הקרקע. באזורים תלולים ליד כבישים מהירים ייתכן קושי של שמירת ריכוז הפרומון באוויר. במקרים כאלה ייתכן צורך לפיזור פעם נוספת. פנה לנציג החברה לייעוץ.
משך הפעילות של החוט מתקצר בתנאים של רוח תמידית וטמפרטורות גבוהות. בתנאים כאלה יש צורך להגביר את המינון או לתכנן משטר הדברה משולב עם קוטלי חרקים.

ניטור: היום אין שיטה יעילה לניטור המזיק באמצעות מלכודות פרומון. צריך לבצע פיקוח רציף לניטור נגיעות. במקרה של נגי' עות צריך להשתמש באמצעי ההדברה המקובלים.

מספר הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1853/ הגה"צ / 2005

מספר הגה"צ לחקלאות אורגנית: 7281

אריזות: חבילה מכילה 600 נדיפיות

דרגת רעילות IV - מסוכן

סיווג: פרומון

מיוצר ע"י חברת Shin-Etsu, יפן משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת שימוש

הגידול	המינון (חוטאים/דונם)	הערות
תפוח, אגס	60	
זית	65-45	בהתאם לרמת הנגיעות בכרם.