

ליאופרד LEOPARD

קוטל עשבים דגניים בררני - תרכיז מתחלב
מכיל 100 גרם בליטר quizalofop-p-ethyl

קוטל עשבים סיסטמי, בררני לגידולים רחבי עלים, המיועד להדברת דגניים חד ורב-שנתיים רבים לאחר הצטמם. ליאופרד נקלט בעיקר דרך העלווה. מספר ימים לאחר הריסוס נעצר צימוח הדגן, העלווה מצהיבה ולאחר מכן מתייבשת. סימני הפגיעה בעשבים ייראו תוך 2-4 שבועות ממועד הריסוס בהתאם למין העשב, גילו ותנאי האקלים.

הוראות שימוש

מועד הטיפול: ניתן לרסס את הגידולים המורשים בכל שלבי התפתחותם כל עוד העשבייה נמצאת בשלב מתאים להדברה ולא מכוסה על ידי הגידול. כדי לקבל הדברה מרבית יש לרסס על צמחים ירוקים ורעננים. אין לרסס גידול הנמצא בעקה (חמסין, יובש, קרה, פגיעה מקוטלי עשבים או כל גורם אחר). רצוי לרסס עשבים חד-שנתיים בשלב של 3-4 עלים עד תחילת הסתעפות, דורת ארם-צובא עד גובה 40 ס"מ ויבלית בגובה של עד 15 ס"מ. להדברת עשבים מפותחים יותר יידרש המינון הגבוה. צריך לרסס את העשבים לפני פריחתם. עשבים דגניים שטרם נבטו בעת הריסוס לא יודברו.

הערות לטיפול: יש לשמור על מרווח של לפחות 3 ימים בין הריסוס בליאופרד וריסוס כל קוטל עשבים אחר. לקבלת הדברה יעילה של העשבים הימנע מהשקיה בהמטרה ורצוי שלא ירד גשם עד חלוף 6 שעות מהריסוס. אל תרסס ברוח ומנע כל רחף לגידולים שכנים או לצמחים דגניים סמוכים.

עמידות: במספר מקומות בארץ התגלו אוכלוסיות של עשבים דגניים שפיתחו עמידות לתכשירים בעלי מנגנון פעולה מעכבי ACCase (קבוצה A). בכל מקרה של חשש לעמידות, צריך להשתמש בקוטלי עשבים בעלי מנגנון פעולה אחר. מכיוון שלא ניתן לצפות מראש את התפתחות העמידות והתפשטותה, היצרן ו/או המשווק לא נושאים באחריות כלשהי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהדברה לא מספקת.

גידולים עוקבים: בשדה שטופל בליאופרד אסור לזרוע גידולים רחבי עלים (פרט לאילי המורשים בתווית זאת) לפני חלוף 4 שבועות מהריסוס ואין לזרוע גידולים דגניים לפני חלוף 6 שבועות מהריסוס.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 01/הגה"צ/1627

HRAC סיווג: A

אריזות: 1 ל', 5 ל'

דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר 12 שעות

מיוצר ומשווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת השימוש

הגידול	העשבים המודברים*	ריסוס רצוף*** המינון (סמ"ק/ד')	טיפול במוקדים (הריכוז)	נפח התריס (ל'/ד')
גד"ש כותנה, אגוזי אדמה, בקיה, אפונה**, חמצה ירקות עגבנייה, פלפל, פפריקה, אבטיח, בצל, שום, כרוב, חסה מטע אגס, תפוח, (מהנטיעה) פרדס (מגיל 3 שנים)	דגניים חד-שנתיים: שיבולת שועל, שעורה, ספיח חיטה, ספיח תירס, מיני חפורית, זון, ברומית, זיפן, בן-חיטה, דורה רותמית, אלבסיני הודית, דוחנית התרנגולים, דוחנית השלחין.	100-50	0.25%	בהתאם לגובה העשבייה וצפיפותה. בריסוס רצוף: 10-30. בטיפול במוקדים: 40-20
	דורת ארם-צובא זרעים עד גובה 10 ס"מ צמחים מקנה שורש	100-80 150-100	0.5%	צריך להגיע להרטבה מלאה של נוף העשבייה.
	יבלית	200-125	1.0%	

* בדגניים רב-שנתיים מתחדשים ניתן לטפל שנית בהגיעם לגובה 20-30 ס"מ.
** באפונה דן, לעתים בעקבות הריסוס מופיעה הצהבה בעלים העליונים. ההצהבה נעלמת בהמשך ללא כל השפעה שלילית על היבול.
*** לפי גובה העשבייה.