

מרית MARIT

קוטל פטריות מקבוצת הטריאזולים להדברת מחלות עלים ופרי במטעים - אבקה רטיבה
מכיל diniconazole-m 12.5%

טבלת השימוש

הגידול	המחלה	ריכוז ונפח התרסיס	מועדי הטיפול	ימי המתנה עד לקטיף
תפוח	גרב התפוח וקימחון התפוח	0.04% (40 ג' ל-100 ליטר) נפח תרסיס: 150-100 ל"ד' בהתאם לגודל העצים	מתחילים בריסוסי מניעה מראשית פתיחת הפקעים וממשיכים בתפוח אחת ל-10-14 ימים ובאגס אחת ל-7-10, בהתאם למזג האוויר. אם יורד גשם מיד לאחר הריסוס חוזרים לרסס לאחר הפסקת הגשם.	30
אגס	גרב התפוח			
שזף אירופי	חילדון הגרעיניים		ריסוסים אחת לחודש ימים מראשית מאי ואילך.	30
שזף יפני, אפרסק, משמש, שקד	חילדון הגרעיניים		ריסוסים אחת לחודש ימים מראשית אפריל ואילך.	30
מנגו	קימחון המנגו		ריסוסים מראשית הפריחה עד גמר החנטה, אחת ל-14-18 ימים	

שילובים: מרית ניתן לערבוב עם קוטלי החרקים וקוטלי המחלות המורשים לשימוש במטע. כאשר משלבים עם תכשיר בתוארית של תחליב צריך להכניס למכל קודם את המרית, אח"כ את התרכיז המתחלב, תוך כדי בחישה, ולהשלים את יתרת המים.

מספר הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 963/צ/89
דרגת רעילות-IV מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס
FRAC סווג: G1
אריזות: 600 גרם, 800 גרם
מיוצר ע"י חברת Sumitomo, יפן
משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ