

נחושת NECHOSHTAN

תכשיר תרכיז רחיף

מכיל: copper 190 g/L (as 340 g/L tribasic sulfate)

נחושתן הוא קוטל גורמי מחלה בעל פעילות פרוטקטנטית למניעת מחלות בגידולים שונים. התכשיר יעיל בטיפול מניעה בלבד ואינו מדביר מחלה קיימת. התכשיר מופיע בתוארית תרכיז רחיף הנוחה לשימוש ובטוחה למשתמש.

הוראות השימוש

רסס טיפולי מניעה. צריך לרסס במרווח של 7-14 ימים. דאג לכיסוי מלא של עלוות הגידול. כדי למנוע פיתוח עמידות לתכשיר, צריך לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. במקרה של נגיעות עם גזעים עמידים לתכשיר, צריך לטפל בתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. אין לרעות בשטח שלושה שבועות מהריסוס האחרון. אין לרסס בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע. או מנזק מקוטלי עשבים ועוד. אין לרסס בזמן שיש רוח וצריך למנוע רחף לגידולים שכנים.

בתפוחי אדמה

נפח התרסיס לא פחות מ- 20 ליטר לדונם. מרווח בין הריסוסים עד 7 ימים. מקצרים את מרווח הריסוס כאשר יש גשם, טל או לחות שיכולים לעודד את התפתחות המחלה, כאשר מגדלים זנים רגישים למחלה או כאשר יש מחלה קיימת בחלקות קרובות או על ספיח תפוח אדמה.

מספר הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2013/הגה"צ/4134

מספר הגה"צ לחקלאות אורגנית: 7482

דרגת רעילות-IV מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס

FRAC סווג: M1/2

אריזות: 1 ל', 5 ל', 10 ל'

מיוצר ע"י חברת Nufarm, צרפת

משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת שימוש

הגידול	המחלה	המינון (לי"ד) או הריכוז (%)	ימי המתנה לפני הקטיף	הערות
זית	עין טווס	0.3%	7	צריך להתחיל לטפל לפני הופעת המחלה.
הדרים	ריקבון חום	0.3%	7	אם יורד 200 מ"מ גשם, מומלץ לחזור על הטיפול.
תפוח אדמה, עגבנייה	כימשון	300 סמ"ק/ד'	7	ראה הערות כלליות לטיפול + בתפוחי אדמה
גפן	כשותית הגפן	0.3%	7	ריסוס עד נגירה
אפרסק / נקטרינה	סלסול עלים	0.3%	7	ריסוס עד נגירה. צריך להתחיל לטפל לפני הופעת המחלה.
אגס	חירכון	0.1%	הריסוס בזמן הפריחה	ריסוס עד נגירה. צריך להתחיל לטפל לפני הופעת המחלה.
מנגו	השחרה חיידקית	0.25%	7	ריסוס עד נגירה

שילובים: באגס ניתן לשלב עם סטרנר. ניתן לשלב עם נימגארד בתפוח אדמה.