



קוטל פטריות בעל פעילות טרנסלמינרית להדברת מחלות קימחון וקימחונית בגידולים שונים - תחליב שמן במים
מכיל cyflufenamid 50 g/L

הוראות השימוש

מומלץ להתחיל עם ריסוס מניעה או לרסס בהתחלת הנגיעות ולפני התעצמותה לפי הפירוט בהמשך. אין לרסס יותר מפעמיים בכל עונת גידול.

טבלת שימוש

הגידול	המחלה	המינון	נפח התרסיס (ל"/ד')	מרווחי ריסוס בימים	ימי המתנה עד הקטיף	הערה
חציל, עגבנייה, פלפל	קימחונית	20 סמ"ק/ד'	100-30 בהתאם לגודל הצמחים	7	3	למניעת התפתחות תנגודת לנץ, צריך לשלב בכל טיפול שביט במינון המורשה לגידול.
אבטיח, מלון, מלפפון, קישוא	קימחון	20 סמ"ק/ד'	100-30 בהתאם לגודל הצמחים	7	3	
גפן	קימחון	0.01% (10 סמ"ק ל-100 לימים)	150-100 בהתאם לגודל הגפנים	14-10 בהתאם לעוצמת הנגיעות	18	
תפוח	קימחון	0.02% (20 סמ"ק ל-100 לימים)	150-100 בהתאם לגודל העצים	14-10 בהתאם לעוצמת הנגיעות	5	

הערות: גשם שעה אחת לאחר הריסוס לא יפגום ביעילות הריסוס.

שילובים: ניתן לשלב נץ + שביט עם מוספילן לריסוס באבטיח.

לפני ריסוס בכל שילוב אחר בדוק את בטיחותו על מספר מצומצם של צמחים.

מסי הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1836/הגה"צ/2005

דרגת רעילות - IV מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס

FRAC סווג: חדש

אריזות: 0.5 ליטר

מיוצר ע"י חברת Nippon Soda, יפן

משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ