

ארמוברייק ARMOBREAK

משטח - תרכיז נוזלי

alkoxylated fatty alkylamine polymer - 980 g/L מכיל

הוראות השימוש

ארמוברייק פועל כמווסת צמיחה. לשימוש בשילוב עם ארמו N לשיפור התעוררות בעצי פרי שונים בתרדמה. חברת אדמה אגן אינה אחראית לפעילות התכשיר ותוצאותיו בתנאים אקלימיים קיצוניים והשפעתם על המצב הפיזיולוגי של הצמח, או בריסוס מוקדם או מאוחר מהמומלץ. צריך להתייעץ עם מדריך שדה לפני היישום.

כאשר התכשיר מרוסס למטרת הפגשת פריחה עם המפרים, יש להקפיד שיימצאו דבורים בשטח מתחילת הפריחה. ריסוס במועד קרוב מדי להתעוררות הטבעית (פחות מחודש לפני התעוררות הטבעית) עלול לגרום לפגיעה בפקעי הפרי. צריך לרסס בשעות הבוקר או לקראת הערב. אין לרסס את התכשיר בשעות החמות או בימים חמים ובהירים. דאג לכיסוי מלא של ענפי העץ. אין לרסס מטע שנמצא בעקת יובש או בעודפי רטיבות. מומלץ לשמור על עלווה בריאה במטע בסוף העונה שיאפשר הצטברות של מוטמעים בצמח שיגרום להתעוררות חזקה באביב. צריך להתייעץ עם מדריך שדה לפני היישום.

נפח תרסיס: 100 - 150 ל"ד' בהתאם לגודל העצים.

ציוד וכיול: ניתן לרסס את התכשיר ארמוברייק בכל מרסס המקובל לריסוס חומרי התעוררות במטעים.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4267/צ/2017/הגה"צ

אריזות: 5 ל'

דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס

ייצור: חברת Akzo Nobel, הולנד

משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת השימוש

הגידול	הריכוז ב-%	מועד הריסוס*
אגס בזנים ספדונה, קוסטיה	1.0	כחודש לפני ההתעוררות הטבעית. ריסוס במועד קרוב מדי להתעוררות הטבעית עלול לגרום לפגיעה בפקעי הפרי*.
אפרסק בזנים: סאמר סנו		
משמש בזן רעננה		
תפוח בזן זהוב, סטרקינג		
דובדבן בזן בורלא		

*צריך להתייעץ עם מדריך שדה לפני היישום.