

פולירם POLYRAM DF

מדביר מחלות בגידולים שונים - גרגירים רחפים
מכיל: metiram 70%

קוטל פטריות מקבוצת הדיתיוקרבמטים להדברת מחלות בגידולי ירקות, כותנה, פרדס ומטע, ולהדברת אקרית החלודה בפרדס.

הוראות השימוש

החל בטיפול פולירם כטיפול מניעה לפני הופעת המחלות במרווחים של 7-10 ימים. לאחר הופעת הנגיעות טפל במרווחים של 7 ימים. לשיפור ההרטבה וההדבקה ניתן להוסיף דבק. מנע רחף לגידולים שכנים.

נפח התרסיס: בירקות 20-50 ל"ד, בגידולים בהדליה עד 150 ל"ד, במטעים 150-200 ל"ד, בהדרים 150-300 ל"ד' בהתאם לגודל העצים.

שילובים: אין לשלב פולירם עם מרק בורדו או מרק קליפורני.

בהדרים: אין לשלב פולירם עם תכשירי הזנה או שמנים. בפומלית ופומלו אין לשלב פולירם עם שום תכשיר אחר. לפני ריסוס בכל שילוב צריך לבדוק בטיחות השילוב תחילה על מספר מצומצם של צמחים.

מס, הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 87/הגה"צ/496
דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר 12 שעות
FRAC סווג: M3
אריזות: 10 ק"ג
מיוצר ע"י: BASF, גרמניה
משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת שימוש

הגידול	המחלה	המינון		טיפול אחרון לפני האסיף בימים
		גרם/ד'	הריכוז בריסוס בנפח מעל 100 לי"/ד'	
מלפפון, מלון	כשותית הדלועיים	250	0.25%	5
טבק	כשותית	250		
בצל ***	כשותית הבצל	250		10
שום ***	חילדון הבצל והשום	250		10
תפוח אדמה	כימשון, חלפת	250		5
פול	כתמי שוקולד (בוטריטיס), חילדון השעועית	250		10
כותנה, ברוקולי, כרובית, גזר, עגבנייה	כתמי חלפת	250		5
משמש, אפרסק, שזיף	חילדון הגלעיניים		0.15%	10
הדרים **** (ראה סעיף שילובים)	* חלפת (אלטרנריה)		0.25%	10
	** אקרית החלודה	1000		

*ריסוס ראשון עם התחלת החנטה, ריסוסים נוספים כל שבועיים עד סוף יוני. למניעת עמידות עדיף לרסס במשטר ריסוסים שכולל גם קוטלי פטריות אחרים.

** לרסס על נגיעות נמוכה או כטיפול מונע.

*** רצוי להוסיף חומר מדביק כגון דבק.

**** בזן מינאולה מותר לרסס בסתיו בלבד.