

רסק RESEC

תרכיז להדברת מחלת הבוטריטיס בגידולים חקלאיים - תרכיז רחיק

מכיל 250 גרי/לי carbendazim

250 גרי/לי diethofencarb

קוטל פטריות המורכב משני חומרים פעילים סיסטמיים - קרבנדזים שמדביר גזעים של בוטריטיס הרגישים לקבוצת הבנזימידזולים, והדיאטופנקרב המדביר גזעים העמידים לדיקרבוקסימידיים (עמידות צולבת שלילית).

הוראות השימוש

כדי לשמור על יעילות הרסק ולצמצם התפתחות בוטריטיס עמיד לתכשיר, אין להשתמש בו אלא לעתים מזומנות כמפורט להלן.

1. אין להשתמש ברסק לטיפול מונעים - בטרם הופעת בוטריטיס בחלקה.
2. עם הופעת הבוטריטיס יינתנו הטיפולים הראשונים בתכשירים מומלצים אחרים.
3. לאחר התעצמות הבוטריטיס על אף הטיפולים, יינתנו 2 ריסוסים עוקבים ברסק, לאחר מכן חוזרים לטיפולים בתכשירים אחרים. רק לאחר ששוב לא תתקבל הדברה מספקת, רצוי לחזור על 2 טיפולים עוקבים וחוזר חלילה.

הערה: יש מקומות בהם פיתחה הפטרייה עמידות לרסק, צריך לקחת זאת בחשבון בתכנון ההדברה.

שילובים: רסק ניתן לערבוב עם מרבית קוטלי הפגעים, אין לערבב רסק עם מרק בורדו או מרק קליפורני. בגידולים חסויים אין לערבב עם אנטרקול או עם תכשירי סיהקסטין (פליקטרן, אקריטל, לינטקס). בגידולים או זנים מסוימים עלולים שילובים שונים לגרום לפגיעה. לפני ריסוס משקי של שילוב שטרם התנסית בו בדוק תחילה בקנה מידה מצומצם. כאשר מערבבים רסק עם תרכיז מתחלב, צריך להכניס את הרסק למכל המרסס לפני התרכיז המתחלב.

מסי הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 91/הגה"צ/1133

דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר 12 שעות

FRAC סיווג: B1 + B2

מיוצר ע"י Sumitomo, יפן

משווק אדמה-אגן בע"מ



הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד או ריכוז)	נפח התרסיס (ל"ד')	מועד הטיפול	הערות	טיפול אחרון לפני הקטיף
מלפפון מודלה ושרוע בבתי צמיחה גלוי	בוטריטיס	100-50 סמ"ק לפי עוצמת הנגיעות וגודל הצמחים. בנפח מעל 100 לי"ד: משתמשים ב: 0.1%-0.05%	150-50	מתחילים בטיפולים עם התעצמות המחלה.	הקפד על כיסוי מושלם של החנטים והגבעולים. טיפול זה במינון גבוה ידביר גם קישיוניה.	14 יום
עגבנייה בבתי צמיחה ובשטח גלוי	בוטריטיס	ריסוס: מכון על התפרחות בלבד בריכוז של 0.5%	כנדרש לכיסוי התפרחות	מתחילים בטיפולים עם התעצמות המחלה.	ריסוס התפרחות יבוצע במרסס יד לפי השיטה הנהוגה בריסוס הורמונים לחנטה.	14 יום
		ריסוס על הנוף 100-50 סמ"ק לפי עוצמת הנגיעות וגודל הצמחים. בנפח מעל 100 לי"ד: משתמשים ב: 0.1%-0.05%	150-50	מתחילים בטיפולים עם התעצמות המחלה.	הקפד על כיסוי מושלם של החנטים והגבעולים. טיפול זה במינון גבוה ידביר גם קישיוניה.	
חציל	בוטריטיס	ריסוס: מכון על התפרחות בלבד בריכוז של 0.5%	כנדרש לכיסוי התפרחות	מתחילים בטיפולים עם התעצמות המחלה.	ריסוס התפרחות יבוצע במרסס יד לפי השיטה הנהוגה בריסוס הורמונים לחנטה.	14 יום
		ריסוס על הנוף 100-50 סמ"ק. בנפח מעל 100 לי"ד: משתמשים ב: 0.1%-0.05%	150-50	מתחילים בטיפולים עם התעצמות המחלה.	הקפד על כיסוי התפרחות והפירות	
ורד טיפול בפרחים קטופים	בוטריטיס	0.2%	כנדרש לכיסוי הפרחים	מיד לאחר הקטיף	אסוף הפרחים לאגדים והכנסתם לקירור תיעשה רק לאחר התייבשות התרסיס.	
ורד בחממה	בוטריטיס	100 סמ"ק. בריסוס בנפח מעל 100 לי"ד משתמשים בריכוז של 0.1	50-200	מתחילים בטיפולים עם התעצמות המחלה.		
עצבנית (רוסקוס)	בוטריטיס	100-50 סמ"ק לפי עוצמת הנגיעות.	כנדרש	מתחילים בטיפולים עם התעצמות המחלה.	רצוי להוסיף משטח.	