

# סמש SMASH

**קוטל אקריות וחרקים מקבוצת הפירתרואידים להדברת מזיקים בגידולים שונים - תרכיז מתחלב**  
**מכיל 100 גרם בליטר fenpropathrin**

## **הוראות השימוש**

התכשיר מתאים לגידולים חסויים ובשטח הפתוח. במידה וצפויים תנאי שרב, צריך לדחות את הריסוס מחשש לפחיתה ביעילות ההדברה. כדי למנוע התפתחות תנגודת לתכשיר יש לרסס חליפות בתכשיר זה ובתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר.

## **נפח התרסיס**

**בכותנה:** ניתן לרסס סמש מהקרקע ומהאוויר בנפחי הריסוס המקובלים.

**בירקות:** בשטח הפתוח מרססים בנפח של 20-50 ל"ד'. בשטחים חסויים מרססים בנפח של 70-150 ל" דלונג ומעלה.

**בפרחים:** נפח התרסיס ייקבע בהתאם להתפתחות הצמחים מ-20 ל-150 ל"דלונג.

## **שילובים**

**בירקות:** ניתן לשלב סמש בכל גידול ירקות שהוא מורשה, עם מנצידן או רוביגן, במידה שאלה מורשים בגידול הנדון - ובהתחשב בתנאי הבא: צמחים צעירים של ירקות (בעיקר מלפפונים) בשלב 2-3 עלים תחת כיסוי עלולים להיפגע מריסוס של שילובים עם סמש, לכן בשלב גידול זה אין לשלב בהם סמש עם תכשירים אחרים.  
כל שילוב אחר חייב להיבדק לבטיחות לפני מתן ריסוס מסחרי.

**מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 81/הגה"צ/419**

**דרגת רעילות II - רעיל; כניסה לשטח המרוסס - לאחר 24 שעות**

**IRAC סיווג: 3A**

**אריזות: 1 ל', 5 ל'**

**חומר פעיל תוצרת Sumitomo, יפן**

**מיוצר ומשווק ע"י אדמה-אגן בע"מ**



## טבלת השימוש

| הגידול                     | המזיק                                          | הריכוז (ב-%) או המינון (סמ"ק/ד')                                             | מועד הריסוס האחרון לפני קטיף (ימים) |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| כותנה                      | פרודניה, הליותיס, זיפית ובוגרי כנימות עש הטבק. | 200 סמ"ק                                                                     |                                     |
| תפוח-אדמה                  | פרודניה, כנימת עש הטבק                         | 150-200 סמ"ק                                                                 | 14                                  |
| עגבנייה                    | כנימות עש הטבק למניעת וירוס צהבון האמיר        | 0.3% מדי 3-4 ימים<br>כריסוס נגירה, לפחות<br>20-30 ליטר/ד' לפי גודל<br>הצמחים | 3                                   |
|                            | כנימת עש הטבק, פרודניה, אקרית חלודה            | 150-200 סמ"ק*                                                                | 3                                   |
| חציל, פלפל, מלפפון, דלורית | כנימת עש הטבק, פרודניה                         | 150-200 סמ"ק*                                                                | 3                                   |
| אבטיח, מלון                | כנימת עש הטבק, פרודניה                         | 150-200 סמ"ק*                                                                | 7                                   |
| תות-שדה                    | פרודניה                                        | 150 סמ"ק                                                                     | 3                                   |
| בצל                        | תריפס                                          | 100-150 סמ"ק                                                                 | 14                                  |
| סלק אדום, פטרוזיליה        | פרודניה                                        | 150-200 סמ"ק                                                                 | 14                                  |
| אפרסק, נקטרינה, שזיף, משמש | ציקדות                                         | 0.1%                                                                         | 14                                  |
| גיבסנית, ציפורן, עדעד,     | פרודניה, כנימת עש הטבק                         | 150-200 סמ"ק או 0.15%<br>בריסוס מעל ל-100 ליטר                               |                                     |
| ציפורן                     | תריפס                                          | 150 סמ"ק                                                                     |                                     |

\* בריסוס בנפח גדול מ-100 ליטר משתמשים בריכוז 0.15%