

ספידר SPIDER

קוטל אקריות המונע התנשלות - תרכיז רחף

מכיל 110 גרם בליטר etoxazole

קוטל אקריות המונע התנשלות.

התכשיר פועל כרעל מגע על הדרגות הצעירות (ביצים ונימפות) ולכן צריך לטפל כשמרבית האוכלוסייה בדרגות צעירות. לתכשיר משך פעילות ארוך. כדי למנוע עמידות דאג לרסס חליפות בספידר ובתכשירים בעלי מנגנוני פעולה אחרים. לתכשיר רעילות נמוכה יחסית לבעלי דם חם ואינו רעיל לדבורים.

הוראות שימוש

קצב הדברת אקריות ע"י ספידר איטי בטמפרטורות נמוכות (סתיו מאוחר, חורף, אביב מוקדם). בבתי צמיחה מחוממים פעילות התכשיר מהירה יותר. לתכשיר פעילות טרנסלמינרית, למרות זאת צריך לדאוג לכיסוי מרבי של העלווה בתרסיס.

שילובים: בירקות ניתן לשלב עם ורטימק או מילבנוק לפי הרישוי לתכשיר המשולב. בחציל, פלפל, עגבנייה ואבטיח ניתן לשלב עם סיגנום. בעגבנייה ובפלפל ניתן לשלב עם מסאי. במלפפון ועגבנייה ניתן לשלב עם מוספילן לריסוס.

מ"ר רישוי של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 97/הגה"צ/1469

IRAC סיווג: 10B

דרגת ועילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר 12 שעות

אריזות: 0.5 ל"

מיוצר ע"י חב' Sumitomo, יפן

משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת השימוש

הגידול	המזיק	המינון או הריכוז	נפח התרסיס	ימי המתנה לפני הקטיף
הדרים	אקרית אדומה מזרחית	0.0125 % (12.5 סמ"ק ל-100 ל"י מים)	הרטבה מלאה	21
תפוח	אקרית אירופית, אקרית צהובה	0.025 % (25 סמ"ק ל-100 ל"י מים)	150-200 ל"ד' לפי גודל העצים	14
חציל, פלפל, עגבנייה	אקרית אדומה מצויה	25 סמ"ק/ד'	30 - 100 ל"ד'	3
אבטיח, מלון, מלפפון, דלורית	אקרית אדומה מצויה	25 סמ"ק/ד'	30 - 100 ל"ד'	7
אספרגוס וירגטוס, אסתר*, גיבסנית*, ורד*, ליזיאנטוס*, פיטוספורום, ציפורן*	אקרית אדומה מצויה	0.025 % (25 סמ"ק ל-100 ל"י מים)	100-200 ל"ד' -	-
בזיל, מנטה, מרווה, קורנית, רוזמרין, טרגון, מליסה, מירם, עירית, בצל ירוק, רוקולה, פטרוזיליה, שמיר, סלרי עלים, כוסברה	אקרית אדומה מצויה	25 סמ"ק/ד' או 0.025%	30 - 100 ל"ד' או בנפח מעל 100 ל"ד'	14

* ספיידר נבדק באסתר זן קזבלנקה-פרפל; בגיבסנית זן פרפקטה; בוורד זנים - פירסט רד, יגואר, פרסקו, גבריאלה, מרצדס, פרופיטה, אירופה; בליזיאנטוס בזן אקו; בציפורן בזנים - ברבטוס, צאו ביאנקו, באצו, צאו, רד צאו, הוואנה, אימפולס, סקרלט. בזנים אחרים צריך לבדוק לבטיחות תחילה על מספר מצומצם של צמחים. השימוש בתכשיר מותר רק בגידולים המופיעים מעלה. אין לרסס בגידולים אחרים גם אם הם שייכים לאותה משפחה בוטנית וזאת בגלל סכנת גרימת נזקים (פיטוטוקסיות). אין להשתמש בספיידר בסולידג או בסולידאסתר.