

סטארנר STARNER

תכשיר להדברת מחלת החירכון באגס, תפוח, חבוש ושסק - אבקה רטיבה
oxolinic acid 20%

הוראות השימוש

באגס, תפוח, חבוש: הריסוסים יבוצעו רק במהלך הפריחה. מועדי הריסוסים ייקבעו על פי התאמת תנאי הסביבה להדבקה, בהתייעצות עם אנשי שירות ההדרכה והמקצוע.

טבלאות השימוש

הגידול	המחלה	הריכוז	נפח התרסיס
אגס, תפוח, חבוש	חירכון	*0.2-0.15%	150-100 ל"ד' לפי גודל העצים.

הגידול	המחלה	הריכוז	נפח התרסיס
שסק **	חירכון	*0.2-0.15%	150-100 ל"ד' לפי גודל העצים.

הערות:

*המינון הגבוה ייושם במטעים בהם הייתה נגיעות בעונה הקודמת.

**טפול ראשון יש לבצע מתחילת הפריחה ולהמשיך בטפולים סדירים בהתאם להתפתחות הפריחה ותנאי מזג האוויר.

שילובים: ניתן לשלב את הסטרנר עם רוב התכשירים להדברת גרב וקימחון. אין לשלב עם תכשירי גופרית. לא נבדקו שילובים עם קוטלי חרקים. ניתן לשלב עם נחושתן באגס.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 96/הגה"צ/1383

FRAC סווג: A4

אריזות: 1 ק"ג

דרגת רעילות IV- מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר 12 שעות

מיוצר ע"י חברת Sumitomo, יפן

משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ