

סטרייק STRIKE

קוטל עשבים לקטילת עשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים במטעים וצדי דרכים ולמניעת הצצת עשבים חד-שנתיים בבוטנים
מכיל flumioxazin 50%

סטרייק הינו קוטל עשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים, שבשילוב עם ראונדאפ משפר את קטילת העשבים קשי ההדברה ומתקבלת פעילות קטילה מהירה ויעילה. סטרייק נקלט במהירות ע"י העלוה הירוקה וגורם להחמה, נבילה והתייבשות מהירה של הצמח. ניתן להבחין בסימפטומים תוך 1 - 3 ימים לאחר הריסוס. לסטרייק יש גם פעילות במניעת הצצה שהנה קצרה באביב ובקיץ וארוכה יותר בחורף (מספר שבועות). מגגנון הפעולה של סטרייק הוא על ידי עיכוב האנזים פרוטופורפירינוגן אוקסידז (Protox=PPO). סטרייק פועל בנוכחות אור וחמצן.

הוראות השימוש

כדי לקבל הדברה מרבית, צריך לרסס על צמחים ירוקים רעננים. בעשבים ר"ש המפותחים מאברי ריבוי תת קרקעיים, צריך להמתין בטיפול עד הליבלוב ולהימנע מעיבוד קרקע או כיסוח עלווה לפני הטיפול. לאחר ריסוס עשבים רב שנתיים צריך להימנע מעיבוד קרקע לפחות 7 ימים לאחר הריסוס. לקבלת הדברה יעילה של עשבים צריך להימנע מהשקיה בהמטרה במשך יומיים לאחר הריסוס.

מנע הגעת תרסים או רחף לעלוה ולפירות של גידולי תרבות, לגזעי עצים שטרם השתעמו ולכל צמחייה רצויה, מאחר שזנק חמור עלול להיגרם להם. למניעת רחף רסס רק בשעות ללא רוח.

בריסוס בתערובת של סטרייק וראונדאפ, נהג לפי כל ההוראות ואמצעי הזהירות בתווית הראונדאפ. הימנע מכיסוי של תרסים בענפים של עצי פרי וגפן.

העשבים המודברים: השילוב של סטרייק וראונדאפ קוטל מגוון רחב מאוד של עשבים ח"ש ור"ש, גם מינים שאינם נקטלים ביעילות ע"י ראונדאפ לבד.

ח"ש מודברים: דגניים ורחבי עלים שונים כולל חלמית, מעוג, נזמית, סרפד, מרקולית, סוככיים ומצליבים.

ר"ש מודברים: דגניים, גומא הפקעים, סולנום זיתני, אספרגוס החורש, חבלבל השדה, לוף, לופית, חנק מחודד, אורג"ה משינית וכותלית יהודה.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 96 / הגה"צ / 1349

HRAC סיווג: E

אריזות: 500 גר'

דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסים

מיצור ע"י חברת סומיטומו, יפן

משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת השימוש

הגידול	מועד הריסוס	העשבים המודברים	מינון סטרייק (גרם/ד' או %) (סמ"ק/ד' או %)	מינון ראונדאפ® (סמ"ק/ד' או %) (ל"ד/ד')	נפח תרסיס
אבוקדו, הדורים, פקאן - מתום שנה לאחר הנטיעה	במשך כל השנה	חד שנתיים עד גובה 10 ס"מ	10 או 50.0%	150 או 5.0%	30-20
אגס, אנונה, אפרסמון, אפרסק, גויאבה, גפן, מנגו, קיווי, שזיף, תפוח - מתום שנה לאחר הנטיעה	לאחר גמר הקטיף ועד שבוע לפני ההתעוררות בלבד.	חד שנתיים עד גובה 40 ס"מ רב שנתיים	10 או 50.0% 20 או 1.0%	200-300 או 1% 250-500 או 2%	30-20
לאורך פסי רכבת וצדי דרכים בינעירוניות, סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז, שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות	במשך כל השנה	חד שנתיים עד גובה 40 ס"מ רב שנתיים	10 או 50.0% 20 או 1.0%	200-300 או 1% 250-500 או 2%	50-20

שילובים במטעים וצדי דרכים: ניתן לשלב סטרייק עם ראונדאפ ועם מונעי הצצה כגון דיאורקס 80 ת.ר. בכל השילובים הנ"ל נהג לפי ההוראות ואמצעי הזהירות שמופיעים בתווית של כל תכשיר.

גידולי שדה

סטרייק מיושם באגוזי אדמה אחרי הזריעה ולפני הצצת הגידול והעשבים. לאחר הפעלה של לפחות 20 מ"מ גשם או המטרה, סטרייק ימנע את ההצצה של חבלבל, ירבוז לבן, כף אווז, לשישית הצבעים.

הגידול	מועד הריסוס	מינון סטרייק (גרם/ד')	נפח תרסיס (ל"ד/ד')
אגוזי אדמה בקרקעות לס בלבד	מיד לאחר הזריעה ולפני ההצצה	15	30-20 (ראה סעיף הפעלה)