

טאצ'גרן TACHIGAREN

קוטל פטריות סיסטמי למניעת מחלות הקרקע (פיתיום) במלפפון ופולפל וריקבון הכתר (פוזריום) בעגבנייה - תרכיז נוזלי מכיל 360 גרם בליטר hymexazol

קוטל פטריות סיסטמי למניעת נגיעות פטריות שוכנות קרקע פיתום ופוזריום. טאצ'גרן ניתן כטיפול מונע לפני השתילה ולפני אילוח השתילים בגורמי המחלה. הטיפול בטאצ'גרן מעודד לעיתים את צימוח הנוף והשורשים.

מצע הגידול: ניתן להשתמש בטאצ'גרן בקרקע או במצעים כגון תערובת של כבול או חומרים אורגניים אחרים יחד עם פרלייט, ורמיקולייט או חומרים אינרטיים אחרים.
אין להשתמש בתכשיר במצע פרלייט נקי עקב יעילות לא מספקת.

הוראות השימוש

הטיפול בטאצ'גרן אינו מבטל את הצורך לנקוט אמצעים אחרים כגון מחזור זרעים, סניטציה, חיטוי קרקע לשמירת ניקיון השטח המיועד לשתילה ממחלות הקרקע.
את הטיפול בטאצ'גרן נותנים בריסוס או זילוף בשלב המשתלה לפני ההשקיה ואחר כך משקים קלות לשיטפת החומר מהעלים.

מספר הרשיון של השירותים להגנת הצומח - 1651/צ/הגה
דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר 4 שעות
FRAC סווג: A3
אריזות: 0.5 ל', 1 ל', 5 ל'
מיוצר ע"י Mitsui Chemicals Agro, Inc, יפן
משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת השימוש

הגידול	המחלה	המינון	נפח התרסיס	שיטת היישום	מועד הטיפול
מלפפון במשתלה	מקמקת (פיתיום)	0.1% (100 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	כ- 3 ליטר למטר מרובע עד לנגר ממצע הגידול	הגמעה	טיפול במשתלה: 3 ימים לפני ההוצאה מהמשתלה. במלפפון - רק לאחר בצבוץ העלה השני.
פלפל במשתלה	מקמקת (פיתיום)	0.2% (200 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)			
עגבנייה במשתלה (מיועד לשתילים שיישתלו בשטח מחוטא כנגד המחלה)	פוזריום (ריקבון הכתר)	0.2% (200 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)			

שילובים:

אין מידע לגבי שילובים.