

טייגר TIGER

מדביר מזיקים בכותנה, ירקות, הדורים, מטעים, פרחים וצמחי נוי - תרכיז מתחלב
מכיל 100 גרם בליטר pyriproxyfen

קוטל חרקים מקבוצת מווסתי גדילת חרקים, הפועל כדמוי הורמון נעורים על דרגות שונות של כנימות עש, כנימות רכות וכנימות מגן.

הוראות השימוש

כדי למנוע התפתחות תנגודת לתכשיר יש לרסס חליפות בתכשיר זה ובתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. דאג לכיסוי מלא של עלוות הגידול.

שילובים: לא מומלץ לשלב יותר משני תכשירים מחשש לפגיעה.

1. **בכותנה** - ניתן לשלב עם סמש, אטברון, מוליט.

2. **בפרחים, משתלות וצמחי עציץ** - רצוי לשלב טייגר למניעת התפתחות תנגודת עם אחד מקוטלי הבוגרים הבאים: סמש, קרטה - וזאת לפי התכשירים המורשים בגידול.

בגרברה ניתן לשלב טייגר עם ורטימק. לפני ריסוס בשילובים אחרים צריך לבדוק בטיחות השילוב תחילה על מספר מצומצם של צמחים.

3. **נשירים** - ניתן לשלב עם מרית.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 91/ הגה"צ / 1155/

IRAC סיווג: 7C

אריזות: 1 ל', 5 ל'

דרגת רעילות IV- מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר 12 שעות

חומר פעיל תוצרת חברת Sumitomo, יפן

מיוצר ומשווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת שימוש

המועד האחרון לטיפול (ימים)	נפח התרסיס ליטר/דונם	המינון		המועד המיטבי להדברה	המזיק	הגידול
		(סמ"ק/ד')	(%)			
30	20-3 ריסוס מהקרקע או מהאוויר	75	-	בהגיע הנגיעות בזחלנים לסף הטיפול המומלץ	כנימת עש הטבק	כותנה*
14	100-8	75	-	בהגיע הנגיעות בזחלנים לסף הטיפול המומלץ	כנימת עש הטבק	ירקות*: חציל, מלון, כרוב
30	400-250	-	0.1	עם התחלת ההשרצה עם התחלת ההטלה עם התחלת ההטלה עם הופעת הזחלנים עם הופעת הזחלנים	כנימה אדומה כנימת האיצריה כנימת עש לבנה דוגנית פלורידית כנימת מוץ	הדרים**
אמצע יוני	150	-	0.07	עם התחלת ההטלה	כנימת עש לבנה	אפרסמון
עד לחנטה או לאחר הקטיף	200-150		0.15	טיפול אחד בשנה עם תחילת בקיעת הביצים באביב או לאחר גמר הקטיף	פרלטוריה	נשירים***: אגס, אפרסק, שזיף אירופי ושזיף יפני, תפוח
עד לחנטה או לאחר הקטיף	250-200	-	0.1	עם התחלת ההשרצה עם הופעת הזחלנים	כנימה אדומה פרלטוריה	זית
-	100-20 (בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד' מרססים בריכוז 0.1%)		0.15	עם תחילת נגיעות בביצים ובזחלנים*	כנימת עש הטבק	פרחים ⁽¹⁾
		75		עם תחילת נגיעות בביצים ובזחלנים*	כנימת עש הטבק	משתלות וצמחי עציץ ⁽²⁾

טייגר (המשך) TIGER

הערות לטבלה:

(1) רשימת הפרחים: חרצית, ורד, גרברה, חלבלוב הדור, ורוניקה, ליזיאנטוס, אסתר, פלוקס, אסקלפיאס, סולידסטר.
(2) התכשיר נבדק ונמצא בטוח לצמחי עציץ כדלקמן: אבוטילון, גרברה, טרכליום, לימוניום, פלפל נוי, ליזיאנטוס, חלבלוב הדור, גרניום.

לפני השימוש בצמחי עציץ אחרים מומלץ לבדוק תחילה על מספר מצומצם של צמחים.

* כותנה, פרחים, משתלות וצמחי עציץ - טייגר מדביר את ביצי כנימות עש. זחלנים נקטלים בהגיעם לדרגת גולם. השפעתו על הבוגרים מתבטאת בהטלת ביצים עקרות. כתוצאה מהנ"ל הפחיתה באוכלוסיית הזחלנים תתבטא רק לאחר כ-3 שבועות. בכותנה: לא מומלץ לתת יותר מטיפול אחד בשנה.

בפרחים, במשתלות ובצמחי עציץ לא יינתנו יותר משני ריסוסים במשך עונת הגידול, מרווח הזמן בין הטיפולים לא יהיה פחות מ-60 יום.

** הדורים - טייגר מדביר את הדרגות הצעירות של כנימות המגן. ריסוס באביב ימנע התפתחות הדור הבא. למניעת נזקי פייחת המתפתחת ע"י הפרשות זחלי כנימת העש הלבנה והאיצירה צריך לטפל מוקדם באביב, עם תחילת ההטלה.

*** נשירים - טייגר מדביר את הזחלים הצעירים של כנימת הפרלטוריה. למניעת נגיעות הפרי בפרלטוריה צריך לרסס עם תחילת בקיעת ביצי הכנימה באביב. טיפול לאחר הקטיף יינתן במידה שנמצאה נגיעות רבה בפרלטוריה בפרי שנקטף.