

טומהוק TOMAHAWK

קוטל עשבים סיסטמי להדברת עשבים רחבי עלים בריסוס לאחר הצצתם - תרכיז מתחלב
מכיל (fluroxypyr 200 g/L (as meptylheptyl ester 288 g/L

מנגנון הפעולה של טומהוק דומה לקוטלי עשבים הורמונליים. הנזק לעשבים מתבטא בעיוותים ובהתקפלויות של העלים ושל הצימוח הצעיר. התכשיר נקלט בעלווה הירוקה וחודר גם למערכת השורשים. העשבים הרגישים הם מיני עשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים קשי הדברה כמפורט בטבלת הוראות השימוש.

הוראות השימוש

נפח התרסיס: במטעים, חוחובה, תירס ודשא 20-30 ל"ד; בהכנת שטחים 10-20 ל"ד. בשטחי בור 30-50 ל"ד.
הערות לטיפול: אין לזרוע או לשתול כל גידול לאחר ריסוס בטומהוק במשך 3 חודשים ממועד היישום וגם לאחר שהשטח קיבל השקיה בהמטרה כחודש לפני הזריעה או השתילה. ניתן לרסס בטומהוק בכל שעות היום. מנע מגע התרסיס בעלוות עצי הפרי. הימנע מרחף התרסיס לגידולים שכנים העלולים להיפגע מפעילות החומר. החומר חודר לעשב דרך העלווה הירוקה לכן צריך לרסס על צמחים רעננים. רצוי לרסס לאחר ההשקיה. אין להשתמש בטומהוק בזמן ההשקיה או כאשר מים עומדים בשטח. אין לרסס ברוח. אין לרסס טומהוק כאשר הגידולים או העשבים נמצאים בתנאי עקה (כגון יובש, שרב, עודפי מים, קרה, פגיעה מקוטלי עשבים וכד').

שילובים: ניתן לשלב טומהוק עם ראונדאפ/גלייפוגן במועדי הטיפול המוזכרים בהוראות השימוש, כפוף לרישויים בגידולים הנ"ל. השילוב של טומהוק עם ראונדאפ משפר את הדברת גומא הפקעים (סעידה).

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1581/הגה"צ/2000

HRAC סיווג: O

אריזות: 0.5 ל', 1 ל', 5 ל'

דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר הת"בשות התרסיס

מיוצר ומשווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



הגידול	העשבים המודברים	הריכוז (%) או מינון (סמ"ק/ד)	הערות
מטעים - מהשנה השלישית לנטיעה: אגס, אפרסמון*, אפרסק, הדרים, זית, מנגו, משמש, פיג'ואה, פקאן, שזיף, תמר, תפוח, רימון, אנונה, שקד	אבוטילון, דטורה, רגלת הגינה, ירוקת החמור ונבטים של רחבי עלים שונים.	0.25%	מנע רחף של התרסיס לעלוות העצים. בעצי מנגו צעירים באזור בקעת הירדן אין לרסס טומהוק בתקופת הבלבול. ראה סעיף שילובים.
	ארכובית שבטבטית, חבלבל, חנק, ינבוט, הגא, פטל, סולנום זיתני, אספרגוס, יהודי נודד.	0.5%	
חוחובה	חבלבל, ינבוט, סולנום זיתני, ארכובית, אבוטילון, דטורה, רגלת הגינה, ירוקת החמור ונבטים של רחבי עלים שונים.	0.25%	אין חשש מפגיעת התרסיס בעלוות הגידול.
תירס מתוק מזן ג'ובילי ותירס למספוא בשלב 4-6 עלים בלבד.	חבלבל, ינבוט, סולנום זיתני, דטורה, לכיד, רגלת הגינה, אבוטילון, ירוקת החמור ונבטים של רחבי עלים שונים.	120-150 סמ"ק/דונם	יש לרסס בסמוך לאחר ההשקיה.
דשא דגני בתקופת החורף בלבד: בופלו, דורבן, זני זויסיה, פספלו, קיקיו	מיני חמצץ, מיני חלבול, אספסת, ארכובית ונבטים של עשבים רחבי עלים שונים.	0.5%	תרסיס או רחף שיפגע בצמחי תרבות בשולי הדשא עלול לגרום להם נזק חמור.
הכנת שטחים לקראת זריעת חיטה בקרקעות בינוניות וכבדות. עד חודש לפני זריעת החיטה	ינבוט, סולנום זיתני, הגא	120-150 סמ"ק/ד'	המינון לפי רמת השיבוש ושלב התפתחות. ראה סעיף שילובים.
שטחי בור	הגא, ינבוט, סולנום זיתני, פטל, חבלבל, ארכובית שבטבטית, חנק, אספרגוס וחד-שנתיים רחבי עלים המזכרים לעיל	250 סמ"ק/ד' או 0.75% בכתמים	ראה סעיף שילובים.

*אין לרסס באפרסמון בזמן בלבול וחנטה עד לאחר קטיף ובזמן הימצאות סורי שורש מלבלבים.