

קומודור COMODOR SC

קוטל פטריות סיסטמי - להדברת מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה ומטע - תרכיז רחיף
מכיל: 400 גרם בליטר Chlorothalonil + 80 גרם בליטר Azoxystrobin

קומודור הינו קוטל פטריות המכיל כלורותלוניל שהינו מרכיב בעל פעילות מניעה רבת אתרים, עובדה האחראית להעדר עמידות למרכיב זה, ומרכיב טרנסלמינרי, אזוקסיסטרובין, בעל פעילות קורטיבית מקבוצת הסטרובילינים. לשני המרכיבים בתכשיר טווח פעילות רחב ביותר נגד מגוון מחלות, שילובם מבטיח פעילות משופרת של מניעה והדברה ומפחית את הסכנה לפיתוח עמידות.

טבלת השימוש

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד"ל) בנפח של 75-200 ל"ד	הריכוז (%) בריסוס נגירה או בנפח מעל 100 ל"ד	מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)
אפרסמון	כתמי עלים	-	0.15% ⁽¹⁾	90
תפוח אדמה	חלפת, כימשון	150-200 ⁽²⁾	-	15
	ריזוקטוניה (מק-שורש)	250 סמ"ק ל-1000 מטר שורה	יישום בפס הזריעה ⁽⁶⁾	60
גזר	חלפת הגזר, קימחון הגזר	100-200 ⁽³⁾	-	15
שום	סטמפיליום, חילדון	200	-	15
בצל	סטמפיליום, כשותית	200	-	15
חימצה, אפונה	כתמי אסכוכיטה	150	-	16
סלרי	כתמת (צרקוספורה)	150	-	14
אבטיח	קימחון הדלועיים	100	-	15

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 07/ הגה"צ/ 1918
FRAC סוג: 3C + M
דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר 12 שעות
אריזות: 1 ליטר, 5 ליטר
מיוצר ע"י Syngenta, שוויץ
משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד" בנפח של 20-75 ל"ד)	הריכוז (%) בריסוס נגירה או בנפח מעל 100 ל"ד	מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)
מלפפון, מלון	כשותית הדלועיים	200	-	3
	קימחון הדלועיים	100	-	
מלון	התמוטטות פתאומית (מונספוראסקוס)	400 בהגמעה ⁽⁴⁾	-	3
עגבנייה	קמחונית, קימחון העגבנייה, כימשון	150	0.15%	3
אגוזי אדמה	כתמת (צרקוספורה)	150	-	30
זית	עין הטווס	-	0.15% ⁽⁵⁾	90
תפוח	רקבון חיצוני (אלטרנריה אלטרנטה)	-	0.15% ⁽⁷⁾	14

הערות לטבלה

- (1) יש לרסס במהלך החנטה לפחות שני ריסוסים באינטרוול של שבועיים.
- (2) המינון בהתאם לגודל נוף הצמחים ולעוצמת המחלה.
- (3) המינון הנמוך לטיפול מניעה, מינון גבוה לטיפול תגובה על מחלה קיימת.
- (4) טיפול ראשון 10-20 יום משתילה, טיפול עוקב לאחר 2-3 שבועות. טיפול קומודור אינו תחליף לחיטוי קרקע. אין ליישם במצע מנותק או בעת שהגידול בעקה. יש להזריק את התכשיר מהול למערכת טפטוף מנותקת אויר. יש ליישם במשאבת דישון במהלך השקיית 2-4 קוב/דונם ובסוף היישום להזרים קוב מים נוסף לשטיפת המערכת.
- (5) ריסוס ראשון באוקטובר, ריסוס שני בדצמבר. ריסוסים נוספים במידת הצורך בינואר ובמרץ.
- (6) יש ליישם במהלך הזריעה באמצעות 4 (או 2) פומיות המורכבות על גבי המזרעה כאשר 2 (או 1) מכוונות לחרץ הזריעה לפני נפילת הפקעות ו-2 (או 1) מכוונות לריסוס על גבי הפקעות לפני כסוי ובניית הגדודית מחדש. נבדק ונמצא בטוח בזנים: וולור, אלפא, רוזנה, רודאו, קוליברי, דיפלה, וולדי, סנטה.
- (7) לשימוש בזן פינק לידי בלבד. להדברה מושלמת של המחלה יש ליישם תכשירים מתאימים מקבוצות כימיות שונות כל 14 ימים החל מאמצע חודש אוגוסט. התכשיר מוגבל ליישום אחד בעונה.

שילובים:

ניתן לשלב קומודור עם התכשירים הבאים, בהתאם למינונים וההנחיות המופיעות בתוויות האריזה שלהם:
תפוז"א - טלסטאר; גזר - אטברון; חימצה - קנון, 50 טלסטאר, פנטרה, דואל גולד; אבטיח - ורטימק; מלון - דומארק (בריסוס בלבד); מלפפון - סוויץ'; אגוזי אדמה - טלסטאר.