

דוריבו DURIVO SC

קוטל חרקים להדברת חרקים בגידולי שדה, ירקות, מטעים, כותנה, גפן והדרים - תרכיז רחף
מכיל 100 g/L Chlorantraniliprole + 200 g/L Thiamethoxam

דוריבו 300 ת"ר הינו קוטל חרקים טרנסלמינרי להדברת זחלי עשים וחרקים מוצצים. דוריבו מכיל חומר להדברת חרקים מוצצים (Thiamethoxam קבוצה A4 - ניאוניקוטינואידים) וחומר להדברת זחלי עשים (Chlorantraniliprole קבוצה 28 Antranilic Diamides), המשתק את החרק ע"י הפרעת פעולת קולטני Ryanodine שבתאי השריר בחרק. החרק ימות תוך מספר ימים אך הנזק נפסק מיידי. מספר סוגי חרקים (כמו למשל כנימת עש הטבק) פיתחו עמידות לתכשירים מקבוצת הניאוניקוטינואידים. דוריבו לא ידביר מזיקים אלה.

הוראות השימוש

אין ליישם תכשיר זה בשיטת הכמיגציה.
רעיל לדבורים, אויבים טבעיים ודבורי בומבוס בריסוס ישיר. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.
ממשק מניעת עמידות: למניעת התפתחות עמידות מצד המזיקים יש לרסס דוריבו לחילופין עם תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה ולהשתמש בשיטות הדברה אלטרנטיביות. בכל מקרה אין לרסס יותר מ-2 ריסוסים בעונה בדוריבו או בחומרים אחרים המכילים חומר פעיל בעלי אותו מנגנון פעולה מקבוצה 28.
עמידות חרקים לחומרים הפעילים שב"דוריבו" עלולה להופיע. לפיכך אין לרסס בתכשיר יותר מ-2 ריסוסים רצופים ולא יותר מ-2 ריסוסים בעונת גידול, ולהחליף עם חומרים בעלי מנגנון פעולה שונה. קיים חשש לעמידות אצל ציקדות ירוקות לתכשירים מקבוצת הניאוניקוטינואידים, ובתוכם Thiamethoxam שבתכשיר דוריבו. לפיכך, בכל מקרה של הדברה בלתי מספקת של ציקדות, יש לחזור ולרסס בתכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4102/ הגה"צ / 2012
דרגת רעילות: IV-מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר 24 שעות
IRAC סיווג: 28 + A4
אריזות: 1 ל"

מיוצר ע"י חברת Syngenta, שווייץ
משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת השימוש

הגידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד' או הריכוז (%))	מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)	הערות
כרוב, כרובית, ברוקולי, גזר	עש הכרוב, עש לב הכרוב, פרודניה	30	14	
גזר	פרודניה	30	4	
עגבניה, בחממה ובשטח פתוח	הליותים (תנשמית האביב), פלוסיה, טוטה אבסולוטה	30	3	
פלפל	פרודניה, לפיגמה	30	3	
תפוח אדמה	פרודניה, לפיגמה, הליותים (תנשמית האביב)	30	7	
מלפפון	לפיגמה	30	7	
בטטה	מלדרה מטרידה	30	14	מטפלים מדי חודש משתילה, סה"כ 4 טיפולים, מתוכם 2 טיפולים בדוריבו. יש להמטיר לאחר הריסוס בכמות של 25-30 מ"ק מים לדונם רצוי מיידית ועד 24 שעות מהריסוס. אין לטפל יותר מ-2 טיפולים בעונה בדוריבו.
אפרסק, נקטרינה, משמש, שקד, שזיף	עש המשמש (אנרסיה), ציקדה ירוקה	0.03%	7	
אפרסק, נקטרינה, משמש, שזיף	בוגרי קפנודיס	0.03%	7	
אגוזי אדמה	מלדרה מטרידה	20	45	מטפלים בהתאם למועד הופעת המזיק ולמשך הדור.
תפוח	עש התפוח, ציקדה ירוקה	0.03%	21	
גפן	עש האשכול, ציקדות	0.03%	14	
הדרים (לא מניבים)	עש המנהרות	0.03%	-	
כותנה	הליותים (תנשמית האביב)	30	-	
רימון	כחליל הרימון, כנימת עלה הדלועים, כנימת הרימון	0.03%	21	