

קלאץ' CLUTCH

קוטל חרקים - גרגירים רחפים
מכיל clothianidin 50%

קוטל חרקים בעל מנגנון ניאוניקוטינואיד, פעיל על מגוון רחב של מזיקים בגידולים שונים. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע וגם דוחה אכילה.

הוראות שימוש

מנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים. כדי למנוע התפתחות תנגודת לתכשיר יש לטפל חליפות בתכשיר זה ובתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. אין לרסס בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה, שרב וכאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע, מנזק מקוטלי עשבים ועוד.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4049/צ/הגה/2011
IRAC סיווג: 4A
דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר 12 שעות
אריזות: 0.5 ק"ג, 2 ק"ג
מיוצר ע"י Sumitomo, יפן. משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת השימוש

הגידול	המזיק	המינון (גרם/דונם או %)	אופן היישום	ימי המתנה לפני קטיף
אפרסק, נקטרינה, משמש*	קפנודיס (טיפול בבוגרים)	50 גרם/ד' - בנפח ריסוס מעל 100 ל"ד' - 0.05%	ריסוס	30
תפוח, אגס*	עש תפוח			30
גפן	ציקדה ירוקה			30
גפן	קימחית הגפן			30
גפן	קימחית הגפן	1.0 גרם/גפן	הגמעה לבית השורשים באמצע מנת ההשקיה	3
אגס*	פסילת האגס	50-100 גרם/ד'. בנפח ריסוס מעל 100 ל"ד' - 0.05%-0.1% המינון בהתאם לרמת הנגיעות	ריסוס	30
גזר	ציקדה ירוקה	50 גרם/ד'		14
שקד*	צרעת השקד**	0.05%	ריסוס עם נפח גבוה, 150-200 ליטר/ד'. עדיף לרסס עם מפוח	15
אגוזי אדמה	מלדרה	50 גרם/ד'	ריסוס כל 20 יום משלב של צימוח צעיר	45

***שים לב,** הריסוס עם תכשיר עלול לפגוע באוכלוסיות של אויבים טבעיים במטע ולהגביר נוכחות של אקריות.
יש לרסס עם תחילת הנגיעות

** מועד הריסוס ייקבע ע"י הערכת גיחות של בוגרים מפירות נגועים.

שילובים: אין לשלב עם חומרים כל עוד אין מידע אחר.

הערה: התכשיר רעיל לדבורים. יש להכניס כוורות של דבורים רק לאחר שבועיים מיום הטיפול.