

מגלן MAGLAN

קוטל עשבים בררני בגידולים: בקיה, חמצה, אספסת, חסה עלים, מטעים וער - תרכיז רחף
מכיל: propyzamide 400 g/L, SC

מגלן מדביר ולאחר ההפעלה מונע הצצה של נבטי עשבים דגניים חד-שנתיים. במינונים גבוהים ימנע הצצה של: עשן, חלמית, כף אווז, סרפד, מצליבים וכשות. התכשיר מדביר עשבים רגישים לאחר קליטתו דרך מערכת השורשים, לכן רטיבות נאותה בבית השורשים הכרחית. היישום בחורף בלבד. פעילות החומר נפגמת בטמפרטורות מעל 28°C. עיבוד שיטחי לא מבטל את פעילות החומר.

הפעלה: למניעת הצצה יש להפעיל את התכשיר עם גשם או המטרה של 20 מ"מ לפחות. הריסוס יעיל אם מופעל תוך 30 יום מריסוסו. הטיפול ידביר עשבים קיימים רגישים רק בתנאים של רטיבות נאותה בבית השורשים.

נפח התרסיס: 20 ל"ד'

טבלות השימוש
מטעים ועצי יער

הגידול	המינון (סמ"ק/ד')	מועד הריסוס	הערות
אבוקדו, אפרסמון, גפן, הדורים, אפרסק, זית, עצי יער (ברוש, אורן) משנה לאחר הנטיעה	200 בכל הקרקעות	קדם הצצה, סתיו-חורף	יש לשלב עם גליגן לפי התווית ואזהרות התווית הגליגן

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4138/ הגה"צ / 2013
HRAC סיווג: K
אריזות: 1 ל', 5 ל'
דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס
מיוצר ומשווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



גידולי שלחין

הגידול	המינון (סמ"ק/ד')	מועד הריסוס	הערות
חסה עלים משתילה	300	לאחר שהשתילים נקלטו ולפני הצצת העשׂים הראשונים	יש להמטיר מיד לאחר הריסוס.
אספסת לירק ולזרעים- להדברת עשבים דגניים ח"ש בלבד	125-250*	לאחר הצצה, לאחר הופעת תלת עלה ועד גובה 10 ס"מ ובין הקצירים לא יאחר מ-5 ימים לאחר הקציר	יש להמטיר סמוך לאחר הריסוס.

* בהתאם לשיבוש או גובה העשבים

גידולי פלחה

אין להשתמש בתכשיר בשדות בהם לא מובטחת כמות משקעים (גשם או המטרה) של 250 מ"מ לאחר הריסוס.
למינעת הצצת עשבים צריך להפעיל את התכשיר עם גשם או המטרה לאחר הריסוס.

הגידול	מועד הטיפול	המינון (סמ"ק/ד')*
חמצה. בקרקות כבדות ובינוניות בלבד	מיד לאחר הזריעה, לפני הצצה, לא יאחר מראשית ימאר.	100-200
בקיה בזנים: שדות, פופני. בקרקות כבדות בלבד	מיד לאחר הזריעה, לפני הצצת הגידול	100-200
תלתן בזנים: תבור, פאלי. בקרקות כבדות בלבד	מיד לאחר הזריעה, לפני הצצת הגידול	100-200

* בהתאם לשיבוש או גובה העשבים

גידולים עוקבים

אין להשתמש בתכשיר בשדות בהם לא מובטחת כמות משקעים (גשם או המטרה) של 250 מ"מ לאחר הריסוס. רצוי לחרוש לפני הגידול הבא. תקופת המתנה בין הריסוס לגידול הבא כדלקמן:

הגידול	תקופת המתנה
קינרס, חסה	אין צורך בתקופת המתנה
גזר, כרפס, כרוביים, תות שדה, תירס, כותנה, תפוחי אדמה, סורגום	5 חודשים
פלפל, עגבנייה, חציל, סלק, דלועיים, בצל, שום, תרד	8 חודשים
דגנים לתחמיץ, דשא	12 חודשים