

מוספילן לריסוס MOSPILAN SPRAY

תכשיר סיסטמי להדברת מזיקים בגידולים שונים - תרכיז נוזלי

מכיל 200 גרם בליטר acetamiprid

תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורוניקוטיניל, מיועד להדברת מזיקים שונים. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע. לתכשיר רעילות נמוכה יחסית לבעלי דם חם.

הוראות שימוש

דרכים למניעת פיתוח תנגודת - כדי למנוע התפתחות תנגודת לתכשיר, יש לרסס חליפות בתכשיר זה ובתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר.

רעילות לדבורים ולדבורי בומבוס: אסור לרסס ישירות על הדבורים והכוורות. מומלץ לסגור את הכוורות לקראת ערב ולרסס לפני ריסוס בכל שילוב בדוק לבטיחות על מספר מצומצם של צמחים. כאשר הדבורים לא פעילות בשטח. 24 שעות לאחר הריסוס אין פגיעה בדבורים. 30 שעות לאחר הריסוס אין פגיעה בדבורי בומבוס.

שילובים: פירוט השילובים הבטוחים עם מוספילן בגידולים השונים:

אבטיח: סיגנום, סטרובי, שמן וירול

קישוא: סיגנום, שמן וירול.

מלפפון: ספידר

מלון: סיגנום, סטרובי, שמן וירול

פלפל, חציל, גפן: סיגנום

עגבניות: ספידר, סיגנום,

הדרים: חנקת אשלגן, גופרת מנגן, תחמוצת אבץ, אוריאה דלת ביורט (בריוזים המומלצים ע"י ש.ה.מ.).

כותנה: סיגנום, טיטאן, אטברון, פיקס

בזיליקום, מנטה, מרווה, קורנית, רוזמרין, טרגון, כוסברה, שמיר, פטרוזיליה, רוקולה: סיגנום

מס' הרישוי של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1835/צ/הגה/2005
דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות; כניסה לשטח המחסס - לאחר התייבשות התרסיס

IRAC סיווג: 4A

אריזות: 1 ל', 0.5 ל'

חומר הפעיל תוצרת חברת Nippon Soda, יפן

מיוצר ומשווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת שימוש

הגידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד' או %)	נפח תרסיס (ל'/ד')	הערות	מועד אחרון לטיפול לפני קטיף בימים
כותנה	כנימת עש הטבק	40 ריסוס אוירי	5-3	הריסוס יינתן עם הופעת זחלים ראשונים בעלים.	30
		25 ריסוס קרקע	20-7		
אבטיח, מלפפון, דלורית, דלעת	כנימת עלה כנימת הדלועיים	20	50-30 לפי גודל הצמחים		7
עגבנייה, פלפל, חציל, אבטיח, מלון, מלפפון, קישוא	כנימת עש הטבק	30	50-30 לפי גודל הצמחים		7
כרוב, ברוקולי	חיפושית פרעושית	15	50-30 לפי גודל הצמחים		10
אפרסמון	כנימת השעווה הפלורידית, תריפס סורי, ציקדות	0.025% (25 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	120-250 לפי גודל העצים	בכנימת השעווה הפלורידית הריסוס יינתן עם הופעת הזחלים	25

מוספילן לריסוס (המשך) MOSPILAN SPRAY

הגידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד" או %	נפח תרסיס (ל"ד/')	הערות	מועד אחרון לטיפול לפני קטיף בימים
הדרים**	עש המנהרות של ההדר	0.025% (25 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	הרטבה מלאה	הריסוס יינתן עם הופעת זחלי העש הראשונים של המזיק בעלים.	120
	כנימת הספיראה, כנימת עלה הדלועיים	0.015% (15 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)			
	כנימה קמחית כדורית	0.075% (75 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)		הריסוס יינתן לאחר החנטה בראשית הקיץ	
	כנימה קמחית חבויה				
	כנימה אדומה	0.025% (25 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	300-400 במפוח	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות באביב - קיץ מוקדם	
	כנימת השעווה הפלורידית	0.025% (25 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)		מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	



הגידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד" או %)	נפח תרסיס (ל"/ד')	הערות	מועד אחרון לטיפול לפני קטיף בימים
תפוח	כנימת עלה התפוח	0.05% (50 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	150 - 200 לפי גודל העצים	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	45
	עש תפוח, ציקדה ורדנית, עש שלפוחיות עלה האגס (לאוקופטרה), ליטוקוליטיס, פרלטוריה, סס הנמר	0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)			
	עש תפוח	0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)			
אגס					
רימון, שקד	כנימת עלה הדלועיים, ציקדות	0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	100-150 לפי גודל העצים		15
שקד	אנרסיה	0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	150 - 200 לפי גודל העצים	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	15
משמש, שזיף	חיפושית הקליפה, אנרסיה	0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	150 - 200 לפי גודל העצים	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	30

מוספילן לריסוס (המשך) MOSPILAN SPRAY

הגידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד' או %)	נפח תרסיס (ל'/ד')	הערות	מועד אחרון לטיפול לפני קטיף בימים
אפרסק/ נקטרינה	אנרסיה	0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	150 - 200 לפי גודל העצים	אם קיימת נוכחות אקריות במטע, הריסוס במוספילן עלול במקרים מסוימים לעודד אותן.	30
	ציקדות	0.04% (40 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	100-150 לפי גודל העצים		
גפן	ציקדות	0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	100-150 לפי גודל הגפנים		45
זית	זבוב הזית	0.02% (20 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	100-200 לפי גודל העצים	ריסוס אחד לעונה	20
דקל קנרי	חדקונית הדקל האדומה (Rhynchophorus ferrugineus)	0.2% (200 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	15 ל"עץ	הטיפול יינתן אחת ל- 6 חודשים לכותרת הדקל ב- 3 נקודות, במרחק שווה ביניהן, קרוב ככל האפשר ללולים. השתמש במרסס ללא דיזה. הקפד שלא יהיה נגר של התרסיס על הגזע.	-



הגידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד" או %)	נפח תרסיס (ל"/ד')	הערות	מועד אחרון לטיפול לפני קטיף בימים
אסתר * גיבסנית * היפריקום * ורד * ליזיאנטוס * סולידגו * פיטוספורום * רוסקוס	כנימות עלה כולל כנימת עלה האפרסק, כנימת עש הטבק	30 ----- 0.03% (30 סמ"ק ל- 100 ליטר מים)	60-30 ----- 100 ומעלה (הרטבה מלאה)		-
בזיליקום (ריחון), מנטה, מרווה, קורנית, רוזמרין, טרגון, מיורם	כנימת עלה הדלועיים, כנימת עש הטבק	30	50-30 לפי גודל הצמחים	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	14
כוסברה, שמיר, פטרוזיליה, סלרי, בצל ירוק, רוקולה, עשב לימון	כנימת עלה הדלועיים, כנימת עש הטבק	30	50-30 לפי גודל הצמחים	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	7

* מוספילן ת.נ. נבדק באסתר בזן "קזבלנקה", בגיבסנית בזן "מיליון סטאר", בהיפריקום בזן "פינק פלייר", בורד בזנים "יופיטר" ו"סוויט אקיטו", בליזיאנטוס בזן "קאלו לבן", בסולידגו בזן "טרה", בפיטוספורום בזן "מגוון". בכל הגידולים צריך לבדוק בטיחות השימוש בזנים שאינם מצוינים כאן על מספר מצומצם של צמחים לפני הריסוס המסחרי.

** מוספילן פוגע בחיפושית הרודוליה שטורפת את כנימת האיצריה ועלול להביא להתפרצות מזיק זה.