

ניקון NIKON

קוטל פטריות בעל פעילות פרוטקטנטית וסיסטמית להדברת מחלות שונות במלפפון, גפן והדרים - תרכיז נוזלי
מכיל: potassium phosphite 780 g/L, SL

הוראות השימוש

אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה, או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום, או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע, או מנזק מקוטלי עשבים ועוד. יש לרסס רק עצים/חלקות אשר העצים בהם בריאים וחזקים. אין לשלב עם תכשיר אחר. אין לחרוג מהריכוז המומלץ מחשש לצריבות בעלווה. דאג לכיסוי מלא של העלווה.

מספר הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4478/הגה"צ/2017
דרגת רעילות-IV מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס. בביתי צמי'
חה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש.
FRAC סוג: C2
אריזות: 20 ל'

מיוצר ע"י חברת Lainco, ספרד
משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



טבלת שימוש

הגידול	המחלה	המינון סמ"ק/דונם או ריכוז %	הערות	ימי המתנה עד לקטיף
הדרים*	ריקבון חום	0.25% (250 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	בתחילת עונת הגשמים יש לרסס החלק התחתון של העץ עד גובה של 150 ס"מ מפני הקרקע בנפח תרסיס של 200-150 לי"ד.	3
	חלפת (אלטרנריה)		בזנים רגישים יש לרסס בחודשי האביב לפני פתיחת הפרחים בתחילת חנטה וכל 3 שבועות עד יוני. מרססים גם בסתיו ע"פ הצורך.	
גפן	כשוית	0.3% (300 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	יש לרסס ריסוסי מניעה כל 01 ימים. עם תחילת נגיעות יש לרסס כל 7 עד 01 ימים, 3 ריסוסים לפחות.	3
מלפפון	כשוית	0.3% (300 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	יש להתחיל בטיפולים לפני הופעת המחלה במרווחים של שבוע. ריסוס ראשון יתבצע חודש משתילה.	3

* **בהדרים** אין לרסס ניקון לפני ריסוס שמן וגם חודש לאחר ריסוס שמן. הטיפול בניקון מפחית במידה ניכרת את הנגיעות במחלת החלפת בפרי הדר אך אינו מונע את המחלה לחלוטין. יש לרסס את נוף העץ כולו בנפח תרסיס המבטיח כיסוי מלא.