

ריזולקס RIZOLEX

קוטל פטריות להדברת ריזוקטוניה - אבקה רטיבה

מכיל 50% tolclofos methyl

ריזולקס מדביר ריזוקטוניה במשתלות ובגידולי פרחים, במשתלות ובגידולי צמחי בית וגן, במשתלות כרפס לפני או אחרי השתילה.

הוראות השימוש

הערות: במצעי טוף פעילות התכשיר קצרה כמחצית הזמן מאשר באדמה רגילה.

השקיה לאחר הטיפול: צריך לבצע השקיה קלה בהמטרה (כ-5 מ"ק / ד') תוך שעה מהטיפול בריסוס מעל פני הקרקע או מצע הגידול.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 83/ הגה"צ / 661

FRAC סווג: F3

דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר 12 שעות

אריזות: 1 ק"ג

מיוצר ע"י Sumitomo, יפן

משווק אדמה-אגן בע"מ



טבלת השימוש

הגידול	שיטה ומועד הטיפול	המינון או הריכוז	שיטת היישום	הערות
משתלות פרחים: ציפורן, גיפסנית, אסטר, גרברה, טרכליום, ארליה, שושן, פלוקס, נורית, אדמונית, סולידגו	לפני נעיצת הייחורים	1 גרם/מ"ר או בריכוז 0.1%-0.2%	מרססים או מגמיעים לפי 1 ליטר תמיסה למ"ר	
	1-2 ימים לפני הוצאת השתילים (הטענה)	2-5 גרם למ"ר	הגמעה ב-3 ליטר מים למ"ר	
	לפני או אחרי שתילה	2 ק"ג/ד'	ריסוס ב-20-50 לי"ד	
פרחים: ציפורן, גיפ- סנית, אסטר, גרברה, טרכליום, ארליה, שושן, פלוקס, נורית, אדמונית, סולידגו	לאחר השתילה ואחת לחודש ימים, סה"כ 2-4 טיפולים	2 ק"ג/ד' או בריכוז 0.2% במוקדים	ריסוס נגירה ברובה, ריסוס בלי פומית או במזלף	גיבסנית לאחר הגיזום מטפלים ב-2 ק"ג/ד' ואח"כ ממטירים
צמחי עציץ ונוי: קור- דלין, דרצנה, גפנית, פילורדנדרום, פיטו- ניה, אגלונמה, פיקוס פומילה, ספטיפיליום	לפני נעיצת הייחורים ופעם בחודש	1-2 גרם/מ"ר או 0.1%-0.2%	ריסוס נגירה ב-1 לי"מ"ר	
משתלת כרפס	לפני הזריעה או שבוע לאחר הנביטה	2 ק"ג/ד'	ריסוס ב-20-50 לי"ד	