



הדברת עשבים בהדרים, במטעים ובגפן

הימנע ממגע של תרסיס בגזעים לא מעוצים, בענפים וסורים של עצי פרי וגפן. אין סכנה מפגיעת התרסיס בגזעי העצים המעוצים. כאשר העשבייה הרב-שנתית גבוהה מאוד, יש לכסח אותה ולתת לה לצמוח לגובה 10-15 ס"מ ואזי לבצע הריסוס.

הגידול	העשבים המודברים	הריכוז	בנפח תרסיס 10 ל"ד'	בנפח תרסיס 30 ל"ד'	המינון (סמ"ק לדונם)	הערות
מטעים מגיל שנה ואילך: הדרים, אבוקדו, מנגו, פיג'ואה, קיווי, שסק, פקאן, תפוח, אגס, חבוש, אפרסק, נקטרינה, שזיף, שקד, משמש, גודגדן, גפן, זית, אפרסמון, תמר, אנונה, גויאבה	חד-שנתיים עד גובה 10 ס"מ	0.5% + 1.0% משטח	0.5%	150	למניעת הצצה של ח"ש ניתן לשלב דיאורקס או גליגן בגידולים המורשים. (ראה סעיף שילובים)	
	עד גובה 40 ס"מ.	1.5%-2% לפי גובה העשבייה.	1%	200-300		
	פספולן מורחב	1.5%	1%	250-300		
	קוקויה, דורת ארם-צובא.	3.0%	1%	250-300		
	יבלית, משיין גלילי, דוחן זוחל, עשב רודס	5.0%	2%	500		
	חבלבל, גומא הפקעים, טיון דביק, ארכובית, הגא, סולנום זיתני, פטל, ינבוט	4%	2%		לשיפור ההדברה יש לשלב עם טומהוק בריכוז 0.5% בנפח 30 ל"ד' או 150 סמ"ק/ד' בגידולים בהם טומהוק מורשה.	
	קנה מצוי, סוף מצוי, גומא, חילף החולות		3%			

ראונדאפ מקס © ROUNDUP MAX

קוטל עשבים כללי של חברת מונסנטו - גרגירים מסיסים
מכיל 78.5% מלח אמוניום של גלייפוסט, מתאים ל-68% אקווילנט-חומצה.
glyphosate: n-(phosphonomethyl) glycine

קוטל עשבים סיסטמי לא בררני להדברת עשבים קיימים. התכשיר נקלט ע"י העלווה הירוקה ומובל כלפי מטה גם לחלקים התת-קרקעיים וגורם לתמותת הצמחים. כדי לקבל הדברה מרבית צריך לרסס על צמחים ירוקים רעננים. בעשבים רב-שנתיים המתפתחים מאיברי ריבוי תת-קרקעיים, צריך להמתין בטיפול עד שהצימוח יפרוץ מהם ולהימנע מעיבוד קרקע או כיסוח עלווה לפני הטיפול. פעילות ראונדאפ מקס איטית, תוצאות ניתן לצפות תוך 2-6 שבועות מהריסוס, בהתאם לסוג העשבייה ומועד הטיפול. לאחר ריסוס עשבים רב-שנתיים צריך להימנע מעיבוד הקרקע לפחות 7 ימים לאחר הריסוס.

הוראות שימוש

כללי: לקבלת הדברה מיטבית של העשבים, הימנע מהשקיה בהמטרה במשך יומיים לאחר הריסוס. גשם היורד תוך שעה לאחר הריסוס מפחית מיעילות הטיפול. אבק המכסה את העשבים מפחית מיעילות הריסוס. בעונת החורף (בטמפרטורה נמוכה), פעילות ראונדאפ מקס על עשבים רב-שנתיים אינה מספקת. אין לרסס בתנאי עקה לצמח (חמסין, יובש או קרה). אין לרסס ברוח. מנע הגעת תרסיס או רחף לעלווה ולפירות של גידולי תרבות ולגזעי עצים בלתי מעוצים ולכל צמחייה רצויה, בריכות דגים ומקורות מים. אין לרסס בראונדאפ מקס בזמן הפעלת ההשקיה בטפטוף. גשמים עזים לאחר ריסוס בראונדאפ מקס עלולים להחדיר את החומר למערכת השורשים ולגרום לנזקים בגידול. מנע האבסת בעלי חיים וכניסתם לשטח מרוסס תוך 7 יום מהריסוס. ראונדאפ מקס תוקף מתכות למעט פלדת אל-חלד, השתמש רק במרססים בעלי מכלים העשויים מחומרים סינתטיים או מפלדת אל-חלד. אין להשתמש במכל עשוי מברזל.

העשבים המודברים: ראונדאפ מקס מדביר את מרבית העשבים הקיימים למעט נזמית, סרפד, חלמית מפותחת, ינבוט והגא.
משטח: הוספת משטח לתרסיס דרושה רק במינוני ראונדאפ מקס נמוכים: 50 או 75 גרם לדונם. מומלץ להשתמש במשטח נון-יוני כגון משטח DX בריכוז 0.5% מנפח התרסיס.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 03/הגה"צ/1734

HRAC סיווג: G

אריזות: 20 ק"ג

דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס

מיוצר ע"י Bayer Agriculture BVBA, בלגיה

משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



הדברת עשבים לקראת גידולי שדה, ירקות ובשטחי כרם

נפח התרסיס: יעילות הדברה מרבית מושגת על ידי ראונדאפ מקס בנפח נמוך, להדברת עשבים רב-שנתיים מפותחים ובשטחים לא חקלאיים מרססים בנפחים רגילים-ראה טבלאות. בריסוס קרקע 10-15 ליטר/ד'. בריסוס אוויר 5 ליטר/ד'.

הגידול	העשבים המודברים	המינון (ג'/ד')	מועד הטיפול
לקראת גידולי קיץ: כותנה, מקשה, אגוזי אדמה, תירס וירקות. מותר לרסס עד שבועיים לפני שתילה.	א. נבטים וצמחים חד-שנתיים עד גובה 10 ס"מ לרבות נבטי דורת ארם-צובא שהציצו מזרעים.	50 בתוספת 0.5% משטח DX	לפני הזריעה או לאחריה וכן לקראת שתילה. אין לרסס לאחר השקיית ההנבטה. למעט בקרקעות חוליות המכילות פחות מ-10% חרסית.
	ב. חד-שנתיים 10-40 ס"מ. יבלית ודורת ארם-צובא מקני שורש ייצרבו וידוכאו זמנית.	75 בתוספת 0.5% משטח DX	
לקראת זריעת גידולי קיץ: כותנה, מקשה, אגוזי אדמה, תירס וירקות.	עשבים רב-שנתיים: יבלית, דורת ארם-צובא, חבלבל, גומא הפקעים-בעלי עלווה מפותחת.	250 (במוקדים 2.5%)	במצע מוכן לפני הזריעה ולאחריה (לא לשתילה) אין לרסס לאחר השקיית ההנבטה. למעט בקרקעות חוליות המכילות פחות מ-10% חרסית.
	דורת ארם-צובא בלבד.	150 (במוקדים 1.5%)	
לקראת כותנה בח-גידול בזריעה למישרין (לאחר חיסה, שעורה, שחת).	שלף מתחדש ועשבים חד-שנתיים קיימים, לרבות דורת ארם-צובא שהציץ מזרעים.	75 - 100 בהתאם לגובה העשבים, בתוספת 0.5% משטח DX	על שלף ועשבים מבלבלים לאחר השקיית יסוד וזריעת הכותנה, לא יאוחר מיומיים לפני הצצתה.
טיפול קיצי לקראת דגני חורף בלבד	עשבייה רב-שנתית בעלת עלווה מפותחת הכוללת יבלית, גומא הפקעים, דורת ארם-צובא, ינבוט, סולנום זיתני, חבלבל, הגא.	150-250 100-150 בשילוב טומהוק (מינון ראונדאפ מקס הגבוה להדברת יבלית וגומא הפקעים)	על כרם או לאחר פינוי פני הקרקע משאריות הגידול הקודם, כל עוד העשבים בצימוח פעיל.
	יבלית בעלת עלווה מפותחת וכן עשבייה אחרת הקיימת בזמן הריסוס.	250 (במוקדים 2.5%)	

ראונדאפ מקס © (המשך) ROUNDUP MAX ©

טיפול ראונדאפ מקס בהקמלת גידולים

הגידול	המינון (ג'/ד')	מועד הטיפול	נפח התרסיס
חיטה, שעורה, בקיה, ש"ש, תירס, פנסילריה - לשחת או לתחמיץ.	150-50	עד 7 ימים לפני הקציר	10-20 ל"ד' - ריסוס קרקע 5-7 ל"ד' - ריסוס אוויר

הערה: אין לטפל בגידול המיועד לזרעים.

בטיפול מן האוויר: אין לרסס כאשר הטמפרטורה מעל 30°C . אין לרסס כאשר מהירות הרוח עולה על 7.5 קמ"ש. צריך להימנע מריסוס אווירי של ראונדאפ מקס בתחום 100 מטר מכל גידול חקלאי, מטעים וגינות. אין לרסס בטיפות שקוטרן קטן מ-400 מיקרון. אל תכוון פומיות קדימה אל כיוון זרם האוויר ואל תגדיל את נפח התרסיס על ידי הגדלת הלחץ בפומיות. הבטח יישום אחיד. השתמש באמצעי סימון נאותים בעת ריסוס התכשיר מהאוויר. מיד עם גמר הריסוס שטוף את המרסס על כל חלקיו. רחץ ביסודיות את מטוס הריסוס במיוחד את מתקן הנחיתה בתום יום הריסוס, על מנת לשטוף שאריות ראונדאפ מקס שהנו קורוזיבי למתכת שאינה מצופה.



הדברת עשבים בהדרים, במטעים ובגפן

הימנע ממגע של תרסיס בגזעים לא מעוצים, בענפים וסורים של עצי פרי וגפן. אין סכנה מפגיעת התרסיס בגזעי העצים המעוצים. כאשר העשבייה הרב-שנתית גבוהה מאוד, יש לכסח אותה ולתת לה לצמוח לגובה 10-15 ס"מ ואז לבצע הריסוס.

הגידול	העשבים המודברים	הריכוז	המינון (ג'/ד')		הערות
			בנפח תרסיס 10 ל"ד'	בנפח תרסיס 30 ל"ד'	
מטעים מגיל שנה ואילך: הדרים, אבוקדו, מנגו, פיג'ואה, קיווי, שסק, פקאן, תפוח, אגס, חבוש, אפרסק, נקטרינה, שזיף, שקד, משמש, גודגדן, גפן, זית, אפרסמון, תמר, אנונה, גויאבה	חד-שנתיים עד גובה 10 ס"מ	0.5% + 0.5% משטח	0.25%	75	למניעת הצצה של ח"ש ניתן לשלב דיאורקס או גליגן בגידולים המורשים. (ראה סעיף שילובים)
	עד גובה 40 ס"מ.	0.5%-1% לפי גובה העשבייה.	0.5%	100-150	
	פספולן מורחב	0.75%	0.5%	125-150	
	קוקויה, דורת ארם-צובא.	1.5%	0.5%	125-150	
	יבלית, משיין גלילי, דוחן זוחל, עשב רודס	2.5%	1%	250	
	חבלבל, גומא הפקעים, טיון דביק, ארכובית, הגא, סולנום זיתני, פטל, ינבוט	2%	1%		לשיפור ההדברה יש לשלב עם טומהוק בריכוז 0.5% בנפח 30 ל"ד' או 150 סמ"ק/ד' בגידולים בהם טומהוק מורשה.
	קנה מצוי, סוף מצוי, גומא, חילף החולות		1.5%		

ראונדאפ מקס © (המשך) ROUNDUP MAX ©

הדברת עשבים בשטחי בור

המקום	העשבים המודברים	המינון (ק"ג/ד')	הריכוז	נפח התרסיס (ל'/ד')	הערות
לאורך פסי רכבת וצדי דרכים בינע" רוניות, סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז, שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות, בתוך יישוב	פספלון מורחב, פספלון דו-טורי, עשב רודס, דורת ארם-צובא, יבלית, קוקויה, חילף החולות, משיין גלילי, זקנן כפול שיכולת, גומא הפקעים, חבלבל, טיון דביק ועשבייה חד-שנתית. ינבוט, הגא, סולנום זיתני, פטל, ארכובית	0.5	1%	50-30	לשיפור ההדברה יש לשלב טומהוק בריכוז 0.5%
סביב מאגרי מים, תעלות ניקוז ודפנות של מאגרי מים	כל העשבייה במשבצת העליונה +קנה מצוי, סוף מצוי, גומא ודוחן זוחל.	0.75	1.5%	60-50	

בהתחדש הצימוח חוזרים על הריסוס כשהעשבים מגיעים לגובה כ 40-50 ס"מ סמוך לפריחה.

שילובים: להדברת מגוון רחב של עשבים קיימים, ניתן לשלב עם גליגן, טומהוק, אלבר סופר. ניתן לשלב עם מונעי הצצה (כגון דיאורקס, גליגן). להפעלת דיאורקס דרוש גשם או המטרה תוך 2-3 שבועות לאחר הריסוס, לגליגן תוך 7-14 ימים בהתאם לעונה. בכל השילובים צריך לנהוג לפי התוויות של התכשירים לגבי הגידולים המורשים-אמצעי הזהירות וניקי המרסס.