

טומהוק TOMAHAWK

תרכיז מתחלב

קוטל עשנים סיסטמי להדברת עשבים רחבי עלים בריסוס לאחר הצצתם

מכיל: Fluroxypyr 200 g/L (as meptylheptyl ester 288 g/L)

מנגנון הפעולה של טומהוק דומה לקוטלי עשבים הורמונליים. הנזק לעשבים מתבטא בעוותים ובהתקפלויות של העלים והצימוח הצעיר. התכשיר נקלט בעלווה הירוקה וחודר גם למערכת השורשים. העשבים הרגישים הם מיני עשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים קשי הדברה כמפורט בטבלת הוראות השימוש.

הערות לטיפול: אין לזרוע או לשתול כל גידול לאחר ריסוס בטומהוק במשך 3 חודשים ממועד היישום. ניתן לרסס בטומהוק בכל שעות היום. מנע מגע התרסיס בעלוות עצי הפרי. הימנע מרחף התרסיס לגידולים שכנים העלולים להיפגע מפעילות החומר. החומר חודר לעשב דרך העלווה הירוקה לכן רסס על צמחים רעננים. רצוי לרסס לאחר ההשקיה. **אין להשתמש בטומהוק נזמן ההשקיה או כאשר יש מים עומדים בשטח.** אין לרסס ברוח. אין לרסס טומהוק כאשר הגידולים או העשבים נמצאים בתנאי עקה (כגון יובש, שרב, עודפי מים, קרה, פגיעה מקוטלי עשבים וכף).

שילובים: ניתן לשלב טומהוק עם ראונדאפ/גליפוגן במועדי הטיפול המוזכרים בהוראות השימוש, כפוף לרישויים בגידולים הנ"ל. השילוב של טומהוק עם ראונדאפ משפר את הדברת גומא הפקעים (סעידה).

טבלת השימוש:

הגידול	העשבים המודברים	הריכוז (%) או המינון (סמ"ק/ד) (ל"י/ד")	נפח התרסיס (ל"י/ד")	הערות
מטעים - מהשנה השלישית לנטיעה: אגס, אפרסמון*, אפרסק, הדורים, זית, מנגו, משמש, פיג'ואה, פקאן, שזיף, תמר, תפוח, רימון, אנונה, שקדים	אבוטילון, דטורה, רגלת הגינה, ירוקת החמור ונבטים של רחבי עלים שונים.	0.25%	30-20	מנע רחף של התרסיס לעלוות העצים. בעצי מנגו צעירים באזור בקעת הירדן אין לרסס טומהוק בתקופת הליבלוב. ראה סעיף שילובים.
	ארכובית שבטבטית, חבלבל, חנק, ינבוט, הגא, פטל, סולנום זיתני, אספרגוס, יהודי נודד.	0.5%		
	חבלבל, ינבוט, סולנום זיתני, ארכובית, אבוטילון, דטורה, רגלת הגינה, ירוקת החמור ונבטים של רחבי עלים שונים.	0.25%		
	חבלבל, ינבוט, סולנום זיתני, דטורה, לכיד, רגלת הגינה, אבוטילון, ירוקת החמור ונבטים של רחבי עלים שונים.	150-120 סמ"ק/דונם		
תירס מחוק מזן ג'ובילי ותיירס למספוא בשלב 4-6 עלים בלבד.	חבלבל, ינבוט, סולנום זיתני, דטורה, לכיד, רגלת הגינה, אבוטילון, ירוקת החמור ונבטים של רחבי עלים שונים.	0.5%	20-10	יש לרסס בסמוך לאחר ההשקיה.
דשא דגני בתקופת החורף בלבד: בופלו, דורבן, זני זואיסיה, פספולון, קיקיוו	מיני חמציץ, מיני חבלבוב, אספסת, ארכובית ונבטים של עשבים רחבי עלים שונים.	0.5%		תרסיס או רחף שיפגע בצמחי תרבות בשולי הדשא עלול לגרום להם נזק חמור.
הכנת שטחים לקראת זריעת חיטה בקרקעות בינוניות וכבדות. עד חודש לפני זריעת החיטה	ינבוט, סולנום זיתני, הגא	150-120 סמ"ק/ד'		המינון לפי רמת השיבוש ושלב התפתחות. ראה סעיף שילובים.
לאורך פסי רכב וצדי דרכים בינעירוניות, סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז, שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות	הגא, ינבוט, סולנום זיתני, פטל, חבלבל, ארכובית שבטבטית, חנק, אספרגוס וחד-שנתיים רחבי עלים המוזכרים לעיל	250 סמ"ק/ד' או 0.75% בכתמים		ראה סעיף שילובים.

*אין לרסס באפרסמון בזמן לבלוב וחנטה עד לאחר קטיף ובזמן הימצאות סורי שורש מלבלבים.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1581/הגה"צ/2000

• דרגת רעילות IV-מסוכן
• מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן

• סיווג HRAC: O
• אריזות: 1, 5 ל