

ליאופרד LEOPARD

תרכיז מתחלב קוטל עשבים דגניים בררני

מכיל: Quizalofop-p-ethyl 100 g/L

ליאופרד הנו קוטל עשבים סיסטמי, בררני לגידולים רחבי עלים, המיועד להדברת דגניים חד ורב-שנתיים רבים לאחר הצבתם. ליאופרד נקלט בעיקר דרך העלווה. מספר ימים לאחר הריסוס נעצר צימוח הדגן, העלווה מצהיבה ולאחר מכן מתייבשת. סימני הפגיעה בעשבים ייראו תוך 2-4 שבועות ממועד הריסוס בהתאם למין העשב, גילו ותנאי האקלים.

הערות כלליות:

מועד הטיפול: ניתן לרסס את הגידולים המורשים בכל שלבי התפתחותם כל עוד העשבייה נמצאת בשלב מתאים להדברה ולא מכוסה על ידי הגידול. כדי לקבל הדברה מרבית יש לרסס על צמחים ירוקים ורעננים. אין לרסס גידול הנמצא בעקה (חמסין, יובש, קרה, פגיעה מקוטלי עשבים או כל גורם אחר). רצוי לרסס עשבים חד-שנתיים בשלב של 3-4 עלים עד תחילת הסתעפות, דורת ארם-צובא עד גובה 40 ס"מ ויבליט בגודל עד 15 ס"מ. להדברת עשבים מפותחים יותר יידרש המינון הגבוה. צריך לרסס את העשבים לפני פריחתם. עשבים דגניים שטרם נבטו בעת הריסוס לא יודברו.

הערות לטיפול: יש לשמור על מרווח של לפחות 3 ימים בין הריסוס בליאופרד וריסוס כל קוטל עשבים אחר. לקבלת הדברה יעילה של העשבים הימנע מהשקיה בהמטרה ורצוי שלא ירד גשם במשך 6 שעות מהריסוס. אל תרסס ברוח ומנע כל רחף לגידולים שכנים או לצמחים דגניים סמוכים.

עמידות:

ישנן אוכלוסיות של עשבים דגניים שפיתחו עמידות לתכשירים בעלי מנגנון פעולה מעקבי ACCase (קבוצה A). בכל מקרה של חשש לעמידות, יש להשתמש בקוטלי עשבים בעלי מנגנון פעולה אחר. מכון שלא ניתן לצפות מראש את התפתחות העמידות והתפשטותה, היצרן ו/או המשווק לא נושאים באחריות כלשהי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהדברה לא מספקת.

גידולים עוקבים:

בשדה שטופל בליאופרד אין לזרוע גידולים רחבי עלים (פרט לאילי המורשים בתווית זאת) לפני חלוף 4 שבועות מהריסוס, ואין לזרוע גידולים דגניים לפני חלוף 6 שבועות מהריסוס.

טבלת השימוש:

הגידול	העשבים המודברים*	ריסוס רצוף*** המינון (סמ"ק/ד')	טיפול במוקדים (הריכוז)	נפח התריס (ל"/ד')
גד"ש כותנה, אגוזי אדמה, בקיה, אפונה**, חמצה ירקות עגבנייה, פלפל, פפריקה, אבטיח, בצל, שום, כרוביים, חסה מטע אגס, תפוח (מהנטיעה) הדרים (מגיל 3 שנים)	בדגניים חד-שנתיים: שיבולת שועל, שעורה, ספיח חיטה, ספיח תירס, מיני חפורית, זון, ברומית, זיפן, בן-חיטה, דורה, רותמית, אלבסיני הודית, דוחנית, התרנגולים, דוחנית השלחין.	100-50	0.25%	בהתאם לגונה העשבייה וצפיפותה. בריסוס רצוף: 10-30. בטיפול במוקדים: 20-40.
	דורת ארם-צובא זרעים עד גובה 10 ס"מ צמחים מקנה שורש	100-80 150-100	0.5%	יש להגיע להרטבה מלאה של נוף העשבייה.
	יבלית	200-125	1.0%	

* בדגניים רב-שנתיים מתחדשים ניתן לטפל שנית בהגיעם לגובה 20-30 ס"מ.
 ** באפונה דן, לעתים בעקבות הריסוס מופיעה הצהבה בעלים העליונים. ההצהבה נעלמת בהמשך ללא כל השפעה שלילית על היבול.
 *** לפי גובה העשבייה.



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1627/הגה"צ/2001

• סיווג HRAC: A
 • דרגת רעילות IV - מסוכן
 • אריזות: 1 ל, 5 ל'
 • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן