

קלאץ' CLUTCH

גרגרים רחפים

מכיל: Clothianidin 50%

כללי:

קוטל חרקים בעל מנגנון ניאוניקוטינואיד, מדביר מגוון רחב של מזיקים בירקות, גידולי שדה, מטעים, פרדס, כרם ופרחים. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע.

הערות לטיפול:

מנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים. כדי למנוע התפתחות תנגודת לתכשיר יש לטפל חליפות בתכשיר זה ובתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. אין לרסס בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה, שרב וכאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע, מנזק מקוטלי עשבים ועוד. התכשיר רעיל לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים. יש להכניס כוורות של דבורים רק לאחר שבועיים מיום הטיפול.

הגידול	המזיק	המינון או הריכוז	נפח הריסוס (ל"/ד')	אופן היישום	ימי המתנה לפני קטיף
אפרסק, נקטרינה, משמש*	קפנודים (טיפול בבוגרים)	50 גרם/ד'	100	ריסוס	30
תפוח, אגס*	עש תפוח	0.05%	מעל 100		30
גפן	ציקדה ירוקה				30
גפן	קימחית הגפן				30

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

הגידול	המזיק	המינון (גרם/דונם) (או %)	נפח הריסוס (לי/ד')	אופן היישום	ימי המתנה לפני קטיף
גפן	קימחית הגפן	1.0 גרם/גפן	-	הגמעה לבית השורשים באמצע מנת ההשקיה.	3
אגס*	פסילת האגס	100-50 גרם/ד' 0.1% - 0.05% המינון בהתאם לרמת הנגיעות	100-50 בנפח ריסוס מעל 100 לי/ד'	ריסוס	30
גזר	ציקדה ירוקה	50 גרם/ד'	40-10		14
שקד*	צרעת השקד**	0.05%	ריסוס עם נפח גבוה, 150-200 ליטר/ד'.	עדיף לרסס עם מפוח.	15
אגוזי אדמה	מלדרה מטרידה	50 גרם/ד'	50	ריסוס כל 20 יום משלב של צימוח צעיר	45
פיטוספורום	כנימה קמחית ארוכות זנב	0.1-0.05%***	100-50	ריסוס עם נפח גבוה (עד נגירה)	-

*שים לב,

הריסוס עם התכשיר עלול לפגוע באוכלוסיות של אויבים טבעיים במטע ולהגביר נוכחות של אקריות.

** מועד הריסוס ייקבע ע"י הערכת גיחות של בוגרים מפירות נגועים.

*** בהתאם לעוצמת הנגיעות.

שילובים: אין לשלב עם חומרים כל עוד אין מידע אחר.



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4049/הגה"צ/2011

• סיווג IRAC: A4 • דרגת רעילות IV - מסוכן

• אריזות: 0.5 ק"ג, 2 ק"ג • מיוצר ע"י Sumitomo chemicals

• משווק ע"י אדמה אגן