

רבוס REVUS SC

תרכיז רחף.

קוטל פטריות - להדברת כימסון בתפוח-אדמה ובעגבנייה וכשותית בדלועיים ובתבלינים.

מכיל: Mandipropamid 250 g/L

כללי:

קוטל פטריות נגד כמסון בתפוח-אדמה ועגבנייה, וכשותית במלון קישוא ותבלינים שונים. התכשיר מניעתי (פרוטקטנטי) ומצטיין במניעת נביטת הנבגים. החומר הפעיל מנדיפרופאמיד (Mandipropamid) שייך לקבוצה כימית H. התכשיר נספג במהירות רבה בשכבת השעווה (קוטיקולה) של העלה וכך שרידות התכשיר בתנאי גשם או השקיה בהמטרה גדלה, אירוע גשם/השקיה אחרי התייבשות התכשיר לא פוגעות ביעילותו. בנוסף לתכשיר יכולת תנועה טרנס-למינארית וביכולתו למנוע צימוח תפטיר בתוך העלווה בימים הראשונים שלאחר ההדבקה. בריסוסים נגד כימסון, אם הריסוסים מתבצעים לאחר שיש כתמי מחלה בחלקה אדי רצוי להוסיף לרבוס תכשיר סיסטמי כמצוין בטבלת הוראות השימוש ובשילובים ממומלצים.

הגידול	המחלה	המינון	מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)	הערות
תפוח-אדמה	כימסון	רבוס 60 סמ"ק/ד' לבד או בשילוב עם רידומיל גולד גולד MZ במינון 250 ג'/'ד' או עם ויטן במינון 70 ג'/'ד' או עם קורזייט במינון 60 ג'/'ד' או עם סיני במינון 50 ג'/'ד'	10	מרססים מדי 7-9 ימים בהתאם לעוצמת המחלה.
עגבנייה (בחממה ובשדה הפתוח)	כימסון	רבוס 60 סמ"ק/ד' לבד או בשילוב עם רידומיל גולד גולד MZ במינון 250 ג'/'ד' או עם ויטן במינון 80 ג'/'ד' או עם קורזייט במינון 60 ג'/'ד' או עם סיני במינון 50 ג'/'ד'	3	בכל מקרה של ריסוס על נגיעות קיימת יש לרסס בשילוב.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

הגידול	המחלה	המינון	מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)	הערות
מלון, קישוא	כשותית הדלועיים	60 סמ"ק/ד'	3	מרססים מידי 7-9 ימים בהתאם לעוצמת המחלה.
בדיל (ריחון), מנטה, מרווה, רוזמרין	כשותית	60 סמ"ק/ד'	14	
פטרוזיליה, רוקולה	כשותית	60 סמ"ק/ד'	14	

שילובים:

ניתן לשלב רבוס עם התכשירים הבאים, בהתאם למינונים והנחיות המופיעות בתווית אריזתם: תפוז"א - מץ', מוליט, סקור.
מלון וקישוא - קוליס, אופיר

נפח תריס:

בירקות ובתפוח-אדמה רסס בנפח של 20-50 ליטר לדונם לפי גודל נוף הצמחים.



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4046/צ/2010
 • סיווג FRAC: H5
 • אריזות 1, 5, 7
 • דרגת רעילות IV - מסוכן
 • מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag
 • משווק ע"י אדמה אגן