

תאשיגארין מביד פטריות עסארי למנע הإصابة بالفطريات الموجودة في التربة بيتيوم, فوزاريوم תאשיגארין يُعطى قبل التشتيل وقبل ثلوث الاشتال بمسببات المرض. استعمال תאשיגארין يشجع على نمو الجذور والأوراق.

تحذيرات: المادة ضارة بالبلع . قد تسبب المادة الحساسية للعيون والمسالك التنفسية.

وسائل الحذر والحماية: امتنع عن بلع واستنشاق بخار ورذاذ المادة, امتنع عن الملامسة المباشرة بالجلد والعينين. عند المعالجة بالمستحضر المركز وبالمحلول المرشوش, يجب استعمال وسائل حماية مناسبة (يجب لبس ملابس واقية مصنوعة PVC , وكمامة واقية نصف الوجه حسب معيار EN-١٤٠, لحماية مجرى التنفس مع فلتر حسب معيار EN-١٤٣٨٧ من نوع ٢-ABEK٣, النظارات الواقية للعينين حسب معيار EN-١٦٦, قفازات مطاطية مقاومة للكيمائيات (حسب معيار EN-٣٧٤/٣), حذاء عمل عالية وغطاء للرأس. قم بتحضير المحلول بمكان مفتوح وذو تهوئة. امتنع عن التواجد بغيمة المحلول المرشوش. عند القيام بعملية الرش يجب تغطية كل أجزاء الجسم المكشوفة في ملابس ملائمة. يمنع الأكل, يمنع الشرب ويمنع التدخين عند الاستعمال للمادة. اغسل أجزاء الجسم التي كُشفت للمادة بالماء والصابون.

مخاطر بيئية: امتنع من وصول رذاذ المادة او تدفق المادة لبرك الاسماك ومصادر ومجمعات المياه. المستحضر ليس سام للنحل او للاسماك.

أدوات ومقادير: يمكن استعمال أواني لعملية الإرواء في ساعات مختلفة مثل: المرش (الدوش) أو مرش ذو سعة عالية. قبل الرش يجب تغيير سعة الرش اللذي يعطيها المرش لوحدة المساحة.

علاج الاترية الزراعية: يمكن استعمال تاشيجارين في التربة و التربة الاصطناعية مثل كابول أو مواد عضوية أخرى مخلوط مع البرليت, فرموليت أو مواد عالقة أخرى (اينرت/Inerts). لا يسمح باستعمال تاشيجارين في فرشة الزراعة البرليت الصافي لعدم نجاعة كافية.

طريقة الاستعمال: استعمال تاشيجارين لا يعوض عن اتخاذ إجراءات مثل دورة زراعية والمحافظة على نظافة الحقل من أمراض التربة. يمكن إعطاء تاشيجارين بالرش أو التقطير في مرحلة الاشتال قبل الإرواء وبعد ذلك يجب الإرواء لغسل المادة العالقة على الأوراق.

טאצי'גרן תאשיגארין Tachigaren

المحصول	المرض	الكمية	سعة المحلول	طريقة الاستعمال	موعد الاستعمال
خيار في المشتل	بيتيوم	0,1% (100 سم ³ ل 100 ماء)	3 لتر للمتر المربع حتى السيالان من التربة المعزولة	تجريع	استعمال في المشتل 3 أيام قبل أخراج الاشتال من المشتل خيار- بعد أبرز الورقة الثانية
		0,2% (200 سم ³ ل 100 لتر ماء)			
فلفل بالمشتل		0,2 % (200 سم ³ ل 100 لتر ماء)			
بندورة في المشتل للاشتال المعدة للشتل في الحقل المعقم	فوزاريوم (تعفن التاج)				

عند انتهاء الاستعمال

تنظيف المرش: عند الانتهاء من عملية الرش يجب غسل المرش و البرابيش حالا بالماء والصابون, امتنع عن وصول مياه الغسل لمحاصيل مجاورة, برك اسماك, مصادر مياه.

التخلص من مياه غسل معدات الرش: يمنع تفريغ او غسل مستحضرات او بقاياها من خزان المرش, وخزان التجميع او اي خزان اخر الى الارض, الى برك الاسماك, قنوات المياه والى مصادر ومجمعات المياه بانواعها المختلفة. يجب التخلص من مياه الغسل بالطرق المرخصة من قبل وزارة حماية البيئة, ويجب نقلها لموقع النفايات السامة في رمات حوفاف.

حماية شخصية: عند انتهاء عملية الرش يجب الاستحمام وتبديل الملابس وملابس مغسولة, كما ويتطلب غسل ملابس العمل بانفراد.

الدخول للحقل المرشوش: بعد ٤ ساعة

تخزين: اخزن المادة في مكان مغلق, مظلل وجاف معد لتخزين المواد الزراعية بعيدا عن متناول أيدي الأولاد والناس غير مسئولين . يمنع تخزين المادة مع مواد غذائية للإنسان والحيوانات أحفظ المادة في عبوتها الأصلية.

טאצי'גרן תאשיגארין Tachigaren

مادة انسكبت: في حالة انسكبت المادة يجب غمرها بالرمل ومن ثم جمعها بعبوة محكمة الاغلاق ومن ثم نقلها الى مجمع النفايات السامه.

إتلاف العبوات: يجب غسل العبوات الفارغة ٣ مرات بالماء ثم ثقبها وإلقائها في مجمع النفايات المرخص من قبل وزير هيئة البيئة.

إسعاف أولي: اغسل بالماء والصابون اجزاء الجسم التي كُشفت للمادة. في حالة ملامسة المادة للعينين- يجب غسل العينين لمدة ١٥ دقيقة والتوجه للطبيب, في حالة ابتلاع المادة يجب نقل المصاب للطبيب وإبراز نشرة المادة أمامه.

معلومات للطبيب: رقم تلفون المركز القطري للتسمم 04-7771900

شروط البيع: المنتجون والموزعون واثقون من نجاعة المادة, ولكن لعدم تمكنهم من الإشراف على عملية وشروط الاستعمال فهم غير مسئولون عن أي ضرر ناتج عن الاستعمال المادة حسب التعليمات أعلاه أو أي طرق أخرى.

טאצי'גרן תאשיגארין Tachigaren

טאצי'גרן

Tachigaren

תאשיגארין

תרכיז נוזלי

Hymexazol 360 g/L

קוטל פטריות סיסטמי למניעת מחלות הקרקע פיתום במלפפון ובפלפל וריקבון הכתר בעגבנייה

קבוצת FRAC A3

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 01/הגה"צ/1651
!לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
לلاستعمال الزراعي فقط - وليس للاستعمال المنزلي!

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה"ח רמב"ם 04-7771900

קרא את התווית לפני השימוש | מספר אצווה מודפס על גבי האריזה

ייצור: MITSUI CHEMICALS AGRO, INC, יפן
שיווק: אדמה - אגן בע"מ, אשדוד 77102, ת.ד. 262, טל. 08-8515211
www.adama.com/agan

1 ליטר

עידכון 6/21



ADAMA
Agan



סרוק לכניסה לאתר



ايجان آداما



ADAMA
Agan

www.adama.com/agan

تحديث / لايدכון 6/21

1x12 ליטר/ליטר

טאציגארן

Tachigaren

تاشيجارين

תרכיז נוזלי
Hymexazol 360 g/L

تركيز سائل
Hymexazol 360 g/L

קוטל פטריות סיסטמי למניעת מחלות
הקרע פיתיון במלפפון ובפלפל
וריקבון הכתר בעגבנייה
מביד פטריות עשירי למנע أمراض التربة
ביתיום في الخيار (تعفن التاج)
فوزاريوم في البندورة.

טאציגארן
تاشيجارين
Tachigaren

L0652C07



ADAMA
Agan

www.adama.com/agan

اگان آداما



ADAMA
Agan



סרוק לכניסה
לאתר



טאצ'יגרן

Tachigaren

تاشيجارين

תרכיז בוזלי

Hymexazol 360 g/L

קוטל פטריות סיסטמי למניעת מחלות
הקרעק פיתיום במלפפון ובפלפל
וריקבון הכתר בעגבנייה

קבוצת FRAC A3

מסי הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 01/הגה"צ/1651
!לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
للاستعمال الزراعي فقط - وليس للاستعمال المنزلي!

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה"ח רמב"ם 04-7771900

קרא את התווית לפני השימוש | מספר אצווה מודפס על גבי האריזה

ייצור: MITSUI CHEMICALS AGRO, INC, יפן

שיווק: אדמה - אגן בע"מ, אשדוד 77102, ת.ד. 262, טל. 08-8515211

www.adama.com/agan

1 ליטר

עידכון 6/21

רמת: 01-5005000 www.adama.co.il

טאצ'יגרן تاشيجارين Tachigaren

טאצי'גרן

Tachigaren

תאשיגארין

תרכיז נוזלי

Hymexazol 360 g/L

קוטל פטריות סיסטמי למניעת מחלות הקרקע פיתיום במלפפון ובפלפל וריקבון הכתר בעגבנייה

קבוצת FRAC A3

מסי' הרישיון של השיירותים להגנת הצומח וליביקורת: 01/הגה"צ/1651
!לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ללאסעמאל הצראעי فقط – וליס לאסעמאל המנזלי!
מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה"ח רמבי"ם 04-7771900
קרא את התווית לפני השימוש | מספר אצווה מודפס על גבי האריזה

ייצור: MITSUI CHEMICALS AGRO, INC, יפן
שיווק: אדמה - אגן בע"מ, אשדוד 77102, ת.ד. 262, טל. 08-8515211
www.adama.com/agan

5 ליטר

עידכון 6/21



ADAMA
Agan

דרגת רעילות
IV
מסוכן
UN No. 3082

סרוק לכניסה
לאתר



05-10201-507

תאשיגארין מביד פטריות עשירי למען ה'אבאה ב'الفطريات الموجودة في التربة بيتيوم, فوزاريوم תאשיגארין يُعطى قبل التشيل وقبل تلوث الاشتال بمسببات المرض.
استعمال תאשיגארין يشجع على نمو الجذور والأوراق.

תחذירות : המاده ضارة بالبلع . قد تسبب המاده الحساسية للعيون والمسالك التنفسية.

وسائل الحذر والحماية: امتنع عن بلع واستنشاق بخار ورذاذ המاده, امتنع عن الملامسة المباشرة بالجلد وبالعینين. عند المعالجة بالمستحضر المركز وبالمحلول المرشوش, يجب استعمال وسائل حماية مناسبة (يجب لبس ملابس واقیه مصنوعة PVC , وكمامة واقية نصف الوجه حسب معيار EN-140, لحماية مجرى التنفس مع فلتر حسب معيار EN-1438V من نوع P2-ABEK2, النظارات الواقية للعينين حسب معيار EN-166, قفازات مطاطيه مقاومة للكيماويات (حسب معيار EN-374/3), حذاء عمل عالية وغطاء للرأس. قم بتحضير المحلول بمكان مفتوح وذو تهوئة. امتنع عن التواجد بغيمة المحلول المرشوش. عند القيام بعملية الرش يجب تغطية كل أجزاء الجسم المكشوفة في ملابس ملائمة. يمنع الأكل, يمنع الشرب ويمنع التدخين عند الاستعمال للماده. اغسل أجزاء الجسم التي كشفت للماده بالماء والصابون.

مخاطر بيئية: امتنع من وصول رذاذ המاده او تدفق המاده لبرك الاسماك ومصادر ومجمعات المياه. المستحضر ليس سام للنحل او للاسماك.

أدوات ومقادير: يمكن استعمال أواني لعملية الإرواء في ساعات مختلفة مثل: المرش (الدوش) أو مرش ذو سعة عالية. قبل الرش يجب تغيير سعة الرش الذي يعطيها المرش لوحدة المساحة.

علاج فرشات (الوسط) الزراعة: يمكن استعمال تاشيגארין في التربة و التربة الاصطناعية مثل كابول أو مواد عضوية أخرى مخلوط مع البرليت, فرموليت أو مواد عالقة أخرى (اينرت/Inerts). لا يسمح باستعمال تاشيגארין في فرشة الزراعة البرليت الصافي لعدم نجاعة كافية.

طريقة الاستعمال: استعمال تاشيגארין لا يعوض عن اتخاذ إجراءات مثل دورة زراعية والمحافظة على نظافة الحقل من أمراض التربة. يمكن إعطاء تاشيגארין بالرش أو التقطير في مرحلة الاشتال قبل الإرواء وبعد ذلك يجب الإرواء لغسل الماده العالقة على الأوراق.

טאצי'גרן תאשיגארין Tachigaren

المحصول	المرض	الكمية	سعة المحلول	طريقة الاستعمال	موعد الاستعمال
خيار في المشتل	بيتيوم	0,1% (100 سم ³ ل 100 ماء)	3 لتر للمتر المربع حتى السيلان من التربة المعزولة	تجريع	استعمال في المشتل 3 أيام قبل أخراج الشتال من المشتل خيار- بعد إبراز الورقة الثانية
		0,2% (200 سم ³ ل 100 لتر ماء)			
فلفل بالمشتل					
بندورة في المشتل للاشتال المعدة للشتل في الحقل المعقم	فوزاريوم (تعفن التاج)	0,2 % (200 سم ³ ل 100 لتر ماء)			

عند انتهاء الاستعمال

تنظيف المرش: عند الانتهاء من عملية الرش يجب غسل المرش و البرابيش حالا بالماء والصابون, امتنع عن وصول مياه الغسل لمخاصيل مجاورة, برك اسماك, مصادر مياه.

التخلص من مياه غسل معدات الرش: يمنع تفريغ او غسل مستحضرات او بقاياها من خزان المرش, وخزان التجميع او اي خزان اخر الى الارض, الى برك الاسماك, قنوات المياه الى مصادر ومجمعات المياه بانواعها المختلفة. يجب التخلص من مياه الغسل بالطرق المرخصة من قبل وزارة حماية البيئة, ويجب نقلها لموقع النفايات السامة في رمات حوفاف.

حماية شخصية: عند انتهاء عملية الرش يجب الاستحمام وتبديل الملابس بملابس مغلوسة,كما ويتطلب غسل ملابس العمل بانفراد.

الدخول للحقل المرشوش: بعد 4 ساعة

تخزين: اخزن الماده في مكان مغلق, مظلل وجاف معد لتخزين المواد الزراعية بعيدا عن متناول أيدي الأولاد والناس غير مسئولين , يمنع تخزين الماده مع مواد غذائية للإنسان والحيوانات أحفظ الماده في عبوتها الأصلية.

טאצי'גרן תאשיגארין Tachigaren

מاده انسكبت: في حالة انسكبت الماده يجب غمرها بالرمل ومن ثم جمعها بعبوة محكمة الاغلاق ومن ثم نقلها الى مجمع النفايات السامه.

إتلاف العبوات: يجب غسل العبوات الفارغة ٣ مرات بالماء ثم ثقبها وإلقائها في مجمع النفايات المرخص من قبل وزير هيئة البيئة.

إسعاف أولي: اغسل بالماء والصابون اجزاء الجسم التي كشفت للماده. في حالة ملامسة الماده للعينين- يجب غسل العينين لمدة ١٥ دقيقة والتوجه للطبيب, في حالة ابتلاع الماده يجب نقل المصاب للطبيب وإبراز نشرة الماده أمامه.

معلومات للطبيب: رقم تلفون المركز القطري للتسمم 04-7771900

شروط البيع: المنتجون والموزعون واثقون من نجاعة الماده, ولكن لعدم تمكنهم من الإشراف على عملية وشروط الاستعمال فهم غير مسئولون عن اي ضرر ناتج عن الاستعمال الماده حسب التعليمات اعلاه أو أي طرق أخرى.

טאצי'גרן תאשיגארין Tachigaren

אגדא אגן



ADAMA
Agan

www.adama.com/agan

לאידון / تحديث 6/21

5X4 ליטר / لیتر

טאצ'יגרן Tachigaren تاشيجارين

תרכיז נוזלי
Hymexazol 360 g/L

תרכיז סאטל
Hymexazol 360 g/L

קוטל פטריות סיסטמי למניעת מחלות
הקרקה פיתיום במלפפון ובפלפל
וריקבון הכתר בעגבנייה
מבד פטריות עשירי למנע أمراض التربة
ביטיום פי الخیار (تعفن التاج)
فوزاريوم פי البندورة.

טאצ'יגרן
Tachigaren
تاشيجارين

L0701C05

8mm 7mm

138mm

170 mm

17mm

4mm

150 mm

50701-05

אגא אגן



ADAMA
Agan

טאצ'יגרן
Tachigaren
تاشيجارين

תרכיז נוזלי
Hymexazol 360 g/L

תרכיז סائل
Hymexazol 360 g/L

קוטל פטריות סיסטמי למניעת מחלות
הקרע פיתום במלפפון ובפלפל
וריקבון הכתר בעגבנייה
מייבד פטריות עשירי למנע أمراض التربة
ביתום فی الخيار (تعفن التاج)
فوزاريوم فی البندورة.

www.adama.com/agan

למידות / تحديث 6/21

5 ליטר / ליתר

טאצ'יגרן תאשיגארין
Tachigaren



רדיוס פינות 10 מ"מ

אגדו אגאן



ADAMA
Agan

www.adama.com/agan

למידות / تحديث 6/21

טאצ'יגרן
Tachigaren
تاشيجارين

תרכיז נוזלי
Hymexazol 360 g/L

תרכיז סאנל
Hymexazol 360 g/L

קוטל פטריות סיסטמי למניעת מחלות
הקרקע פיתיוס במלפפון ובפלפל
וריקבון הכתר בעגבנייה

מביד פטריות עשירי למנע أمراض التربة
بيتيوم في الخيار (تعفن التاج)
فوزاريوم في البندورة.

0.5x24 ליטר/ליטר

טאצ'יגרן
Tachigaren
تاشيجارين

01259907