

הגידול	המחלה	המינון (גרם/דונם) או ריכוז (%)	נפח התרסיס (ל"/ד')	רווחי ריסוס בימים	ימי המתנה עד לקטיף
נקטרינה, אפרסק	ריקבון מימי (ריזופוס)	0.1%	200 או עד נגירה	יש לרסס שבוע עד 3 שבועות לפני התחלת הקטיף	7
	ריקבון חום (מוניליניה)	0.1%	100-200 לפי גודל העצים	לרסס בפריחה לפני גשם	
	קימחון האפרסק	0.1%	200 או עד נגירה	10-14(1)	
שקד	חילדון הגרעיניים	0.05% (50 גר' ל-100 ליטר מים)	100-200 לפי גודל העצים	14-20 (1)	30
	ריקבון חום (מוניליניה)	0.1%	100-200 לפי גודל העצים	לרסס בפריחה לפני גשם	
רוסקוס	ריקבון אפור (בוטריטיס)	75	100-50	7	-
פרח שעווה	כתמי חלפת	50	100-50	7	-
בצל ירוק	כשותית הבצל	50	10-40	-	21

(1)בהתאם לרמת הנגיעות. (2) המינון הנמוך למניעה (3) בזנים רגישים לא פחות מ- 50 גרם לדונם

מניעת עמידות:

כדי למנוע עמידות הפטרייה לסיגנום, יש לכלול בלוח ההדברה תכשירים בעלי מגגנון פעולה שונה.
משטר ריסוסים בסיגנום למניעת עמידות, לפי גידול: **כותנה** - עד 3 ריסוסים בעונה ; **גזר** - עד 3 ריסוסים בעונה, אך לא יותר מ- 2 ריסוסים רצופים; **עגבנייה, פלפל, חציל, דלועיים, תפוח אדמה, תות שדה, שום, עירית, שקד, אפרסק/נקטרינה, תפוח, בצל** - עד 3 ריסוסים (לא רצופים) בעונה .
חמצה, הדרים, אפרסמון, גפן, פרחים - לא יותר מ- 2 ריסוסים רצופים.
מלון ומלפפון בהגמעה - לא יותר מ- 2 טיפולים רצופים.

שילובים:

בכותנה ניתן לשלב עם מוספילן.
באבטיח ניתן לשלב עם מוספילן, ספיידר, שמן וירותר, שמן אולטרפין ושמן JMS.
במלון וקישוא ניתן לשלב עם מוספילן.
בחמצה ניתן לשלב עם דואל גולד, ליאופרד, חץ, פוקוס אולטרא.
בעגבנייה ופלפל ניתן לשלב עם מוספילן, ספיידר, אקרימטרין, פרוקליום, מץ'.
בחציל ניתן לשלב עם, מוספילן, אקרימטרין, ספיידר.
בתפוא"ד ניתן לשלב עם ורטימק, פגסוס, ראנה, מץ, אטברון וטלסטאר.
בכוסברה, שמיר, פטרוזיליה, רוקולה, ריחן (בזיל), מנתה, מרווה, קורנית, טרגון ניתן לשלב עם מוספילן לריסוס.



- מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1723/צ/2003
- סיווג C2+C3: FRAC
 - אריזות: 0.5 ק"ג, 5 ק"ג
 - דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות
 - מיוצר ע"י חברת BASF
 - משווק ע"י אדמה אגן