

גרגרים רחיפים W.G  
קוטל פטריות להדברת קימחונית  
בפלפל ובחציל, קימחונית ואקרית חלודה  
בעגבניה, קימחון בתות שדה, בדלועיים,  
בנקטרינה ובגפן וכן אקרית חלודה בהדרים



תיוביט®

ThiovitJet | תיוביט

דרגת רעילות: IV - מסוכן  
מס' או"ם: לא מסווג  
מיוצר ע"י: **syngenta**

מכיל: Sulfur 80%  
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 4634/צ/ה"צ/22  
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

#### כללי:

תיוביט קוטל את הפגע הרגיש לו הן במגע והן באמצעות פאזה גזית.  
תיוביט משווק בתוארית של גרגרים רחיפים המתרחפים בקלות ובמהירות במי התרסיס.  
חלקיקי הגופרית הזעירים בתוארית הגרגרית מאפשרים פיזור אופטימלי על העלווה והפירות  
באמצעי הריסוס המקובלים. תיוביט מתאים לריסוס במתכונת של הדברה משולבת (IPM)  
בהתאם להמלצות ולמגבלות המפורטות בדפי המידע.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

| הגידול   | הנגע                              | ריכוז או מינון* | נפח התרסיס**   | טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)  | הערות  |
|--|-----------------------------------|-----------------|--|---|--|
| עגבניה למאכל בהדליה בשטח הגלוי והחסוי מהזנים: 819, 870, 906, 1402, נסיכה, שרי, 1335  | קימחונית, אקרית החלודה של העגבניה | 1.0%-0.5%       | 50-100 ל'ד'  | 3   | מרססים עם הופעת הנגיעות וממשיכים לרסס מדי שבוע בתוכנית של ריסוסים חלופיים.                     |
|  |                                   | 300 גר'ד'       | 30-40 ל'ד'   |   |  |
|  | קימחונית                          | 1.0%-0.5%       | 50-100 ל'ד'  | עגבניה למאכל ולתעשייה בגידול משתרע בשטח הגלוי והחסוי מהזנים: 4303, 9176, AB-8, 9665, 9557, 3155, 9382, 3060 |  |
| פלפל מהזנים: אוהד, קליבר, קריזמה, מנטה, 4408, מאור   | קימחונית                          | 1.0%-0.5%       | 50-100 ל'ד'  | 3   | מרססים עם הופעת הנגיעות וממשיכים לרסס מדי שבוע בתוכנית של ריסוסים חלופיים.                     |
| חציל מהזנים: 1726 (קלסיק)  | קימחונית                          | 1% (-800 גר'ד') | 40-80 ל'ד' בהתאם לגודל הגוף. במרסס רובים או במרסס מפוח | 3   | מרססים עם הופעת הנגיעות וממשיכים לרסס מדי שבוע בתוכנית של ריסוסים חלופיים.                     |
| תות שדה מהזנים: 328 (תמר), 329 (יעל), חרות, 543  | קימחון                            | 200-300 גר'ד'   | 50-30 ל'ד'   | 3   | הקפד לא לרסס בימים חמים או כשצפויים תנאי שרב.  |
| אבטיח מהזנים: 313, 5244, 1262, 8003, 616, 740 קרימזון  | קימחון                            | 200-100 גר'ד'   | 50-30 ל'ד'   | 3   |  |
|  |                                   | 300-200 גר'ד'   |  |   |  |
|  |                                   | 300-200 גר'ד'   |  |   |  |
| מלון מהזנים: 6004, אופיה, 6407, דלנו, 6402, מגנטה  | קימחון                            | 300-200 גר'ד'   | 50-30 ל'ד'   | 3   | הקפד לא לרסס בימים חמים או כשצפויים תנאי שרב.  |
| קישוא מהזנים: ארליקה, 413, צוק   | קימחון                            | 300-200 גר'ד'   | 50-30 ל'ד'   | 3   | הקפד לא לרסס בימים חמים או כשצפויים תנאי שרב.  |
| גפן יין מהזנים: קריניאן, סוביניון-בלאנק  | קימחון                            | 0.5%            | 100-200 ל'ד' (עד נגירה)                                | 3   | הקפד לא לרסס בימים חמים או כשצפויים תנאי שרב.  |
| נקטרינה מהזנים: רד רובי, RC-338, W-835, סנו קווין, 192, 515, 320ee, קווין גאינט  | קימחון                            | 0.5%            | 100-200 ל'ד' במרסס מפוח בטיפות קטנות                   | 3   | הקפד לא לרסס בימים חמים או כשצפויים תנאי שרב.  |
| הדרים מהזנים: אשכולית לבנה, פומלו (גולייט), פומלית, טבורי (ניו הול, ליין לייט, וושינגטון), ולנסיה, שמוטי, לימון, סצומה, ראשון, נובה, מינואלה, וינולה, מיכל, אורה, אור 1, מוה, מירב, מורקוט, טובז | אקרית החלודה של ההדר              |                 | 300-500 ל'ד' במרסס מפוח: העץ בהתאם לגודל העץ           | 3   | מועד ההדברה כמפורט בתוכנית ההדברה של אקרית החלודה בהדרים. אין לשלב בשמן - כמפורט בסעיף שילובים |
| ברובים או ברנדל: עד נגירה  |                                   |                 |  |   |  |

## תיוביט®

\*מרססים בריכוז הנמוך ברמת נגיעות נמוכה ובריכוז הגבוה בנגיעות גבוהה.  
\*\*יש לרסס בנפח תרסיס שיבטיח כיסוי נאות של העלווה והפירות, בהתאם לגובה הנוף, שיטת הריסוס, ומיקום הפגע.

### שילובים:

בהתחשב במגוון התכשירים והתואריות, בתנאי אקלים משתנים, במגוון שנית ושיטות גידול, על המגדל לבצע בדיקת שילובים מקדימה בקנה מידה קטן לפני יישום משקי נרחב. בכל מקרה של שילוב יש להכניס תיוביט ראשון למיכל המרסס. אין לשלב תיוביט בתכשירים אלקליים (בסיסיים) כגון: מרק בורדו וכן עם שמנים, או עם תכשירים בתואריות המכילות שמנים.

יתרה מזאת על פי המלצת היצרן - בירקות יש להמתין לפחות 14 יום בין ריסוס שמן לבין ריסוס תיוביט ולהפך. בהדרים תקופת ההמתנה תהיה 21 יום לפחות.