

טופז® | Topaz | طوباز

אבקה רטיבה W.

קוטל פטריות סיסטמי להדברת מחלות צמחים



דרגת רעילות: IV - מסוכן

מס' או"ם: 3077

מיוצר ע"י: Nippon Soda Co.Ltd - יפן

מכיל: Thiophanate Methyl 70%

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 73/ה"צ/13

לפני השימוש יש לקרוא את
ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

אופן היישום:

הגידול	מחלה	ריכוז או מינון (ג'/ד')	מרווחי ריסוס	נפח תרסיס (ל'/ד')	מועד אחרון לפני אסיף (ימים)
אגס	גרב האגס*	0.03%-0.05% בהתאם לעוצמת הנגיעות ועונת הטיפול	בתחילת העונה, מהלבלוב עד סוף אפריל, כל 7-10 ימים. מסוף אפריל עד סמוך לקטיפה, כל 10-14 יום	גבוה עד נגירה	21
תפוח	גרב התפוח (רקבון ספרופסיס*)	0.05%	אחת כל 7-10 ימים מתחילת הבלבוב, אחת ל-14-21 יום החל מחודש יוני עד הקטיפה. בטיפולים להדברת גרב בתפוחי עץ יודבר גם קימחון	גבוה עד נגירה	21
אגוזי אדמה	כתמת (צרקוספורה)	80	אחת ל-20 יום מגיל 5 שבועות מומלץ לרסס לאחר השקיה	40	21
בצל	שורש ורוד	טבילת בצלצולים לפני השתילה ב-0.04% בתוספת 0.05% משטח למשך 30 דקות. טיפול זה מיועד למניעת הפצת המחלה ע"ג בצלצולים נגועים לקרקעות לא נגועות או למניעת אילוח נוסף של הקרקע במחלה, אך אין בו כדי להגן על בצלצולים הנשתלים באדמה נגועה			
משמש, שזיף	רקבון חום (מוניליה)*	0.05%	משלב פקע ורוד ועד לשיא פריחה, בהתאם לארועי הגשם	עד נגירה	21
שקד					90
עגבניה	עובש אפור (בוטריטיס)*	100	אחת ל-7 ימים	80-50	3
מלפפון	קשיונה גדולה	100	אחת ל-7 ימים	80-50	3
קישוא					3
גזר	קשיונה גדולה	100	אחת ל-7 ימים	40-25	7
חסה					

* במקרה של רקבון חום (מוניליה), גרב ועובש אפור (בוטריטיס) יש לרסס פעמיים בעונה ולא ברצף.

שילובים:

באגס, ניתן לשלב טופז עם רימון פאסט.



אדמה
ירוקה