

אופיר 2000® | Ofir 2000 | اوفير

קוטל פטריות סיסטמי E.W
להדברת מחלות הקימחון והקמחונית בגידולים שונים



דרגת רעילות: IV - מסוכן
מס' או"ם: 1915
מיוצר ע"י: **syngenta**

מכיל: 200 ג' Penconazole בליטר
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 98/ה"צ/1489

לפני השימוש יש לקרוא את
ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

אופן היישום:

הגידול	המחלה	הריכוז ב- ריסוס לנגירה (100 ל"ד' ומעלה)	מינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל"ד')	מועד אחרון לטיפול לפני האסיף או הקטיפ (ימים)	הערות
מלפפון, קישוא מלון, אבטיח	קמחון	0.035% (35 סמ"ק ל-100- ליטר מים)	35	30-50 ליטר לדונם בשטח פתוח,	3	
עגבניה, פלפל, חציל, פפריקה	קמחונית	0.05% (50 סמ"ק ל-100- ליטר מים)	50	50-100 ליטר לדונם בחממה, כדי כיסוי מלא	3	
גזר	קמחון		25	30-50		
ורד	קמחון	0.015% (15 סמ"ק ל-100- ליטר מים)			3	
פרח השעווה	קמחונית	0.04% (40 סמ"ק ל-100- ליטר מים)	40	50-100		
סולידגו	קמחון	0.025% (25 סמ"ק ל-100- ליטר מים)	25	50-80		
גיפסנית						
תות שדה	קמחון		25	20-50	3	
מנטה					21	

השמך בעמוד הבא <<

>> השמך מעמוד הבא

אופיר 2000® | Ofir 2000 | אופיר

אופן היישום:

הגידול	המחלה	הריכוז ב-% ריסוס לנגירה (100 ל"ד' ומעלה)	מינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל"ד')	מועד אחרון לטיפול לפני האסיף או הקטיפ (ימים)	הערות
תפוח	קמחון גרב	0.015% (15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)		לנגירה	14	להדברת גרב יש להוסיף מרפאן 50 בריכוז 0.1%
מנגו	קמחון				14	טיפול ראשון ינתן עם הופעת התפרחות המיועדת לשאת פרי.
גפן	קמחון			50-120	14	
אפרסק, נקטרינה	קמחון			לנגירה	7	

למניעת התפתחות עמידות אין לטפל יותר מ-2 טיפולים ברציפות.
במקומות בהם התפתחה עמידות חלקית או מלאה לאופיר יש לצפות כי לא תתקבל הדברה מלאה, ואין לטפל בתכשיר

שילובים:

בתפוח - ניתן לשלב עם הליוגופרית, דורסן ת"מ, מסאי א"ר, מץ' ת"מ, ספיידר ת"מ ומוליט ת"מ רבמלפון - ניתן
ג"ר ואויסקט א"מ MZ לשלב עם אקרוט ג"ר, ורטימק ת"מ, טריגרד א"ר, מץ' ת"מ, רידומיל גולד
בקישוא - ניתן לשלב עם אדקטרה.
במלון - ניתן לשלב עם פרוקליים ת"מ.
בפלפל - ניתן לשלב עם טריגרד א"ר, פרוקליים ת"מ, מץ' ת"מ, ורטימק ת"מ,
מוליט ת"ר, מסאי א"ר, טרייסר אולטרה ת"מ וסקור ת"מ
בתות שדה - ניתן לשלב עם מסאי א"ר, סוויץ' ג"ר, ורטימק ת"מ, פרוקליים ת"מ,
מץ' ת"מ ומוליט ת"ר. באפרסק/נקטרינות - ניתן לשלב עם הליוגופרית