

באנג'ו® | Banjo | بانجو

תרכיז רחיף - S.C

התכשיר להדברת טווח רחב של מחלות



דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות
מס' או"ם: 3082
מיוצר ע"י: אדמה מכתשים בע"מ

מכיל: Fluazinam 500 g/l

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 4427/ה"צ/2017

לפני השימוש יש לקרוא את
ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

אופן היישום:

הגידול	הפגע	ריכוז (%) או מינון (סמ"ק/ד')	נפח (ל'/ד')	הערות
תפוח אדמה	כימיון	50	40-20	מטפלים החל מהצצה ולפני הופעת המחלה. מדי 7-21 יום בהתאם לקצב הגידול והנגיעות.
	נימור שחור (ריזוקטוניה)	500 בריסוס בפס הזריעה	40-20	ריסוס בפס הזריעה, בנפח תרסיס 20 ל'/ד'. יש ליישם בשתי דיוזות קונג'ט, רוחב פס 30 ס"מ, דיוזה ראשונה לאחר פתיחת התלם והשניה על מקום נפילת הפקעות.
גפן	זרוע מתה	0.1% בשילוב עם אולטראפיין 2% בריכוז 1% EOS או	150	יש לרסס חודש לפני לבלוב צפוי, לאחר זמירה. מומלץ להשלים בשני ריסוסי מנקוזב ראשון בראשית לבלוב ושני 10 ימים לאחר מכן.