

עמיסטר® | Amistar | عميستر

תרכיז רחיק S.C

קוטל פטריות סיסטמי וטרנסלמינרי מקבוצת הסטרובילוריינים להדברת מחלות צמחים



דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות

מס' או"ם: 3082

מיוצר ע"י: **syngenta**

מכיל: Azoxystrobin 250 g/l

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1554/ה"צ/99

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

אופן היישום:

הגידול	הפגע	ריכוז או מינון (סמ"ק/ד')	נפח תרסיס (ל'/ד')	טיפול אחרון לפני האסיף (ימים)	הערות
הדרים: (קליפים מינאולה)	כתמי חלפת (אלטרנריה אלטרנאטה)	0.075%	400-300	-	שני טיפולים בלבד, לא יאוחר מסוף חודש מאי.
בצל ⁽¹⁾	סטמפיליום, כשותית	50	30-20	15	
עגבניה ⁽¹⁾	קימחונית, עובש עלים	50	80-30	10	
	קימחונית	150	בהגמעה ⁽⁸⁾	7	2 יישומים בלבד בעונה בהפרש של חודש ימים. טיפול ראשון מומלץ כחודש משתילה.
פלפל ⁽¹⁾	קימחונית	50	60-20	4	
	קימחונית	150	בהגמעה ⁽⁸⁾	7	2 יישומים בלבד בעונה בהפרש של חודש ימים. טיפול ראשון מומלץ כחודש משתילה.
חציל ⁽¹⁾	קימחונית	50	60-20	10	
תפו"א	חלפת ^(2,1) (אלטרנריה סולני)	25	35-20	15	
	מק שורש (ריזוקטוניה)	100 סמ"ק ל-1000 מ' רץ גדודית	30-10	90	טיפול בפס הזריעה במהלך הזריעה.
גזר ^(3,5)	חלפת הגזר	25	35-20	15	שני טיפולים בלבד. רסס את התכשיר לפני התחלת הופעת המחלה ו/או בשלבים מוקדמים של התפתחותה.
	קימחון הגזר	25-50 ⁽⁴⁾			
	כתמים שקועים	500 ⁽⁶⁾ או 1000 ⁽⁷⁾	30-20	60	יש להמטיר 30-40 מ"ק מים לדונם לאחר היישום.

>> השמך מעמוד הבא

עמיסטר® | Amistar | عميستر

אופן היישום:

הגידול	הפגע	ריכוז או מינון (סמ"ק/ד')	נפח תרסיס (ל'/ד')	טיפול אחרון לפני האסיף (ימים)	הערות
חמצה	כתמי אסקוכיטה	50	15-20	60	
שום (ו)	חילדון, סטמפיליום	50	20-30	15	טיפולי מניעה.
כותנה	חלפת	50	10-20	30	אין לטפל יותר מפעמיים בעונה.
שקד	גחלון (אנטרקנוז)	0.05%	עד נגירה	40	
גפן	כשותית וקימחון הגפן	0.05%	עד נגירה	15	טיפולי מניעה.
אפרסמון	תסמין כתמי עלים	0.05%	עד נגירה	10	שני טיפולים במהלך יוני בהפרש שבועיים.
עירית, רוקולה, בצל ירוק	כשותית, סטמפיליום	50	20-30	7	מוגבל ליישום אחד במהלך הגידול
בזיל	כשותית	50	20-30	14	מוגבל ליישום אחד במהלך הגידול
שמיר, פטרוזיליה	קימחון	50	30-40	7	רסס את התכשיר לפני התחלת הופעת המחלה
מרווה, מנטה, רוזמרין, קורנית וטרגון	קימחון	50	30-40	14	ו/או בשלבים מוקדמים של התפתחותה.
כרפס (ו)	צרקוספורה	50		14	
מלון	התמוטטות פתאומית במלון (מונוספוראסקוט) דרום הארץ בלבד	150	בהגמעה (8)	7	אין להתייחס לעמיסטר כתחליף לחיטוי קרקע. מועד טיפול ראשון: 3 שבועות משתילה, טיפול עוקב: 2-3 שבועות לאחר מכן.
	קשיון הבטטה (מאקרופומינה) בחלקות עם היסטוריה של נגיעות	250	בהגמעה (8)		
ברוקולי	חלפת המצליבים	50	30-50	3	מוגבל ליישום בודד לעונה

הוראות יישום:

יישם עמיסטר בשלבי ההתפתחות המוקדמים של המחלה, כיול המערכת ושימוש בנפח תרסיס מתאים (כמתואר בטבלה), יבטיחו כיסוי מיטבי של הצמח. בשלבי התפתחות מתקדמים של המחלה, או בתנאי מזג אוויר המעודדים את התפתחות המחלה (כמתואר בספרות המקצועית), יתכן ויהיה צורך בהקטנת המרווחים בין הטיפולים.



- (1) בירקות: יש להקפיד על מרווחים של 7-10 ימים בין טיפול לטיפול. אין לרסס עמיסטר עד 21 יום משתילה.
- (2) בזנים: ניקולה, מונדיאל, קלאסטה, אומיה, וולור.
- (3) בזנים: טינו, פרדור, סולו, פרסטו, וולור, ג'וניור, אוטינו, נירובי, מיניקו, Amsterdam Rouge ABK.
- (4) לפי עוצמת הנגיעות.
- (5) אין לטפל בעמיסטר כנגד חלפת או קימחון בחלקות המטופלות בעמיסטר כנגד כתמי בית שאן (פתיום/חללים שקועים).
- (6) אין לרסס עמיסטר עד שישה ימים לאחר יישום בקוטל העשבים ס
- (6) או (7): הטיפולים לפי אחת ההנחיות
- (6) אפשרות אחת מתוך השלוש:
- א. טיפול בעמיסטר 500 סמ"ק לדונם בשלב 30 יום מזריעה ו-30 יום לאחריו, טיפול רידומיל גולד במינון 130 סמ"ק לדונם
- ב. טיפול עמיסטר במינון 500 סמ"ק לדונם, 30 ימים לאחר טיפול הרידומיל גולד במינון 130 סמ"ק לדונם.
- ג. שני יישומים של עמיסטר במינון 500 סמ"ק לדונם, כשהראשון בשלב 30 ימים מזריעה וישום שני בהפרש של 30 ימים.
- (7) טיפול בודד בעמיסטר בשלב של 30 יום מזריעה.
- (8) טיפולי הגמעה:
- א. טיפולי מניעה בלבד. אין לראות בעמיסטר כתכשיר בודד להדברת המחלה לעונה כולה.
- ב. אין ליישם במצע מנותק.
- ג. אין ליישם בעת עקה (מים, אקלים ואגרונטכניקה).
- ד. אין להצמיא את הצמחים לפני או אחרי היישום ואין לראות ביישום התכשיר בהגמעה כחלק ממשטר ההשקיה.
- ה. יש להזריק את התכשיר מהול במים למערכת הטפטוף במערכות השקיה מנותקות אוויר, יש ליישם במשאבת דישון בהשקיה של 2-4 קוב לדונם לאורך כל ההשקיה
- ו. לאחר היישום יש להזרים 1 קוב מים לדונם לשטיפת המערכת. עלול לגרום לסמפטומים של סימני מחסור בעלים.
- (1) בירקות: יש להקפיד על מרווחים של 7-10 ימים בין טיפול לטיפול. אין לרסס עמיסטר עד 21 יום משתילה.
- (2) בזנים: ניקולה, מונדיאל, קלאסטה, אומיה, וולור
- (3) בזנים: טינו, פרדור, סולו, פרסטו, וולור, ג'וניור, אוטינו, נירובי, מיניקו, Amsterdam Rouge ABK.
- (4) לפי עוצמת הנגיעות.
- (5) אין לטפל בעמיסטר כנגד חלפת או קימחון בחלקות המטופלות בעמיסטר כנגד כתמי בית שאן (פתיום/חללים שקועים).
- אין לרסס עמיסטר עד שישה ימים לאחר יישום בקוטל העשבים סנקור.
- (6) או (7): הטיפולים לפי אחת ההנחיות:
- (6) אפשרות אחת מתוך השלוש:
- א. טיפול בעמיסטר 500 סמ"ק לדונם בשלב 30 יום מזריעה ו-30 יום לאחריו, טיפול רידומיל גולד במינון 130 סמ"ק לדונם
- ב. טיפול עמיסטר במינון 500 סמ"ק לדונם, 30 ימים לאחר טיפול הרידומיל גולד במינון 130 סמ"ק לדונם
- ג. שני יישומים של עמיסטר במינון 500 סמ"ק לדונם, כשהראשון בשלב 30 ימים מזריעה וישום שני בהפרש של 30 ימים.
- (7) טיפול בודד בעמיסטר בשלב של 30 יום מזריעה
- (8) טיפולי הגמעה
- א. טיפולי מניעה בלבד. אין לראות בעמיסטר כתכשיר בודד להדברת המחלה לעונה כולה.
- ב. אין ליישם במצע מנותק.
- ג. אין ליישם בעת עקה (מים, אקלים ואגרונטכניקה).
- ד. אין להצמיא את הצמחים לפני או אחרי היישום ואין לראות ביישום התכשיר בהגמעה כחלק ממשטר ההשקיה.
- ה. יש להזריק את התכשיר מהול במים למערכת הטפטוף במערכות השקיה מנותקות אוויר, יש ליישם במשאבת דישון בהשקיה של 2-4 קוב לדונם לאורך כל ההשקיה
- ו. לאחר היישום יש להזרים 1 קוב מים לדונם לשטיפת המערכת.
- ז. עלול לגרום לסמפטומים של סימני מחסור בעלים.

שילובים מותרים:

בתפוז"א ניתן לשלב עם אודאון ומנצידן אין לשלב עם תכשירים נוספים. EOS בפלפל ניתן לשלב עמיסטר עם בגפן, ניתן לשלב להדברת כשותית עמיסטר בריכוז 0.05% עם ספינקס בריכוז 0.05%.