

**תרכיז רחף S.C**  
**קוטל פטריות סיסטמי וטרנסלמינרי**  
**מקבוצת הסטרובילורינים**  
**להדברת מחלות צמחים**



**עמיסטר®**  
**Amistar | عميستر**

**דרגת רעילות: III** - מסוכן לבריאות  
**מס' או"ם: 3082**  
**מיוצר ע"י: syngenta**

**מכיל: Azoxystrobin 250 g/l**  
**רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1554/צ"ה/99**  
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

#### **כללי:**

לעמיסטר מנגנון פעולה יחודי - עיכוב נשימת פטריות, ולכן הוא מתאים לשימוש לחילופין עם תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. עמיסטר מדביר טווח רחב של מחלות במגוון גידולים. יעילותו של התכשיר טובה במיוחד בהגנה בפני מחלות, או בשימוש בשלבים של תחילת נגיעות.

הגידול	הפגע	ריכוז או מינון (סמ"ק/ד")	נבח תרסיס ("ל"/ד")	טיפול אחרון לפני האסיך (ימים)	הערות
הדרים: (קליפים מינאולה)	כתמי חלפת (אלטרנריה אלטרנאטה)	0.075%	400-300	-	שני טיפולים בלבד, לא יאוחר מסוף חודש מאי.
בצל <sup>(1)</sup>	סטמפיליום, כשותית	50	30-20	15	
עגבניה <sup>(1)</sup>	קימחונית, עובש עלים	50	80-30	10	
	קימחונית	150	בהגמעה <sup>(8)</sup>	7	2 יישומים בלבד בעונה בהפרש של חודש ימים. טיפול ראשון מומלץ כחודש משתילה.
פלפל <sup>(1)</sup>	קימחונית	50	60-20	4	
	קימחונית	150	בהגמעה <sup>(8)</sup>	7	2 יישומים בלבד בעונה בהפרש של חודש ימים. טיפול ראשון מומלץ כחודש משתילה.
חציל <sup>(1)</sup>	קימחונית	50	60-20	10	
	חלפת <sup>(2,1)</sup> (אלטרנריה סולני)	25	35-20	15	
תפוז"א	מק שורש (ריזוקטוניה)	100 סמ"ק ל-1000 מ' רץ גדודית	30-10	90	טיפול בפס הזריעה במהלך הזריעה.
	חלפת הגזר	25	35-20	15	שני טיפולים בלבד. רסס את התכשיר לפני התחלת הופעת המחלה ו/או בשלבים מוקדמים של התפתחותה.
גזר <sup>(3,5)</sup>	קימחון הגזר	25-50 <sup>(4)</sup>			
חמצה	כתמים שקועים	500 <sup>(6)</sup> או 1000 <sup>(7)</sup>	30-20	60	יש להמתיר 30-40 מ"ק מים לדונם לאחר היישום.
	שום <sup>(1)</sup>	כתמי אסקוקיטה	50	60	
	חילדון, סטמפיליום	50	30-20	15	טיפול מניעה.

# עמיסטר

אופן היישום:

הגידול	הפגע	ריכוז מינון (סמ"ק/ד')	נפח תרסיס (ל'/ד')	טיפול אחרון לפני האסיף (ימים)	הערות
כותנה	חלפת	50	20-10	30	אין לטפל יותר מפעמיים בעונה.
שקד	גחלון (אנטרקנוז)	0.05%	עד נגירה	40	
גפן	כשותית וקימחון הגפן	0.05%	עד נגירה	15	טיפול מניעה.
אפרסמון	תסמין כתמי עלים	0.05%	עד נגירה	10	שני טיפולים במהלך יוני בהפרש שבועיים.
עירית, רוקולה, בצל ירוק	כשותית, סטמפיליום	50	30-20	7	מוגבל ליישום אחד במהלך הגידול
בזיל	כשותית	50	30-20	14	מוגבל ליישום אחד במהלך הגידול
שמה, פטרוזיליה	קימחון	50	40-30	7	רסס את התכשיר לפני התחלת הופעת המחלה ו/או בשלבים מוקדמים של התפתחותה.
מרווה, מנטה, רוזמרין, קורנית וטרגון	קימחון	50	40-30	14	
כרפס <sup>(1)</sup>	צרקוספורה	50		14	
מלון	התמוטטות פתאומית במלון (מונוספוראסקוס) דרום הארץ בלבד	150	בהגמעה <sup>(8)</sup>	7	אין להתייחס לעמיסטר כתחליף לחיטוי קרקע. מועד טיפול ראשון: 3 שבועות משתילה, טיפול עוקב: 2-3 שבועות לאחר מכן.
	קשיון הבטטה (מאקרופומינה) בחלקות עם היסטוריה של נגיעות	250	בהגמעה <sup>(8)</sup>		
ברוקולי	חלפת המצליבים	50	50-30	3	מוגבל ליישום בודד לעונה

## הוראות יישום:

ישם עמיסטר בשלבי ההתפתחות המוקדמים של המחלה, כיול המערכת ושימוש בנפח תרסיס מתאים (כמתואר בטבלה), יבטיחו כיסוי מיטבי של הצמח. בשלבי התפתחות מתקדמים של המחלה, או בתנאי מזג אוויר המעודדים את התפתחות המחלה (כמתואר בספרות המקצועית), יתכן ויהיה צורך בהקטנת המרווחים בין הטיפולים.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577



(1) בירקות: יש להקפיד על מרווחים של 7-10 ימים בין טיפול לטיפול. אין לרסס עמיסטר עד 21 יום משתילה.

(2) בזנים: ניקולה, מונדיאל, קלואסטר, אומיה, וולור.

(3) בזנים: טינו, פרודור, סולו, פרסטו, וולור, ג'וניור, אוטינו, נירובי, מיניקור, Amsterdam Rouge ABK.

(4) לפי עוצמת הנגיעות.

(5) אין לטפל בעמיסטר כנגד חלפת או קימחון בחלקות המטופלות בעמיסטר כנגד כתמי בית שאן (פתיום/חללים שקועים).

אין לרסס עמיסטר עד שישה ימים לאחר יישום בקוטל העשבים סנקור.

(6) או (7): הטיפולים לפי אחת ההנחיות:

(6) אפשרות אחת מתוך השלוש:

א. טיפול בעמיסטר 500 סמ"ק לדונם בשלב 30 יום מזריעה ו-30 יום לאחריו, טיפול רידומיל גולד במינון 130 סמ"ק לדונם.

ב. טיפול עמיסטר במינון 500 סמ"ק לדונם, 30 ימים לאחר טיפול הרידומיל גולד במינון 130 סמ"ק לדונם.

ג. שני יישומים של עמיסטר במינון 500 סמ"ק לדונם, כשהראשון בשלב 30 ימים מזריעה וישום שני בהפרש של 30 ימים.

(7) טיפול בודד בעמיסטר בשלב של 30 יום מזריעה.

(8) טיפולי הגמעה:

א. טיפולי מניעה בלבד. אין לראות בעמיסטר כתכשיר בודד להדברת המחלה לעונה כולה.

ב. אין ליישם במצע מנותק.

ג. אין ליישם בעת עקה (מים, אקלים ואגרונטניקה).

ד. אין להצמיא את הצמחים לפני או אחרי היישום ואין לראות ביישום התכשיר בהגמעה כחלק ממשטר ההשקיה.

ה. יש להזריק את התכשיר מהול במים למערכת הטפטוף במערכות השקיה מנותקות אוויר, יש ליישם במשאבת דישון בהשקיה של 2-4 קוב לדונם לאורך כל ההשקיה.

ו. לאחר היישום יש להזרים 1 קוב מים לדונם לשטיפת המערכת.

ז. עלול לגרום לסמפטוומים של סימני מחסור בעלים.

## שילובים מותרים:

בפלפל ניתן לשלב עמיסטר עם SOE. בתפו"א ניתן לשלב עם אודאון ומנצידן.

אין לשלב עם תכשירים נוספים.

בגפן, ניתן לשלב להדברת כשותית עמיסטר בריכוז 0.05%.

עם ספינקס בריכוז 0.05%.

