

**תרכיז רחף S.C**  
**קוטל פטריות סיסטמי**  
**להדברת חלפת, קימחון,**  
**קמחוניית וקימלון**



**חוסן®**

Hosen | حوسن

**דרגת רעילות: IV - מסוכן**  
**מס' או"ם: לא מסווג**  
**מיוצר ע"י: CHEMINOVA,**  
דנמרק/גרמניה

**מכיל: Flutriafol 125 g/l**  
**רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1430/ה"צ/96**  
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

**כללי:**

תכשיר קוטל פטריות סיסטמי טרנסלמינרי מקבוצת הטריאזולים, המיועד להדברת חלפת בגזר, בתפוא"א ובהדרים, להדברת קימחון בגזר ולהדברת קימחוניית בפרח שעווה וקימלון בהדרים. בהעדר הוראת שימוש אחרת, מותר להשתמש בתכשיר עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף! בין היישומים, יש לוודא שמטפלים בתכשיר אחר, שאינו מכיל את אותו החומר הפעיל. זאת על מנת להימנע ממקרים של שאריות חריגות בקטיף.

**שילובים מותרים:**

אין לשלב עם תכשירים נוספים.

## אופן היישום:

הגידול	הפגע	ריכוז/מינון (סמ"ק/דונם או %)	נפח תרסיס/הגמעה	טיפול אחרון לפני אסיף/קטיף (ימים)
תפוז <sup>(1)</sup>	חלפת	75		7
גזר <sup>(1)</sup>	חלפת הגזר, קמחון הגזר	75		7
פלפל <sup>(2)</sup> חציל	קמחונית	100	בהגמעה <sup>(3)</sup> 2 יישומים בלבד בעונה בהפרש של חודש ימים. טיפול ראשון מומלץ כחודש משתילה.	3
הדרים: מינאולה	כתמי חלפת (אלטרנריה)	0.15%	ריסוס במרסס מפוח עד הרטבה בנפח של לא פחות מ-300 ליטר/דונם למטע בוגר	120
הדרים <sup>(4,2)</sup>	קימלון <sup>(5)</sup> (מאלסקו)	200	בהגמעה מומלץ להתחיל טיפול בסתיו: 2 יישומים עוקבים בהפרש של 4 שבועות. באביב: מתחילת מרץ, 3 יישומים עוקבים באותו ההפרש. היישומים כולם צריכים להעשות בשליש האחרון של ההשקיה המשקית. לאחר ההגמעה, יש לשטוף במים, בחמישה קוב/ד' נוספים.	26
פרח שעווה <sup>(6)</sup>	קמחונית	0.05%		3

(1) בתפוז וגזר - אין לטפל בחוסן יותר משלוש פעמים בעונה.

(2) טיפולי הגמעה:

א. טיפולי מניעה בלבד. אין לראות בחוסן כתכשיר בודד להדברת המחלה לעונה כולה.

ב. אין ליישם במצע מנותק.

ג. אין ליישם בעת עקה (מים, אקלים ואגרונטכניקה).

ד. אין להצמיא את הצמחים לפני או אחרי היישום ואין לראות ביישום התכשיר בהגמעה כחלק ממשטר ההשקיה.

(3) א. יש להזריק את התכשיר מהול במים למערכת הטפטוף במערכות השקיה מנותקות אוויר, יש ליישם במשאבת דישון בהשקיה של 2-4 קוב לדונם לאורך כל ההשקיה.

ב. לאחר היישום יש להזרים 1 קוב מים לדונם לשטיפת המערכת.

(4) נבדק בלימון וליים, בזנים נוספים יש לבצע בדיקת בטיחות לפני היישום המשקי.

(5) אין לראות בטיפול זה פתרון מלא למחלת הקימלון. חובה להקפיד על ביצוע סניטציה סדירה לאורך כל העונה

(הוצאת עצים וענפים פגועים מהחלקה).

(6) בזנים: גיא, מיה, אופיר, הוט-פינק, אורכיד, פינטד-ליידי.

