

סימבוש 10® | Cymbush 10 | سيمبوش

תרכיז מתחלב E.C
להדברת מזיקים בכותנה, במטע, בגפן, בירקות ובפרחים



דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות
מס' או"ם: 3082
מיוצר ע"י: אדמה מכתשים בע"מ

מכיל: Cypermethrin 100 g/l

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 82/ה"צ/151

לפני השימוש יש לקרוא את
ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

אופן היישום:

הגידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד') הריכוז (%)	טיפול אחרון לפני האסיף (ימים)
כותנה	עש הכותנה (זחל ההלקט הורוד), בוגרי כנימת עש הטבק,	150	3
תפוח	משפחת הציקדיתיים	0.1%	21
גפן	זבוב התסיסה, עש האשכול	0.1%	21
תפוח אדמה, גזר	בוגרי כנימת עש הטבק	100-150 סמ"ק בריסוס אוויר 60-100 סמ"ק בריסוס קרקע	21
עגבניה	הדברת בוגרי כנימת עש הטבק למניעת העברה של וירוס צהבון האמיר	0.3% בנפח תריס 50-20 ל"ד', כנדרש לכיסוי מלא של גוף הצמחים (1)	14
בצל, שום	תריפס הטבק	100	21
מלפפון, מלון (בשדות גלויים בלבד)	בוגרי כנימת עש הטבק, תריפס הטבק	100	14
חציל, פלפל, קישוא(1)	כנימת עש הטבק, תריפס הטבק	100-60 סמ"ק לפי גודל הצמחים	14
פרחים: עדעד, ציפורן(2)	תריפס הטבק, פרחית שעה (זיבל הפרחים)	100	3
גרברה(2)	תריפס, בוגרי כנימת עש הטבק	100	3
ליאטריס, רוסקוס, חרצת, גפסנית, סולידסטר, אסתר(2)	תריפס	100	3

(1) בחלקות בשלבי הצצה, בעונה בה יש חשש להעברת הוירוס, מרססים החל מהצצת הנבטים הראשונים ועד שבועיים לאחר הצצה, מידי יומיים. בחלקות שתולות, מטפלים מיום השתילה, ואם הן מומטרות, חוזרים על הטיפול מיד לאחר כל המטרה. משבועיים לאחר הצצה או שתילה, וכן בחלקות מבוגרות, מטפלים מידי 3 ימים. (2) בפרחים בשל ריבוי זנים, מומלץ לבדוק לפני השימוש, את בטיחות התכשיר לגבי זנים חדשים

הערות:

(1) ניתן לרסס את התכשיר בריסוס אווירי ובציוד קרקע, בריסוס נגירה או בנפח נמוך. לתכשיר לחץ אדים נמוך והוא אינו מוסע ברקמות הצמחים, לכן יש להקפיד על כיסוי מיטבי של הצמח

(2) ריסוסים חוזרים בסימבוש 10 עלולים לגרום לריבוי אקריות בגידולים המטופלים ובגידולים שכנים, אפילו אם אינם ידועים כפונדקאים מועדפים של מזיקים אלה

שילובים:

אין לשלב נימץ עם חומרים נוספים.