



סקולאר®

Scholar | سکولار

תרכיז רחף S.C
קוטל פטריות בטיפול אחר קטיף בהדרים,
אגס, תפוח, קיווי, אפרסק, נקטרינה,
מנגו, רימון, גזר ואבוקדו למניעת הדבקת
מלפפון בריקבון כתר הדלועים (פוזריום)

דרגת רעילות: IV - מסוכן
מס' או"ם: 3077
מיוצר ע"י: syngenta

מכיל: Fludioxonil 230 g/l
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1925/ה"צ/08
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי:

סקולאר הינו קוטל פטריות המשמש להדברת פטריות, מיני עובשים ורקבונות, בטיפולים אחר קטיף, ולמניעת הדבקת מלפפון בריקבון כתר הדלועים (פוזריום). החומר שייך לקבוצת Phenylpyrrole ובעל מנגנון פעולה ייחודי, המשפיע על נשימת הפטריות. הפטרייה בוטריטיס גורמת מחלת הריקבון האפור והפטרייה פניציליום, גורמת ריקבונות עובש, עלולות לפתח עמידות לתכשיר זה, בייחוד בבתי אריזה שבהם משתמשים שנים ארוכות בתכשיר.



אופן היישום:

מועד אחרון לטיפול לפני קטיף (ימים)	הערות	שיטת היישום	מינון בה"מ (PPM)	מינון/ריכוז (% מנפח)	הפגע	הגידול
	אין להשאר את הפרי/ ירק המטופל בשמש מחשש להתברקות החומה. אין להשתמש בתמיסת הטבילה מעבר ליום עבודה אחדך	טבילה במי התמיסה לאחר קטיף טרם האחסון. יש לדאוג להפעיל את בוחש התמיסה במשך כל זמן הטבילה. ⁽¹⁾ יש לטבול למשך 30 שניות ולאחר מכן לייבש את הפרי/ ירק (או לייבש בשמש)	500	0.2% (2 ליטר ל 1- מ"ק מים)	עובש כחול (Penicillium italicum)	הדרים בבית האריזה לפני שלב הדינוג
			250	0.1% (1 ליטר ל 1- מ"ק מים)	עובש כחול בנשירים (Penicillium spp) עובש ירוק (Penicillium digitatum)	תפוח, אגס, קיווי, אפרסק, נקטרינה (טיפול בבית האריזה)
			500	0.2% (2 ליטר ל 1- מ"ק מים)	עובש ירוק (Penicillium digitatum) עובש אפור (Botrytis cinerea)	רימון (טיפול בבית האריזה)
			300	0.13% (13 ליטר ל 1- מ"ק מים)	ריקבון העוקץ (Lasiodiplodia theobromae)	מנגו (טיפול בבית האריזה)
			160	0.07% (700 סמ"ק תכשיר ל 1- מ"ק מים)	ריקבון עוקץ (Lasiodiplodia theobromae)	אבוקדו (טיפול בבית האריזה)
			250	0.1% (1000 סמ"ק תכשיר ל 1- מ"ק מים)	קשיונה גדולה	גזר (טיפול בבית האריזה)
7	3-5 טיפולים בהתאם לעונה ולרגישות הזן	בהגמעה לבית השורשים ⁽²⁾		0.06-0.04 סמ"ק לשתיל (40-60 סמ"ק לכל 1.000 שתילים)	ריקבון כתר הדלועיים (Fusarium oxysporum)	מלפפון

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר